



**University of  
Zurich**<sup>UZH</sup>

**Zurich Open Repository and  
Archive**

University of Zurich  
University Library  
Strickhofstrasse 39  
CH-8057 Zurich  
[www.zora.uzh.ch](http://www.zora.uzh.ch)

---

Year: 2016

---

## **Der Forschungsverbund stationäre Suchttherapie act-info-FOS im Jahr 2015 - Tätigkeitsbericht und Jahresstatistik**

Schaaf, Susanne

Other titles: Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie act-info-FOS en 2015  
- Rapport d'activités et statistiques annuelles globales

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich  
ZORA URL: <https://doi.org/10.5167/uzh-124791>  
Published Research Report  
Published Version

Originally published at:  
Schaaf, Susanne (2016). Der Forschungsverbund stationäre Suchttherapie act-info-FOS im Jahr 2015 -  
Tätigkeitsbericht und Jahresstatistik. Zürich: ISGF.



# **Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie act-*info*-FOS en 2015**

## **Rapport d'activités et statistiques annuelles globales**

Ed. : Service de coordination act-*info*-FOS  
Etabli par Susanne Schaaf  
avec la collaboration d'Heidi Bolliger et Andreas Wenger

Le projet act-*info*-FOS est financé par l'Office fédéral de la santé  
publique (OFSP)

No 369/2016



## Table des matières

<b>Table des matières .....</b>	<b>3</b>
<b>Remerciements.....</b>	<b>4</b>
<b>1 Résumé .....</b>	<b>5</b>
<b>2 Rapport d'activités 2015 .....</b>	<b>10</b>
2.1 Personnel du Service de coordination act- <i>info</i> -FOS .....	10
2.2 Centres participants .....	10
2.2.1 Liste des centres participant à act- <i>info</i> -FOS en 2015 .....	10
2.3 Activités du Service de coordination act- <i>info</i> -FOS dans le cadre de la statistique de base .....	12
2.3.1 Participation dans l'équipe du monitoring national d'aide aux personnes dépendantes act- <i>info</i> .....	13
2.3.2 Rencontres, rapports et publications .....	14
2.4 Autres projets .....	15
2.4.1 Autres projets act- <i>info</i> -FOS.....	15
2.4.2 Autres projets globaux.....	15
2.5 Perspectives .....	15
<b>3 Statistiques sur la clientèle act-<i>info</i>-FOS – Méthodologie .....</b>	<b>16</b>
3.1 Instruments et collecte des données .....	16
3.2 Saisie électronique et contrôle des données .....	17
3.3 Préparation des données .....	17
3.4 Echantillons 2015 .....	18
<b>4 Annexe aux tableaux : tableaux des entrées et sorties 2015 .....</b>	<b>19</b>
4.1 Tableaux des entrées et des sorties 2015 .....	20

### Remerciements

Outil éprouvé de coopération entre les chercheurs et les praticiens, la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie se poursuit sous l'ère *act-info-FOS*. Nous souhaitons remercier ici tous ceux qui font partie de la Ligue *act-info-FOS* et qui ont contribué à la parution du présent rapport :

- les clients et les clientes pour leur disponibilité à répondre aux questions ;
- les collaborateurs et les collaboratrices des établissements thérapeutiques participant au projet *act-info-FOS* pour leur investissement ;
- l'équipe du groupe de coordination *act-info* : Etienne Maffli (SAMBAD, ad interim Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone), Marina Delgrande Jordan (*act-info-Residalc*) et Maria Dickson-Spillmann et depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2015 Michelle Dey (HeGeBe), pour l'excellente collaboration ;
- l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en tant que mandataire du projet, ainsi que les responsables à l'OFSP ; plus particulièrement Verena Maag et René Stamm, responsables des projets *act-info* et des tâches y afférentes à l'OFSP, pour leur soutien actif et permanent au projet.
- Sylvie Gentizon, pour la traduction en français du présent rapport.

Service de coordination *act-info-FOS*

## 1 Résumé

En 2015, la documentation nationale act-*info*-FOS sur la clientèle des établissements thérapeutiques résidentiels s'est poursuivie pour la treizième année consécutive, après avoir existé durant huit ans en tant que Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie (FOS). Cette année, 41 établissements thérapeutiques, soit 82 % des établissements suisses de traitement résidentiel des addictions (drogues illégales principalement), faisaient partie de la Ligue.

Le présent rapport annuel est composé du rapport d'activité du Service de coordination act-*info*-FOS et des statistiques annuelles 2015 sous forme de tableaux commentés. Durant l'année écoulée, 502 admissions et 477 sorties ont été consignées.

### Les principaux résultats de 2015 en bref

Sexe	Les femmes constituent 24 % de la clientèle.
Âge	L'âge moyen en début de traitement est de 33 ans.
Nationalité	76 % de la clientèle est de nationalité suisse. La deuxième nationalité la plus représentée est la nationalité italienne, qui représente 5 % des personnes interrogées.
Parcours thérapeutique	Au début du traitement, 92 % de la clientèle a déjà suivi un ou plusieurs traitements : 93 % pour des problèmes de drogues, 24 % pour des problèmes d'alcool ; 84 % ont suivi une ou plusieurs cures de sevrage ; 59 % ont pris de la méthadone à titre substitutif, 57 % ont suivi un traitement en résidentiel et 52 % ont consulté en ambulatoire.
Substitution	41 % des clients et clientes qui entament le traitement résidentiel suivent un traitement de substitution. Le taux est de 52 % pour les femmes.
Motif incitant à entamer le traitement	58 % des clients et clientes indiquent comme motif thérapeutique leur volonté d'abstinence et leur souhait de mener une vie exempte de drogues et d'addiction. 19 % désirent une structuration de leur journée pour retrouver un mode de vie réglé, « normal » et meilleur.
Logement	Durant les 6 mois précédant le début du traitement, 24 % des clients et clientes habitent le plus souvent seuls, 19 % logent chez leurs parents ou chez l'un ou l'autre de leurs parents, 16 % avec leur partenaire et 15 % en établissement résidentiel thérapeutique ou en foyer.
Relation de couple et enfants	Avant le début du traitement, 48 % des clients et clientes ne sont pas dans une relation de couple. Les femmes ont plus souvent un partenaire que les hommes, et celles qui ont un partenaire vivent plus souvent que les hommes (35 %) avec un partenaire ayant des problèmes de drogues (70 %). 32 % des clients et clientes sont parents. Seuls 12 % vivent avec leur(s) enfant(s).
Formation	Pour 39 % des clients et clientes, le niveau de formation le plus élevé atteint au moment de l'admission est un apprentissage.
Revenu et travail	Durant le semestre qui précède le traitement, 43 % des clients et clientes ont pour revenu principal l'aide sociale, 18 % une rente et 13 % leur propre revenu. Avant leur admission, 31 % ne sont pas actifs sur le marché de l'emploi (sans espoir de trouver un emploi), 14 % sont incapables de travailler (AI/ indemnité journalière), 12 % cherchent du travail et 22 % ont un emploi.
Dettes	Au moment de leur admission, 23 % des clients et clientes n'ont pas de dettes, 22 % ont des dettes de 25 000 francs et plus.
Condamnation	58 % de la clientèle a déjà fait l'objet d'une condamnation exécutoire, 52 % a déjà été en

et mesure pénale ou administrative	prison et/ou en détention préventive, ces taux étant plus élevés pour les hommes que pour les femmes (56 % contre 41 %). Le plus souvent, la condamnation sanctionne une infraction à la loi sur les stupéfiants, un délit commis dans le but de se procurer des stupéfiants ou commis sous influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Pour 22 % des clients et clientes, une mesure judiciaire est à l'origine du traitement.
Consommation: substance et âge	Le <i>problème principal</i> de la clientèle sont les opioïdes pour 30 %, la cocaïne (crack inclus) pour 28 %, l'alcool pour 18 % et le cannabis pour 15 %. Les clients et clientes pour qui le cannabis pose problème sont le groupe le plus jeune : ils sont âgés de 25 ans en moyenne au moment de leur admission. Les clients et clientes pour qui l'alcool est un problème ont 35 ans en moyenne au début du traitement ; cet âge est de 34 ans pour les personnes ayant pour problème principal les opioïdes et pour ceux à qui la cocaïne pose problème. L'âge moyen au début de la consommation régulière est de 20 ans pour les personnes pour qui l'alcool est un problème, de 21 ans pour ceux ayant les opioïdes comme problème principal, de 22 ans pour les personnes pour qui la cocaïne est un problème et de 16 ans pour ceux à qui le cannabis pose problème. Parmi les personnes dont le problème principal est l'alcool, 63 % ont consommé la substance qui leur pose le plus problème chaque jour et 12 % de 4 à 6 jours par semaine au cours des 6 derniers mois. Pour celles confrontées avant tout au problème des opioïdes, 48 % ont consommé chaque jour et 15 % de 4 à 6 jours par semaine. Pour celles faisant face surtout à la cocaïne et à ses dérivés, 40 % ont consommé chaque jour et 15 % de 4 à 6 jours par semaine. Pour celles pour qui le cannabis pose le problème principal, 76 % ont consommé chaque jour et 9 % de 4 à 6 jours par semaine.
Consommation: autres substances problématiques	D'autres substances que la substance la plus problématique sont épineuses pour la clientèle : les personnes confrontées avant tout au problème de <i>l'alcool</i> mentionnent la cocaïne, le cannabis, l'héroïne et les benzodiazépines comme autres substances posant problème. Les clients et clientes qui ont les <i>opioïdes</i> pour problème principal signalent la cocaïne, le cannabis, les benzodiazépines et l'alcool comme autres substances problématiques. Pour les personnes pour qui la <i>cocaïne</i> constitue le problème principal, le cannabis, l'alcool, l'héroïne et les benzodiazépines sont autant de problèmes supplémentaires. Les clients et clientes pour qui le <i>cannabis</i> est le problème majeur citent comme autres substances problématiques l'alcool, la cocaïne, les amphétamines, MDMA/substances similaires et LSD. Tous les groupes considèrent le tabac comme étant une substance problématique.
Polytoxico-manie	49 % des clients et clientes présentent des troubles liés à l'utilisation de drogues multiples selon le CIM-10. Une association de drogues souvent citée est l'association des opioïdes et de la cocaïne (14 %).
Objectif en ce qui concerne la consommation	76 % des clients et clientes visent l'abstinence définitive. Pour 93 % des personnes pour qui le problème principal sont les opioïdes, l'objectif en ce qui concerne la consommation est l'abstinence définitive. Il en va de même pour 89 % des personnes avec la cocaïne pour problème principal et pour 56 % de celles pour qui l'alcool pose le principal problème.
Consommation: Comportements liés à l'injection	Parmi les 45 % de clients et clientes qui ont déjà consommé des drogues par injection, 67 % l'ont fait au cours des douze mois précédant le début de la thérapie, et 47 % dans les 30 jours qui précèdent l'admission. Parmi les personnes qui ont déjà consommé par injection, 34 % signalent avoir partagé des seringues ou des aiguilles avec d'autres (prévalence tout au long de la vie). Parmi les 30 % qui ont partagé le matériel d'injection au cours des 12 derniers mois, 47 % l'ont fait dans les 30 derniers jours. L'âge moyen de la première injection est de 22 ans.
Santé	88 % des clients se sont déjà soumis à un test de dépistage du VIH, dont 69 % dans les 12 derniers mois, avec un résultat positif dans 3 % des cas. 85 % ont passé un test de dépista-

	ge de l'hépatite C, dont 75 % dans les 12 derniers mois. Le résultat était positif dans 29 % des cas (dont 8 % dans les 12 derniers mois).
Mode de sortie et traitement à la sortie	<p>29 % de la clientèle a achevé le traitement selon les termes convenus <i>sans</i> transfert, 14 % l'a achevé comme prévu pour passer dans un établissement de traitement des addictions. Au total, 43 % a terminé la thérapie comme convenu. Pour 48 % des personnes, le traitement a été interrompu soit par le client soit par l'institution traitante. Parmi les personnes qui passent à un autre suivi, 48 % ont rejoint un appartement protégé, 21 % suivent un traitement en milieu résidentiel et 21 % aussi vont dans une structure de jour ou clinique de jour.</p> <p>Les personnes qui ont achevé le traitement selon les termes convenus (qu'elles passent ou non à un autre suivi) ont suivi un traitement de 468 jours en moyenne, une durée plus longue que pour les personnes dont le traitement a été interrompu (172 jours) ; 40 % des clients et clientes ont suivi un traitement de substitution pendant leur traitement résidentiel et pour 35 %, un traitement de substitution était prévu après la sortie. Pour 55 % des clients et clientes, un suivi post-cure était prévu, le plus souvent sous forme de consultations dans des centres de conseil pour les problèmes liés aux drogues et des services de postcure.</p>
Logement à la sortie	À leur sortie, 25 % des clients vivent seuls, 19 % logent dans leur famille d'origine (chez leurs parents ou chez l'un ou l'autre de leurs parents notamment) ; 17 % vivent dans un centre de traitement ou un foyer et 11 % avec leur partenaire (avec ou sans enfants). 55 % enfin sont logés de manière stable.
Relation de couple	59 % des clients et clientes ne sont pas en relation de couple à la sortie. La proportion des hommes (64 %) est significativement plus élevée que celle des femmes (40 %).
Source de revenu à la sortie	À leur sortie, 53 % des personnes ont pour source de revenu principale l'aide sociale, 19 % leur propre revenu et 15 % une rente. Une différence très significative apparaît en corrélation avec le mode de sortie : à leur sortie, 28 % des personnes ayant achevé leur traitement vivent principalement de leur propre activité lucrative, contre 3 % de celles dont le traitement a été interrompu.
Travail à la sortie	<p>À leur sortie, 39 % des clients et clientes ne sont pas actifs sur le marché de l'emploi (y compris les catégories sans perspective d'en trouver un, rente, incapacité de travail, sans «sans travail mais en recherche d'un emploi»); 21 % ont un emploi, 20 % sont en recherche d'emploi et 10 % en formation.</p> <p>La clientèle dont le traitement s'est terminé comme prévu est active sur le marché de l'emploi de façon significativement plus fréquente que celle dont la thérapie a été interrompue (taux respectifs de 34 % et 5 %).</p>
Dettes	À leur sortie, 18 % seulement de la clientèle n'est pas endettée. 22 % des clients et clientes ont des dettes allant de 25 001 à 100 000 francs ou plus.
Mesures, procédures en cours et décisions à la sortie	Une mesure pénale ou administrative, telle que poursuite d'une mesure, assistance de probation et exécution d'une peine suspendue, attend 26 % des clients et clientes à leur sortie. Une procédure attend 17 % de la clientèle, le plus souvent en raison d'infractions à la loi sur les stupéfiants ou de vols. Pour 22 %, une décision administrative ou judiciaire devient exécutoire.
Consommation avant la sortie	7 % des clients et clientes dont le problème principal sont les opioïdes et 7 % des clients dont la cocaïne et ses dérivés pose le problème principal ont consommé quotidiennement ou à 4-6 jours par semaine. De façon prévisible, les personnes dont le traitement se termine comme convenu ont consommé significativement moins souvent leur principale substance posant problème que celles dont le traitement s'est interrompu.
Pronostic à la sortie	Pour 39 % des clients et clientes, un pronostic bon à très bon est établi au moment de leur sortie en ce qui concerne leur problème d'addiction.



Le chapitre thématique des rapports annuels act-*info*-FOS est supprimé en raison des importantes mesures d'économie que l'OFSP a prises s'agissant du système de monitoring act-*info*.

### Activités en 2015

En 2015, le Service de coordination act-*info*-FOS a de nouveau travaillé dans le cadre de l'équipe du projet de statistiques nationales d'aide aux personnes dépendantes act-*info*. Cette équipe vise à améliorer la diffusion du monitoring et des produits act-*info* ainsi qu'à améliorer le potentiel d'utilisation d'act-*info*. act-*info* porte sur *les traitements*. Avec d'autres statistiques qui portent sur l'addiction, elle fournit des informations de base permettant d'apprécier l'addiction et son évolution en Suisse.

En 2015, les données act-*info* et les questionnaires ont été largement utilisés. Le service de coordination act-*info*-FOS...

- a apporté son appui aux institutions FOS pour rassembler les documents et données utiles à la thématique.
- a répondu aux questions posées par les institutions FOS sur l'interprétation des données et des statistiques et sur leur approche.
- a réalisé pour des institutions FOS des évaluations spécifiques.
- a conseillé des institutions FOS pour la planification de projets de recherche.
- a participé à des contributions d'institutions FOS destinées à la publication.
- a présenté, dans le cadre d'une rencontre organisée par une institution FOS sur le thème du développement organisationnel, des données FOS et des réflexions sur l'évolution de la clientèle.
- a participé à des enquêtes, notamment dans le cadre d'une thèse de doctorat (jurisprudence) portant sur les bases juridiques nécessaires à la réalisation de registres médicaux et à l'utilisation et à l'exploitation des données ainsi enregistrées («Rechtliche Anforderungen bei der Realisierung von medizinischen Registern sowie Verwendung und Weiternutzung der registrierten Gesundheitsdaten»).
- a calculé pour l'OFSP certaines données chiffrées portant sur le traitement résidentiel de la toxicomanie. Ces documents servaient à répondre à des demandes de politiciens et politiciennes.
- a proposé des spécialistes de l'addiction pour des formations internes organisées par divers établissements résidentiels offrant des traitements de l'addiction.
- a apporté son appui à des étudiants en leur fournissant des chiffres concernant les traitements des addictions dans un cadre résidentiel en Suisse.

*Perspectives:* Le Service de coordination act-*info*-FOS poursuivra son action dans le cadre du projet global act-*info* ainsi que sa participation au développement du système de monitoring national act-*info*. Ces travaux ciblent l'amélioration du taux de couverture d'act-*info*, une meilleure utilisation d'act-*info* et de ses produits par l'OFSP et par tout canton intéressé, étant précisé qu'ils se déroulent dans un contexte de coupes budgétaires.

Le Service de coordination act-*info*-FOS prévoit de réaliser en Suisse alémanique un projet («SMS-gestützte Nachsorge und Monitoring nach stationärer Suchttherapie») de prévention des rechutes s'adressant à la clientèle à sa sortie d'un établissement de traitement. Ce projet de suivi médical post-cure s'appuie sur les SMS (voir le chapitre 2.5 «Perspectives»). Le lancement du projet est reporté d'une année compte tenu des exigences élevées de la commission d'éthique.

La publication d'«Éclairages», l'infolettre d'act-*info*, doit être suspendue pour cause de coupes budgétaires. Les publications de cette série figurant à l'adresse suivante:

<http://tinyurl.com/phra4wy>.

## 2 Rapport d'activités 2015

### 2.1 Personnel du Service de coordination act-info-FOS

Au cours de l'année 2015, les personnes suivantes ont pris part aux projets act-info-FOS ou du Service de coordination act-info-FOS à l'Institut suisse de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF) :

- Susanne Schaaf, lic. psychologie: responsable du projet Documentation de base act-info-FOS, directrice de recherche dans le domaine des traitements résidentiels de la toxicomanie
- Heidi Bolliger: collaboratrice de projet, secrétariat du Service de coordination act-info-FOS
- Andreas Wenger, MSc psychologie: appui informatique et statistique

### 2.2 Centres participants

En 2015, 41 établissements font partie d'act-info-FOS: 30 sont en Suisse alémanique (dont un situé au Tessin), 8 sont en Suisse romande (dont un établissement germanophone dans le canton du Jura) et 3 sont des centres italophones dans le canton du Tessin. 38 établissements ont remis des questionnaires de leur clientèle pour évaluation. Un établissement a quitté la Ligue en 2015 après avoir changé de groupe cible.

#### 2.2.1 Liste des centres participant à act-info-FOS en 2015


AG	Institut für Sozialtherapie, Sozialtherapeutische Klinik, 5704 Egliswil
	Inst. für Sozialtherapie, Stiftung, Reha.zentrum Niederlenz, 5702 Niederlenz
	Klinik im Hasel, 5728 Gontenschwil
AR	Best Hope, 9104 Waldstatt/Herisau
	RehabilitationsZentrum Lutzenberg, 9426 Lutzenberg
BE	Chly Linde, Therapeutische Gemeinschaft, 3089 Vorderfultigen
	Projekt Alp, Familienplatzierung, Münsingen
	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft Bordei, 6657 Palagnedra (TI)
	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft Brienzwiler, 3856 Brienzwiler
	Stiftung Terra Vecchia, Familienplätze, 3011 Bern
	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft Melchenbühl, 3073 Gümligen
	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft Saurehorn, 3054 Schüpfen
	suchttherapiebärn, 3006 Bern
BL	Rütihus Krisenstation Wohnheim, 4402 Frenkendorf

FR	Foyer Horizon, Fondation Le Tremplin, 1783 Pensier
	Le Radeau, Centre d'Accueil communautaire, 1693 Orsonnens
JU	Clos-Henri, Centre de traitement pour personnes dépendantes, 2714 Le Prédame
LU	Akzent Prävention und Suchttherapie, Therapiezentrum Ausserhofmatt , 6105 Schachen
	Akzent Prävention und Suchttherapie, Therapiezentrum Lehn, 6012 Obernau/Kriens
	Novizonte (anciennement Neuhof), Therapeutische Gemeinschaft, 6020 Emmenbrücke
SO	casa fidelio, 4626 Niederbuchsiten
	Chratten, Therapeutische Gemeinschaft, 4229 Oberbeinwil
	Lilith, Zentrum für Frauen und Kinder, 4625 Oberbuchsiten
TI	Centro Residenziale a medio termine, 6516 Gerra Piano
	Il Gabbiano, Fondazione, Comunità terapeutica, 6904 Lugano (jusqu'en mai 2015)
	Villa Argentina, Centro terapeutico, 6900 Lugano
VD	Fondation Bartimée, 1422 Grandson
	Fondation Le Levant (Couvét, Pichollette), 1005 Lausanne
	Foyer du Relais, Association du Relais, 1110 Morges
VS	Foyer Rives du Rhône (via LVT), 1951 Sion
	CAAD, 1907 Saxon
ZG	Sennhütte, Fachinstitution für Suchttherapie, 6300 Zug
ZH	Arche Therapie Bülach, 8180 Bülach
	Suchtbehandlung Frankental, Stationäre Therapie, 8049 Zürich
	Freihof Küsnacht, sozialtherapeutische Einrichtung, 8700 Küsnacht
	Meilestei, 8124 Uessikon bei Maur
	Neuthal, Therapeutische Gemeinschaft, 8344 Bäretswil
	Quellenhof, 8546 Gundetswil
	Rehazentrum Sunedörfli, 8816 Hirzel
	start again, Zentrum für Suchttherapie, 8032 Zürich
	Ulmenhof, Sozialtherapie, 8913 Ottenbach

Au cours de la période sous revue, le Service de coordination act-*info*-FOS a reçu des «Données relatives à l'institution» actualisées (questionnaire sur les institutions, version 3.2) concernant 38 des 41 centres de traitement: 42 % (16) sont des centres de traitement résidentiel traitant exclusivement des problèmes liés aux substances *illégales*, 26 % (10) accueillent des clients et clientes dont les problèmes sont liés à tout type de substance, 26 % (10) traitent des problèmes de *dépendance* divers (liés ou non à des substances) et 5 % (2) traitent des problèmes de dépendance tout en assurant d'autres fonctions.

Dans 34 % des institutions (13), il est possible de suivre un traitement de sevrage complet ou partiel. Parmi les établissements, 42 % comportent jusqu'à 12 places (16), 29 % entre 13 et 20 places (11) et 29 % plus de 20 places (11) (illustration 1).

Illustration 1: Ventilation en fonction du nombre de places de l'institution



### 2.3 Activités du Service de coordination act-info-FOS dans le cadre de la statistique de base

En 2015, les activités principales du Service de coordination act-info-FOS auront été la participation aux travaux de l'équipe du projet de système de monitoring national act-info (2.3.1) ainsi que des rencontres, rapports et publications (cf. chap. 2.3.2). Étant donné que quelques institutions continuent à collecter leurs données sur papier, les travaux de routine tels que l'enregistrement et le codage des questionnaires remplis ainsi que l'organisation de la saisie des données sont restés des tâches centrales. Enfin, dans le cadre des statistiques de base, il a également fallu assurer l'apurement des données, la coordination de toutes les activités au sein d'act-info-FOS et la communication des renseignements concernant le recueil des données et les rapports.

L'amélioration du taux de couverture de la statistique act-info-FOS constitue une tâche permanente. Fin 2015, 50 établissements au total offrent un traitement de la toxicomanie en milieu résidentiel. Ce nombre sert de référence au calcul du taux de couverture. Fin 2015 toujours, 41 des 50 établissements participent à la Ligue, soit 82 %. Ce résultat peut être qualifié de très bon puisque la participation à la statistique est facultative.

Tab. 1: Taux de couverture act-info-FOS

Établissements (chiffres de fin 2015)	Nombre d'établissements
Groupe des établissements déjà membres d'act-info-FOS	
Établissements act-info-FOS qui fournissent régulièrement des données	38
Établissements act-info-FOS qui ne fournissent pas régulièrement de données	3
Groupe des établissements dont le profil correspond à act-info-FOS mais qui déclinent expressément toute participation	
Établissements non intéressés	2
Groupe des établissements dont le profil correspond à act-info-FOS et dont l'intérêt n'est pas encore défini	
Établissements à l'intérêt encore non défini	7
<b>Total des établissements résidentiels de traitement des addictions</b>	<b>50</b>
<b>Nombre d'établissements participants (sans les institutions intéressées et membres potentiels)</b>	<b>41</b>

Une enquête concernant l'occupation des établissements a été menée le 30 septembre 2014 dans les secteurs act-info. Le jour de l'enquête, 54 établissements de traitement des dépendances dans un cadre résidentiel (drogues illégales; sans la clinique Im Hasel, qui fait partie du secteur Residalc) accueillait 715 personnes en thérapie (les personnes avec des problèmes de drogues de la clinique Im Hasel étant incluses). Au jour de référence, 44'000 clients et clientes environ étaient suivis pour traitement ou consultation dans les cinq secteurs de traitement act-info: HeGeBe, act-info-FOS, act-info-Residalc SAMBAD et la Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone.

### 2.3.1 Participation dans l'équipe du monitoring national d'aide aux personnes dépendantes act-info

L'équipe du projet de statistiques nationales d'aide aux personnes dépendantes act-info<sup>1</sup>, à laquelle appartient la direction du projet act-info-FOS, a terminé l'évaluation complète des données act-info 2014 au cours de l'année de référence. Le rapport act-info 2014 peut être commandé gratuitement en version reliée, ou téléchargé sous <http://tinyurl.com/phra4wy>

<sup>1</sup> act-info comprend les domaines partiels suivants: traitements résidentiels des dépendances à l'alcool et aux médicaments (act-info-Residalc: Marina Delgrande Jordan); traitements résidentiels des dépendances aux drogues illégales (act-info-FOS: Susanne Schaafl); aide psycho-sociale ambulatoire en cas de problèmes de dépendance (SAMBAD: Etienne Maffli); statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone (Etienne Maffli ad interim); traitements avec prescription d'héroïne (HeGeBe: Michelle Dey). Pour plus d'informations sur le projet global act-info: [www.act-info.ch](http://www.act-info.ch) ou [www.isgf.ch](http://www.isgf.ch) (>act-info-FOS).

### 2.3.2 Rencontres, rapports et publications

#### **L'évolution de la dépendance aux opiacés à la lumière des premières prises en charge:**

Voilà le titre du numéro de février 2016 de l'infolettre «Éclairages» d'act-info. L'intérêt du public pour la problématique de la consommation d'opiacés en Suisse a diminué depuis la fermeture des scènes ouvertes de la drogue, ceci en raison de l'efficacité des différentes offres thérapeutiques et de l'évolution du rôle joué par cette substance. Basé sur les données act-info, ce numéro d'Eclairages montre que l'incidence des prises en charge (c'est-à-dire le nombre des toutes premières prises en charge) de personnes ayant les opiacés pour principal problème a reculé entre 2006 et 2013. Toutefois, la consommation d'opiacés demeure un thème d'importance pour la société, principalement en raison des risques élevés qui lui sont associés, du caractère souvent chronique du parcours des usagers et de l'intensité requise des efforts de traitement. La présente contribution d'Eclairages décrit en outre les caractéristiques des personnes qui ont pour la toute première fois demandé une aide spécialisée pour des problèmes liés principalement aux opiacés. Lien: <http://tinyurl.com/phra4wy>

#### **Évolutions de la clientèle avec des problèmes d'addiction et défis institutionnels («Veränderungen des Suchtklientels und die institutionellen Herausforderungen»):**

Le 19 juin 2015, Susanne Schaaf a présenté, lors de la **journée de la SDSS qui s'est tenue à Olten** («Oltner Tagung des Schweizerischen Dachverbandes Stationäre Suchttherapie SDSS»), l'évolution de 2003 à 2014 de la clientèle des centres résidentiels de traitement, en mettant en avant les défis actuels et futurs qui se posent pour les traitements résidentiels. Les exposés (en allemand) de la journée sont disponibles pour téléchargement à l'adresse <http://sdss.ch/tagungen>.

#### **Drug Addiction Treatment in Prison and Judicial Measures in Treatment - Switzerland («Traitement de la dépendance aux drogues en prison et mesures judiciaires en lien avec le traitement: le cas de la Suisse»):**

Dans le cadre d'une visite d'une semaine en Suisse de ce groupe, Susanne Schaaf a reçu le 20 novembre 2015, un groupe d'experts d'Estonie, composé d'une dizaine de personnes, agents de probation et collaborateurs du ministère de la justice de Tallin. Elle a présenté les résultats de la recherche portant sur le traitement des addictions en prison (programmes avec prescription de méthadone ou d'héroïne) d'une part et les mesures judiciaires liées au traitement ambulatoire ou résidentiel des addictions en Suisse. Elle a également expliqué l'approche spécifique de la thérapie centrée sur le délit dans le cadre d'un traitement résidentiel.

## Rapports, publications, conférences

Schaaf, Susanne (2015): Der Forschungsverbund stationäre Suchttherapie act-info-FOS im Jahr 2014. Tätigkeitsbericht und Jahresstatistik - Berufliche Integration von Klientinnen und Klienten in stationärer Suchttherapie. Zürich, ISGF, Nr. 358

Schaaf, S (2015): Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie act-info-FOS en 2014. rapport d'activités et statistiques annuelles globales - Intégration professionnelle des clients et clientes en traitement résidentiel de la toxicomanie. Zurich, ISGF, no. 361

## 2.4 Autres projets

En 2015, le Service de coordination act-info-FOS s'est engagé dans d'autres projets, parfois coordonnés avec act-info-FOS et parfois distincts, mais qui étaient exclusivement ou essentiellement liés au domaine de l'aide en matière de dépendance dispensée dans le secteur résidentiel.

### 2.4.1 Autres projets act-info-FOS

**Documentation de la clientèle des centres de désintoxication dans le canton d'Argovie:** La description de la clientèle des centres de sevrage du canton d'Argovie, effectuée dans le cadre du controlling cantonal, a également été réalisée en 2015. Comme les années précédentes, les données ont été saisies en ligne au moyen d'un questionnaire court et compatible avec act-info. L'évaluation des données a été remise tous les trimestres au mandant.

**Petits projets et mandats de conseil donnés par des institutions ou des cantons:** En 2015, certaines institutions et autorités nous ont mandatés pour un conseil ou une position ou dans le cadre d'un petit projet, le plus souvent pour évaluer de manière ciblée des données existantes (pour des évaluations pluriannuelles, des thèmes particuliers). Des évaluations ne sont remises à des autorités qu'avec l'accord des institutions concernées pour l'exploitation des données.

### 2.4.2 Autres projets globaux

Aucun projet transsectoriel (QuaTheSI par exemple) n'a été réalisé en 2015.

## 2.5 Perspectives

Dans le cadre du projet global act-info, le Service de coordination act-info-FOS continuera d'être intégré à l'équipe de projet et de participer au développement du système de monitoring national. Le contexte est celui d'une coupe budgétaire d'un quart dans le financement des statistiques partielles. L'OFSP élabore actuellement avec un institut externe une nouvelle conception du système de monitoring act-info.

Au niveau d'act-info-FOS, la poursuite de la statistique partielle sur les thérapies résidentielles est garantie.



De plus, des analyses spécifiques sont effectuées à la demande d'institutions de thérapie (p. ex. comparaison pluriannuelle du profil de la clientèle d'une institution) et des réflexions sont engagées sur une utilisation plus large des données d'act-info-FOS.

Le Centre de coordination act-info-FOS élabore un programme de suivi médical post-cure qui utilise les SMS. D'une durée de six mois, ce projet prévu en Suisse alémanique vise à étudier deux types d'interventions différentes utilisées pour la prévention des rechutes auprès de la clientèle qui sort d'un établissement résidentiel de traitement des addictions ou de l'alcoolisme (en Suisse alémanique). A ce jour, les programmes de suivi médical post-cure utilisant les SMS qui ont été réalisés dans d'autres domaines thérapeutiques ont prouvé leur efficacité. Les établissements ont été informés et invités à y participer. Prévu pour 2015/2016, le projet a été repoussé d'un an compte tenu des exigences élevées et nombreuses de la commission d'éthique de Zurich et de swissmedic.

### 3 Statistiques sur la clientèle act-info-FOS – Méthodologie

La Ligue act-info-FOS produit une documentation nationale, en continu, de la clientèle des établissements thérapeutiques résidentiels et de l'évaluation du séjour qui y est fait. Pour ce faire, des informations sont recueillies au moment de l'admission de la clientèle et au moment de leur sortie, sur des sujets tels que leur situation sociale (logement, travail, etc.), leur consommation de drogues, leur santé ou encore leur situation juridique.

Ces relevés nationaux sur la clientèle des établissements de traitement résidentiel des toxicomanies en Suisse sont effectués depuis 1995 sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et dépouillés annuellement. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2003, act-info-FOS emploie les questionnaires act-info.

#### 3.1 Instruments et collecte des données

Depuis janvier 2013, les données sont recueillies au moyen de la version révisée 4.1. La collecte des questionnaires se fait dans les centres participant à l'enquête act-info-FOS. Le client est interrogé par un collaborateur du centre de traitement, si possible dans les deux semaines qui suivent son admission. Le questionnaire de sortie est rempli dès lors qu'un client ou une cliente cesse la thérapie, selon les termes convenus ou non, qu'il passe à un autre traitement ou qu'il s'installe en appartement protégé. Le questionnaire de sortie est également rempli par un membre de l'équipe, mais pas forcément dans le cadre d'une enquête auprès de la clientèle. En effet, en raison des sorties non prévues (interruptions), cela s'avère souvent impossible. Les personnes participant à la recherche disposent d'un manuel et de l'appui téléphonique du Service de coordination act-info-FOS.

### Règles concernant la protection des données

Dans le cadre du projet global *act-info*, la protection des données est garantie par un procédé de chiffrement multiple élaboré selon les standards de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Dans un premier temps, les différents *établissements thérapeutiques* attribuent un code personnel à chaque client selon des règles uniformes. Ce code, qui se compose de quatre lettres, accompagne les données qui sont transmises à l'Institut suisse de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF). Un deuxième chiffrement intervient au *niveau de l'ISGF*, avant que les données de base ne soient intégrées sous forme totalement anonymisée dans la base de données nationale de l'OFSP. Chaque série de données est automatiquement chiffrée à l'aide du code personnel ainsi que d'autres données par un système à double clé (clé personnelle de 16 caractères et clé de session de 256 caractères). Un troisième chiffrement, réalisé au moyen d'une clé annuelle, est effectué à l'OFSP dans la base de données nationale.

L'utilisation de la base de données de l'ISGF, qui rassemble les variables du noyau et des modules, est réservée au Service de coordination *act-info-FOS*. Les objectifs convenus doivent être respectés et la protection des données est garantie, conformément à la législation. Toute tierce personne (canton, autres instituts de recherche) qui souhaite obtenir un accès à cette banque de données doit effectuer une demande préalable en ce sens et obtenir l'accord des institutions concernées.

### 3.2 Saisie électronique et contrôle des données

En 2015, 27 institutions ont saisi leurs données en ligne, totalisant ainsi une majorité de questionnaires (71 %). Les questionnaires adressés au Service de coordination *act-info-FOS* sous forme papier ont été saisis informatiquement à l'aide du logiciel DataPool par le service de coordination *act-info-FOS*.

La saisie des données avec le logiciel DataPool, qui constitue en même temps une banque de données centrale d'administration et d'enregistrement des épisodes de traitement, s'accompagne de premiers contrôles (p. ex. pas de réponses multiples aux questions simples, vérification des données de base d'un épisode de traitement à l'ouverture du questionnaire). Le logiciel DataPool procède à d'autres vérifications de routine qui permettent de s'assurer de la cohérence et de l'exhaustivité des réponses données aux questions-clés.

### 3.3 Préparation des données

Grâce aux procédures de contrôle intégrées dans DataPool, les données sont de grande qualité avant même leur transfert dans le programme SPSS. Là où cela était nécessaire, des vérifications de plausibilité supplémentaires ont été effectuées et les réponses manquantes ou non valables définies (*missing data*). Enfin, les recodages nécessaires au chapitre consacré aux tableaux ont été entrepris.

### 3.4 Echantillons 2015

Les données ont été collectées régulièrement auprès de tous les clients et clientes entrés et sortis des centres act-*info*-FOS. L'évaluation 2015 se base sur 502 questionnaires d'entrée et 477 questionnaires de sortie. Près de deux tiers des questionnaires proviennent de Suisse alémanique, un bon quart de Suisse romande, et les autres d'établissements italophones du canton du Tessin (tableau 2). Le taux relativement faible de retour des questionnaires suisses romands s'explique notamment par le fait qu'en 2015, trois établissements n'en ont pas renvoyé.

Tableau 2: Base de données pour le rapport annuel 2015

Région linguistique	ENTREES 2015		SORTIES 2015	
	N	%	N	%
Suisse alémanique *	319	64 %	317	67 %
Suisse romande	143	29 %	120	25%
Suisse italienne *	40	8%	40	8 %
<b>TOTAL Suisse</b>	<b>502</b>	<b>101 %**</b>	<b>477</b>	<b>100 %</b>

\*Les centres de langue allemande se trouvant au Tessin sont comptabilisés ici avec la Suisse alémanique.

\*\* Erreur due à l'arrondissement

## 4 Annexe aux tableaux : tableaux des entrées et sorties 2015

Le chapitre des tableaux comprend les chiffres correspondant à la plupart des questions des questionnaires d'entrée et de sortie se rapportant aux données 2015, ventilés par sexe. Les numéros indiqués entre parenthèses dans les titres des tableaux renvoient aux questions des questionnaires d'entrée et de sortie (version E/A4.1).

Les réponses aux différentes questions sont indiquées dans les tableaux en chiffres absolus et en chiffres relatifs. Des données sur les valeurs statistiques existent en partie : Cramer's V et niveaux de signification correspondants :  $p < 0.05$  (\*),  $p < 0.01$  (\*\*),  $p < 0.001$  (\*\*\*)).

Ci-dessous, quelques notions aidant la lecture :

- **Total** : le nombre de cas. Ce nombre n'est pas toujours identique au total des entrées ou des sorties, puisque par exemple, certaines questions ne sont pertinentes que pour une partie des personnes interviewées.
- **Missing** : par rapport au total des personnes pour lesquelles il existe des données, le missing donne le nombre de cas (personnes) pour lesquels il n'existe pas de réponse valable ou pas de réponse du tout.
- **Nombre de personnes** : dans une question avec réponses multiples, il est indiqué le nombre de personnes qui ont donné des réponses (possibilité de plusieurs réponses par personne).
- **Réponses** : dans une question avec réponses multiples, on est intéressé de savoir comment les différentes rubriques d'une question ont été nommées.
- **Réponses %** : dans une question avec réponses multiples, on indique les parts de pourcentage par rubrique par rapport au total de toutes les réponses.
- **Personnes %** : dans une question avec réponses multiples, on indique les parts de pourcentage par rubrique par rapport au nombre de personnes qui ont donné des réponses. Ces parts de pourcentage sont généralement plus élevées que pour les réponses %, car les réponses % comprennent des réponses multiples.
- **Moyenne (valeur moyenne)** : moyenne arithmétique (moyenne) des valeurs visant une certaine rubrique (par ex. durée de séjour moyenne).
- **Standard deviation (déviat ion standard)** : mesure pour la dispersion des valeurs autour de la moyenne : plus petit est l'écart standard, plus grande est l'homogénéité des réponses par rapport à la moyenne. Par conséquent, l'échantillon de réponse est d'autant plus hétérogène que l'écart standard est plus grand.
- **Médiane** : valeur des réponses à une certaine catégorie qui se trouve au milieu (50 % des personnes interviewées ont des valeurs plus élevées, 50 % plus basses).
- **Percentiles (quartile)** : le percentile 25 désigne la valeur par rapport à laquelle 25 % des personnes ont une valeur plus basse et 75 % des personnes une valeur plus élevée ; le percentile 75 désigne la valeur par rapport à laquelle 25 % des personnes ont une valeur plus élevée et 75 % des personnes plus basse.

## 4.1 Tableaux des entrées et des sorties 2015

Tableaux des entrées 2015 .....	1
0 Données relatives aux clients et clientes .....	1
A Cadre de la prise en charge.....	7
B Données sociodémographiques.....	13
C Consommations et dépendance.....	24
D Santé.....	52
Tableaux des sorties 2015 .....	1
0 Données relatives aux clients et clientes .....	1
A Cadre de la prise en charge.....	3
B Données sociodémographiques.....	11
C Consommations et dépendances.....	20
D Pronostic .....	33

## TABLEAUX act-info-FOS ENTRÉES 2015

### 0 DONNÉES RELATIVES AUX CLIENT-E-S

L'évaluation des entrées enregistrées en 2015 se base sur **502 questionnaires** valablement remplis. Ces 502 entrées correspondent à **485 personnes** : au cours de l'année de référence 2015, 468 clients et clientes ont été admis une fois dans un établissement act-info-FOS, 17 personnes deux fois. Les tableaux suivants se réfèrent au nombre des entrées.

#### 0.1 Source des informations (vmed100)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
informations fournies par le client/la cliente	279	77,7%	71	71,0%	350	76,3%
informations fournies par l'intervenant-e	80	22,3%	29	29,0%	109	23,7%
Total	359	100,0%	100	100,0%	459	100,0%
Missing	24		19		43	

0.2 Les femmes représentent 24% des personnes interrogées.

#### 0.2 Sexe (vmec010 )

	TOTAL act-info-FOS	
	n	%
hommes	383	76,3%
femmes	119	23,7%
Total	502	100,0%
Missing	0	

0.3 Le taux de femmes dans les institutions va de 23 à 25% selon les régions linguistiques.

#### 0.3 Nombre de client-e-s selon la région linguistique (institution)

	Suisse alémanique		Romandie		Tessin		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%	n	%
hommes	244	76,7%	108	75,5%	30	75,0%	383	76,3%
femmes	74	23,3%	35	24,5%	10	25,0%	119	23,7%
Total	318	100,0%	143	100,0%	40	100,0%	502	100,0%
Missing	0		0		0		1	

**0.4 Âge, catégorisé selon les conventions act-info (standards OFS) (vmec020)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
jusqu` à 14 ans	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-19 ans	25	6,5%	12	10,1%	37	7,4%
20-24 ans	51	13,3%	23	19,3%	74	14,7%
25-29 ans	81	21,1%	21	17,6%	102	20,3%
30-34 ans	73	19,1%	15	12,6%	88	17,5%
35-39 ans	59	15,4%	19	16,0%	78	15,5%
40-44 ans	58	15,1%	7	5,9%	65	12,9%
45-49 ans	26	6,8%	15	12,6%	41	8,2%
50-54 ans	8	2,1%	6	5,0%	14	2,8%
55-59 ans	2	0,5%	1	0,8%	3	0,6%
60-64 ans	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
65-69 ans	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
70-74 ans	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
75 ans et plus	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	383	100,0%	119	100,0%	502	100,0%
Missing	0		0		0	

**0.5** 58 % des personnes en traitement résidentiel ont 30 ans et plus (tab. 0.5). Au début du traitement, la moyenne d'âge des hommes est de 32,6 ans. Les femmes ont 32,0 ans en moyenne (tab. 0.6).

**0.5 Âge, catégorisé selon les conventions act-info-FOS (vmec020)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
jusqu` à 19 ans	25	6,5%	12	10,1%	37	7,4%
20-24 ans	51	13,3%	23	19,3%	74	14,7%
25-29 ans	81	21,1%	21	17,6%	102	20,3%
30-39 ans	132	34,5%	34	28,6%	166	33,1%
40 ans et plus	94	24,5%	29	24,4%	123	24,5%
Total	383	100,0%	119	100,0%	502	100,0%
Missing	0		0		0	

**0.6 Statistique: Âge, moyenne (vmec020)**

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviat ion standard	Valid Cases
hommes	32,59	31,00	15,00	59,00	8,83	383
femmes	32,01	31,00	15,00	55,00	10,45	119
Total	32,45	31,00	15,00	59,00	9,23	502

**0.7 État civil (vmec040)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
célibataire	310	84,5%	81	71,7%	391	81,5%
marié-e	7	1,9%	8	7,1%	15	3,1%
séparé-e (juridiquement)	12	3,3%	5	4,4%	17	3,5%
divorcé-e	35	9,5%	19	16,8%	54	11,3%
veuf/veuve	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
partenariat enregistré (PaCS)	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Total	367	100,0%	113	100,0%	480	100,0%
Missing	16		6		22	



## Domicile

.....

### 0.8a Nombre de client-e-s selon le domicile canton (vmec030c)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
AG	35	9,6%	7	6,2%	42	8,8%
AI	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
AR	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
BE	36	9,8%	20	17,7%	56	11,7%
BL	12	3,3%	2	1,8%	14	2,9%
BS	16	4,4%	5	4,4%	21	4,4%
FR	19	5,2%	4	3,5%	23	4,8%
GE	12	3,3%	3	2,7%	15	3,1%
GL	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
GR	5	1,4%	2	1,8%	7	1,5%
JU	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LU	28	7,7%	9	8,0%	37	7,7%
NE	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
NW	4	1,1%	2	1,8%	6	1,3%
OW	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
SG	18	4,9%	3	2,7%	21	4,4%
SH	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SO	10	2,7%	5	4,4%	15	3,1%
SZ	5	1,4%	0	0,0%	5	1,0%
TG	4	1,1%	0	0,0%	4	0,8%
TI	30	8,2%	9	8,0%	39	8,1%
UR	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
VD	58	15,8%	16	14,2%	74	15,4%
VS	12	3,3%	7	6,2%	19	4,0%
ZG	3	0,8%	1	0,9%	4	0,8%
ZH	55	15,0%	17	15,0%	72	15,0%
Total	366	100,0%	113	100,0%	479	100,0%
Missing	17		6		23	

villes de moyenne importance: > 100 000 habitants

petites villes: < 100 000 habitants

villes isolées: > 10'000 habitants

**0.8b Degré d'urbanité (vmec030a)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
grands centres urbains Zurich, Bâle, Genève	37	10,2%	9	8,1%	46	9,7%
periphérie des trois grands centres urbains	37	10,2%	18	16,2%	55	11,7%
villes de moyenne importance	83	23,0%	36	32,4%	119	25,2%
petites villes	120	33,2%	27	24,3%	147	31,1%
campagne	84	23,3%	21	18,9%	105	22,2%
Total	361	100,0%	111	100,0%	472	100,0%
Missing	22		8		30	

**Nationalité**

.....

**0.9a** 76% de la clientèle est de nationalité suisse. Le plus grand groupe d'étrangers est composé par les personnes de nationalité italienne (5%).

**0.9a Nationalité alphabétique (vnec050)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
Suisse	276	74,8%	94	81,0%	370	76,3%
Afghanistan	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Afrique du Sud	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Albanie	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
Algérie	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
Allemagne	8	2,2%	5	4,3%	13	2,7%
Autriche	1	0,3%	1	0,9%	2	0,4%
Bosnie-Herzégovine	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
Brésil	1	0,3%	1	0,9%	2	0,4%
Croatie	1	0,3%	1	0,9%	2	0,4%
Espagne	5	1,4%	1	0,9%	6	1,2%
France	10	2,7%	0	0,0%	10	2,1%
Grèce	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Hongrie	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
Île Maurice	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Iran	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Iraq	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Italie	24	6,5%	2	1,7%	26	5,4%
Kenya	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
Kosovo	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
Maroc	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Monténégro	1	0,3%	4	3,4%	5	1,0%
Nigeria	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
Pays-Bas	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
Portugal	10	2,7%	0	0,0%	10	2,1%
Rép. Tchèque	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Russie	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
Serbie	6	1,6%	1	0,9%	7	1,4%
Somalie	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%

(Fort.)

**0.9a Nationalité alphabétique (vnec050)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
Thaïlande	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Tunisie	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Turquie	6	1,6%	1	0,9%	7	1,4%
Ukraine	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Total	369	100,0%	116	100,0%	485	100,0%
Missing	14		3		17	

**0.9b Nationalité, regroupée (vnec050)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
Suisse	276	74,8%	94	81,0%	370	76,3%
Europe de l'Ouest ou du Nord, UE	19	5,1%	7	6,0%	26	5,4%
Europe du Sud: Italie	24	6,5%	2	1,7%	26	5,4%
Europe du Sud: Espagne et Portugal	15	4,1%	1	0,9%	16	3,3%
Europe de l'Est ou du Sud-Est	25	6,8%	8	6,9%	33	6,8%
Nationalités restantes	10	2,7%	4	3,4%	14	2,9%
Total	369	100,0%	116	100,0%	485	100,0%
Missing	14		3		17	

**0.9c Nationalité, regroupée sans Suisse (vnec050)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
Europe de l'Ouest ou du Nord, UE	19	20,4%	7	31,8%	26	22,6%
Europe du Sud: Italie	24	25,8%	2	9,1%	26	22,6%
Europe du Sud: Espagne et Portugal	15	16,1%	1	4,5%	16	13,9%
Europe de l'Est ou du Sud-Est	25	26,9%	8	36,4%	33	28,7%
Nationalités restantes	10	10,8%	4	18,2%	14	12,2%
Total	93	100,0%	22	100,0%	115	100,0%
Missing	290		97		387	

**0.10 Nationalité, catégorisée (vnec050)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
Suisse	276	74,8%	94	81,0%	370	76,3%
Union européenne	63	17,1%	11	9,5%	74	15,3%
Autre	30	8,1%	11	9,5%	41	8,5%
Total	369	100,0%	116	100,0%	485	100,0%
Missing	14		3		17	

## A CADRE DE LA PRISE EN CHARGE

**A1** La majorité des personnes en traitement résidentiel (92%) a déjà suivi un ou plusieurs traitements avant son admission de 2015.

### A1 Traitements antérieurs (vneb050x-e)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non	27	7,3%	10	8,6%	37	7,6%
oui	343	92,7%	106	91,4%	449	92,4%
Total	370	100,0%	116	100,0%	486	100,0%
Missing	13		3		16	

**A2** 93% des personnes ont déjà suivi un traitement pour des problèmes de drogues, 24% un traitement pour des problèmes d'alcool.

### A2 Raison: sous-groupe: traitements antérieurs oui (plusieurs réponses: vneb050a-e)

		Sexe		TOTAL
		hommes	femmes	
oui, pour problèmes liés à l'alcool	réponses	79	27	106
	personnes %	18,2%	6,2%	24,4%
oui, pour problèmes liés aux drogues	réponses	312	91	403
	personnes %	71,9%	21,0%	92,9%
oui, pour problèmes liés aux médicaments	réponses	40	19	59
	personnes %	9,2%	4,4%	13,6%
oui, pour problèmes liés au tabac	réponses	3	2	5
	personnes %	0,7%	0,5%	1,2%
oui, pour troubles comparables à une dépendance	réponses	24	8	32
	personnes %	5,5%	1,8%	7,4%
Total	réponses	458	147	605
	réponses %	77,0%	23,0%	100,0%
	nombre de personnes	334	100	434
	personnes %	105,5%	33,9%	139,4%
Missing		9	6	15

**A3** 84% de la clientèle ayant déjà suivi un (ou plusieurs) traitement(s) ont déjà suivi une ou plusieurs cures de sevrage, 59% un programme de substitution, 57% un traitement résidentiel et 52 % ont suivi un traitement ambulatoire.

**A3 Types de traitements antérieurs, sous-groupe: traitements antérieurs oui (plusieurs réponses: vneb060a-i)**

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
traitement avec prescription d'héroïne	réponses	18	4	22
	personnes %	4,0%	0,9%	4,9%
substitution: méthadone, Subutex®, etc.	réponses	200	63	263
	personnes %	44,7%	14,1%	58,8%
autre traitement médicamenteux des dépendances	réponses	42	17	59
	personnes %	9,4%	3,8%	13,2%
prise en charge/thérapie ambulatoire	réponses	183	50	233
	personnes %	40,9%	11,2%	52,1%
prise en charge dans une structure de jour ou clinique de jour	réponses	43	16	59
	personnes %	9,6%	3,6%	13,2%
traitement résidentiel	réponses	193	62	255
	personnes %	43,2%	13,9%	57,0%
sevrage	réponses	289	88	377
	personnes %	64,7%	19,7%	84,3%
groupe d'entraide ou d'auto-support	réponses	21	9	30
	personnes %	4,7%	2,0%	6,7%
autre(s)	réponses	6	2	8
	personnes %	1,3%	0,4%	1,8%
Total	réponses	995	311	1306
	réponses %	76,3%	23,7%	100,0%
	nombre de personnes	341	106	447
	personnes %	222,6%	69,6%	292,2%
Missing		2	0	2

## Cures de sevrage

.....

**A4** 27% des clients et clientes ont déjà entrepris plus de trois tentatives de sevrage avec suivi professionnel.

### A4 Cure(s) de sevrage avec accompagnement professionnel (vzee010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
aucune	75	20,4%	23	20,2%	98	20,4%
une fois	81	22,1%	19	16,7%	100	20,8%
deux fois	53	14,4%	11	9,6%	64	13,3%
trois fois	38	10,4%	11	9,6%	49	10,2%
quatre fois	26	7,1%	6	5,3%	32	6,7%
cinq fois	14	3,8%	8	7,0%	22	4,6%
six fois ou plus	54	14,7%	22	19,3%	76	15,8%
cure de sevrage oui, nombre exact est inconnu	26	7,1%	14	12,3%	40	8,3%
Total	367	100,0%	114	100,0%	481	100,0%
Missing	91		28		119	

**A5** 60% de la clientèle est passée d'une cure de sevrage au traitement résidentiel actuel.

### A5 Transfert d'une cure de sevrage (vzee050)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non	145	40,6%	42	38,2%	187	40,0%
oui, même institution	37	10,4%	7	6,4%	44	9,4%
oui, autre institution	175	49,0%	61	55,5%	236	50,5%
Total	357	100,0%	110	100,0%	467	100,0%
Missing	26		9		35	

## Traitement de substitution

.....

**A6** 57% des clients et clientes ont déjà suivi un programme de substitution (y compris avec héroïne) (2014: 56%). L'âge moyen au début du traitement de substitution est de 25 ans. Les hommes ont commencé leur premier traitement de substitution en moyenne à l'âge de 25 ans, soit significativement plus tard que les femmes (à 22 ans en moyenne (tab. **A7**,  $p < .01$ )).

### A6 Déjà suivi un traitement de substitution (méthadone; prescription d'héroïne) (vneb065)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non, jamais	150	42,9%	47	42,7%	197	42,8%
oui	200	57,1%	63	57,3%	263	57,2%
Total	350	100,0%	110	100,0%	460	100,0%
Missing	33		9		42	

### A7 Statistique: Âge au début du premier traitement de substitution (vneb066)

	Moyenne	Médiane	min	max	Dévi- ation standard	Valid Cases
hommes	25,17	24,00	14,00	48,00	5,98	156
femmes	22,15	21,50	13,00	40,00	5,42	40
Total	24,56	23,00	13,00	48,00	5,98	196

**A8** 41% des clients et clientes suivent encore un programme de substitution en parallèle au moment où ils entament le traitement résidentiel. La proportion des femmes (52 %) est significativement plus importante que celle des hommes (38%) ( $\chi^2 = 12$ ,  $p < .01$ ).

### A8 Actuellement dans un programme de substitution ou de prescription d'héroïne (vmeb070)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non	221	62,4%	51	48,1%	272	59,1%
oui	133	37,6%	55	51,9%	188	40,9%
Total	354	100,0%	106	100,0%	460	100,0%
Missing	29		13		42	

**A9** Le produit de substitution principal est la méthadone (77%). Autres opioïdes: p.ex. la buprénorphine (Temgesic®, Subutex®) (21%); autres substances: p.ex. la naltrexone (Naltrexin®).

**A9 Quel programme de substitution ou prescription d'héroïne (vmeb075)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
héroïne	1	0,8%	2	3,8%	3	1,6%
méthadone	102	77,9%	39	73,6%	141	76,6%
autres opioïdes (p.ex. la buprénorphine)	28	21,4%	10	18,9%	38	20,7%
autres substances (p.ex. la naltrexone)	0	0,0%	2	3,8%	2	1,1%
Total	131	100,0%	53	100,0%	184	100,0%
Missing	2		2		4	

**Contribution à l'admission par ...**

.....

**A10** Pour 29% de la clientèle une institution spécialisée dans les problèmes d'addiction a été déterminante pour le début du traitement, 30% ont engagé le traitement principalement de leur propre initiative ou sur l'initiative de leur famille ou de leurs amis. Pour 20% c'était une mesure pénale ou administrative et pour 13 % des autres services médicales, sociales ou de santé ont été déterminante.

**A10 Contribution à l'admission par... (vneb080)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
condamnation/ mesure pénale ou administrative/ autorités judiciaires/ police	80	22,1%	15	14,2%	95	20,3%
cabinet médical	14	3,9%	8	7,5%	22	4,7%
autre institution spécialisée dans les addictions	100	27,6%	34	32,1%	134	28,6%
autre service médical, social, ou de santé	39	10,8%	23	21,7%	62	13,2%
institution formatrice ou éducative	2	0,6%	1	0,9%	3	0,6%
aucun-e instance ou professionnel-le impliqué-e: employeur	3	0,8%	0	0,0%	3	0,6%
aucun-e instance ou professionnel-le impliqué-e: initiative personnelle, famille, amis, etc.	117	32,3%	23	21,7%	140	29,9%
autre	7	1,9%	2	1,9%	9	1,9%
Total	362	100,0%	106	100,0%	468	100,0%
Missing	21		13		34	



## Motif à la base de la thérapie

.....

**A11** 58 % des clients et clientes indiquent avoir été motivés pour entamer le traitement par leur volonté d'abstinence et par leur souhait de vivre sans drogue ni addiction. 19 % souhaitent une structure de jour, de la stabilité ainsi qu'une vie réglée (journées structurées), normale et meilleure. Il est possible de donner plusieurs réponses à cette question.

### A11 Motif à la base de la thérapie (plusieurs réponses: vyey020a-n)

		Sexe		TOTAL act-info- FOS
		hommes	femmes	
abstinence, vie sans drogue et addiction	réponses	169	53	222
	personnes %	44,0%	13,8%	57,8%
vie normale et réglée, journées structurées, stabilité	réponses	68	6	74
	personnes %	17,7%	1,6%	19,3%
intégration professionnelle, formation, apprentissage	réponses	47	6	53
	personnes %	12,2%	1,6%	13,8%
santé (physique, psychique), problèmes de santé	réponses	28	9	37
	personnes %	7,3%	2,3%	9,6%
autonomie, indépendance dans la vie	réponses	19	4	23
	personnes %	4,9%	1,0%	6,0%
connaissance de soi, travail sur soi-même	réponses	18	4	22
	personnes %	4,7%	1,0%	5,7%
nouveau départ, nouvelle vie, changer sa vie	réponses	21	10	31
	personnes %	5,5%	2,6%	8,1%
trouver le sens de sa vie; joie de vivre; être heureux	réponses	5	0	5
	personnes %	1,3%	0,0%	1,3%
mesure	réponses	16	6	22
	personnes %	4,2%	1,6%	5,7%
son propre enfant/ses propres enfants; être une bonne mère, un bon père, ne pas perdre la famille	réponses	15	20	35
	personnes %	3,9%	5,2%	9,1%
intégration dans la société	réponses	12	3	15
	personnes %	3,1%	0,8%	3,9%
fonder une famille	réponses	2	0	2
	personnes %	0,5%	0,0%	0,5%
améliorer les relations avec la famille ou le/la partenaire	réponses	26	2	28
	personnes %	6,8%	0,5%	7,3%
autres motifs	réponses	27	10	37
	personnes %	7,0%	2,6%	9,6%
Total	réponses	473	133	606
	réponses %	77,1%	22,9%	100,0%
	nombre de personnes	296	88	384
	personnes %	123,2%	34,6%	157,8%
Missing		87	31	118

## B DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

**B1** 31% des clients et clientes étaient principalement à l'hôpital ou en clinique durant les 30 jours précédant le début du traitement, 14% étaient en institution thérapeutique ou un foyer, 14% des clients étaient en prison, 14% logeaient chez leurs parents ou chez l'un des deux et 13% vivaient seuls.

### B1 Ménage avec qui (principalement, au cours des 30 jours précédant l'admission) (vnec060)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
seul-e en menage	52	13,9%	13	11,4%	65	13,3%
avec la famille d'origine	49	13,1%	17	14,9%	66	13,5%
avec un-e partenaire (avec ou sans enfants)	16	4,3%	18	15,8%	34	7,0%
avec des amis ou d'autres personnes (sans relation de parenté)	16	4,3%	3	2,6%	19	3,9%
en prison	61	16,3%	6	5,3%	67	13,7%
institution thérapeutique, foyer	55	14,7%	15	13,2%	70	14,3%
hôpital, clinique	116	30,9%	36	31,6%	152	31,1%
autre: membres de la parenté	10	2,7%	6	5,3%	16	3,3%
autre: dans la rue	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre: divers	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	375	100,0%	114	100,0%	489	100,0%
Missing	8		5		13	

**B2** Au cours des 6 mois précédant le début de la thérapie, 24% des clients et clientes vivaient principalement seuls; 19% logeaient chez leurs parents ou chez l'un des deux, 16% avec un-e partenaire et 15% dans une institution thérapeutique ou un foyer.

### B2 Ménage avec qui (principalement, au cours des 6 mois précédant l'admission) (vnec065)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
seul-e en menage	95	25,8%	19	16,7%	114	23,7%
avec la famille d'origine	75	20,4%	17	14,9%	92	19,1%
avec un-e partenaire (avec ou sans enfants)	46	12,5%	30	26,3%	76	15,8%
avec des amis ou d'autres personnes (sans relation de parenté)	22	6,0%	10	8,8%	32	6,6%
en prison	46	12,5%	4	3,5%	50	10,4%
institution thérapeutique/ foyer	52	14,1%	19	16,7%	71	14,7%
hôpital/ clinique	15	4,1%	9	7,9%	24	5,0%
autre	17	4,6%	6	5,3%	23	4,8%
Total	368	100,0%	114	100,0%	482	100,0%
Missing	15		5		20	

**B3** Au cours des 30 jours précédant le début du traitement, 31% des clients et clientes avaient un logement stable, 47% vivaient en institution thérapeutique ou un foyer. Au cours des 6 mois précédant le début du traitement, 38% de la clientèle avaient un logement stable et 32% étaient en institution thérapeutique ou un foyer (tab. **B4**).

**B3 Type de domicile (au cours des 30 jours précédant l'admission) (vnec070)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
situation de logement stable	107	28,5%	47	40,5%	154	31,4%
situation de logement instable et/ou sdf	30	8,0%	8	6,9%	38	7,7%
en prison	60	16,0%	6	5,2%	66	13,4%
institution thérapeutique/ foyer/hôpital/clinique	176	46,9%	53	45,7%	229	46,6%
autre	2	0,5%	2	1,7%	4	0,8%
Total	375	100,0%	116	100,0%	491	100,0%
Missing	8		3		11	

**B4 Type de domicile (au cours des 6 mois précédant l'admission) (vnec075)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
situation de logement stable	84	35,4%	34	44,2%	118	37,6%
situation de logement instable et/ou sdf	35	14,8%	9	11,7%	44	14,0%
en prison	46	19,4%	4	5,2%	50	15,9%
institution thérapeutique/ foyer/hôpital/clinique	72	30,4%	28	36,4%	100	31,8%
autre	0	0,0%	2	2,6%	2	0,6%
Total	237	100,0%	77	100,0%	314	100,0%
Missing	146		42		188	

## Relations

.....

**B5** 32% des clients et clientes ont des enfants. Seulement 12% habitent avec leur(s) enfant(s) (tab. **B7**).

**B5 Avez-vous des enfants (biologiques ou adoptés)? (vnec067)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non, aucun	263	72,9%	64	54,7%	327	68,4%
oui	98	27,1%	53	45,3%	151	31,6%
Total	361	100,0%	117	100,0%	478	100,0%
Missing	22		2		24	

**B6 Nombre d'enfants sous-groupe: enfants oui (vzes030)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
1 enfant	71	74,0%	28	57,1%	99	68,3%
2 enfants	15	15,6%	12	24,5%	27	18,6%
3 enfants ou plus	10	10,4%	9	18,4%	19	13,1%
Total	96	100,0%	49	100,0%	145	100,0%
Missing	2		4		6	

**B7 Habitez-vous avec votre enfant/ vos enfants? (vne068)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non	90	93,8%	36	76,6%	126	88,1%
oui	6	6,3%	11	23,4%	17	11,9%
Total	96	100,0%	47	100,0%	143	100,0%
Missing	2		6		8	

**B8** 48% des clients n'étaient pas en couple les 6 mois précédant le début du traitement. La proportion de femmes seules (29%) durant cette période est significativement plus basse que celle des hommes (54%; Cr's V=.26; p <.000). Parmi les personnes ayant une relation stable, 48% indiquent que leur partenaire a également connu des problèmes d'addiction au cours des 6 mois précédant le début de leur traitement (tab. **B9**). Le (ou la) partenaire d'une femme vivant en couple est significativement plus souvent lui-même dépendant d'une drogue (70%) que celle (ou celui) d'un homme (35%; Cr's V = .33; p <.000 ; sans tableau).

**B8 Type de relation de couple (au cours des 6 mois précédant l'admission) (vzes010)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
sans partenaire	194	53,7%	32	28,6%	226	47,8%
relation(s) temporaire(s)	65	18,0%	18	16,1%	83	17,5%
partenaire fixe en vivant séparé-e	59	16,3%	28	25,0%	87	18,4%
partenaire fixe en ménage commun	43	11,9%	34	30,4%	77	16,3%
Total	361	100,0%	112	100,0%	473	100,0%
Missing	22		7		29	

**B9 Problèmes de dépendance du partenaire, sous-groupe: partenaire fixe (vzes015)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non	61	64,9%	17	30,4%	78	52,0%
oui	33	35,1%	39	69,6%	72	48,0%
Total	94	100,0%	56	100,0%	150	100,0%
Missing	8		6		14	

## Formation

.....

**B10** À leur admission, 41% des clients et clientes disposent d'une formation professionnelle de base ou d'un apprentissage.

**B10 Formation achevée avec obtention d'un certificat ou d'un diplôme (plusieurs réponses: vnc120y-vnc120h)**

		Sexe		TOTAL act- info-FOS
		hommes	femmes	
aucune ou école obligatoire inachevée	réponses	35	13	48
	personnes %	7,5%	2,8%	10,3%
école obligatoire	réponses	275	81	356
	personnes %	58,9%	17,3%	76,2%
formation de transition	réponses	35	12	47
	personnes %	7,5%	2,6%	10,1%
formation générale sans maturité	réponses	16	2	18
	personnes %	3,4%	0,4%	3,9%
formation professionnelle de base et apprentissage	réponses	162	31	193
	personnes %	34,7%	6,6%	41,3%
maturité ou école normale	réponses	9	5	14
	personnes %	1,9%	1,1%	3,0%
formation professionnelle supérieure	réponses	9	5	14
	personnes %	1,9%	1,1%	3,0%
haute école spécialisée et université	réponses	5	3	8
	personnes %	1,1%	0,6%	1,7%
doctorat et habilitation	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
Total	réponses	546	152	698
	réponses %	77,1%	22,9%	100,0%
	nombre de personnes	360	107	467
	personnes %	116,9%	32,5%	149,5%
Missing		23	12	35

**B11** À leur admission, 39% des clients et clientes disposent d'une formation professionnelle de base ou d'un apprentissage (niveau de formation le plus élevé), 36% ont achevé l'école obligatoire.

**B11 Niveau de formation le plus élevé (avec obtention d'un certificat ou d'un diplôme) (vnec12a-vnec120h)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
aucune ou école obligatoire inachevée	33	9,2%	11	10,3%	44	9,4%
école obligatoire	122	33,9%	46	43,0%	168	36,0%
formation de transition	22	6,1%	8	7,5%	30	6,4%
formation générale sans maturité	11	3,1%	0	0,0%	11	2,4%
formation professionnelle de base et apprentissage	154	42,8%	30	28,0%	184	39,4%
maturité ou école normale	5	1,4%	4	3,7%	9	1,9%
formation professionnelle supérieure	8	2,2%	5	4,7%	13	2,8%
haute école spécialisée et université	5	1,4%	3	2,8%	8	1,7%
Total	360	100,0%	107	100,0%	467	100,0%
Missing	23		12		35	

## Principale source de revenu

.....

**B12** L'aide sociale était la source principale de revenu de 49% des clients et clientes au cours des 30 jours précédant le début du traitement. Pour 19%, le revenu principal provenait d'une rente et pour 7% d'une activité lucrative.

**B12 Principale source de revenu (au cours des 30 jours précédant l'admission) (vnec080)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
salaires	26	7,1%	9	8,0%	35	7,3%
économies	9	2,5%	0	0,0%	9	1,9%
rente (AVS, AI, autres types de prévoyance)	53	14,5%	37	32,7%	90	18,8%
aide sociale	184	50,3%	51	45,1%	235	49,1%
assurance-chômage	9	2,5%	3	2,7%	12	2,5%
soutien partenaire	2	0,5%	1	0,9%	3	0,6%
soutien parents, autres membres de la famille, ami-e-s	29	7,9%	6	5,3%	35	7,3%
deal, petit trafic	9	2,5%	0	0,0%	9	1,9%
autres revenus illég.	4	1,1%	1	0,9%	5	1,0%
prostitution	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
assurance d'indemnités journalières	11	3,0%	2	1,8%	13	2,7%
autre: détention préventive, emprisonnement	21	5,7%	1	0,9%	22	4,6%
autre: justice	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
autre: div.	8	2,2%	2	1,8%	10	2,1%
Total	366	100,0%	113	100,0%	479	100,0%
Missing	17		6		23	

**B13** Pour 43% de la clientèle, la source principale de revenu au cours des 6 mois précédant l'admission était l'aide sociale, pour 18%, le revenu principal provenait d'une rente et pour 13% d'une activité lucrative.

**B13 Principale source de revenu (au cours des 6 mois précédant l'admission) (vnec090)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
salaire	51	13,9%	12	10,6%	63	13,1%
économies	7	1,9%	0	0,0%	7	1,5%
rente (AVS, AI, autres types de prévoyance)	52	14,1%	35	31,0%	87	18,1%
aide sociale	159	43,2%	47	41,6%	206	42,8%
assurance-chômage	13	3,5%	4	3,5%	17	3,5%
soutien partenaire	2	0,5%	1	0,9%	3	0,6%
soutien parents, autres membres de la famille, ami-e-s	24	6,5%	5	4,4%	29	6,0%
deal, petit trafic	21	5,7%	2	1,8%	23	4,8%
autres revenus illég.	5	1,4%	1	0,9%	6	1,2%
prostitution	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
assurance d'indemnités journalières	9	2,4%	2	1,8%	11	2,3%
autre: détention préventive, emprisonnement	18	4,9%	1	0,9%	19	4,0%
autre: justice	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
autre: div.	5	1,4%	2	1,8%	7	1,5%
Total	368	100,0%	113	100,0%	481	100,0%
Missing	15		6		21	

## Activité rémunératrice

.....

**B14** Pendant les 30 jours précédant l'admission, 37% des personnes n'avaient pas de travail (car sans espoir d'en trouver un), 16% étaient en incapacité de travail (AI, indemnités journalières), 13% étaient sans activité lucrative mais en recherche d'emploi et 12% travaillaient à temps partiel ou à temps plein ou avaient des emplois occasionnels.

### B14 Activité rémunératrice (au cours des 30 jours précédant l'admission) (vnec100)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
à plein temps (70% ou plus) (même si congé maladie de courte durée)	34	9,3%	5	4,5%	39	8,1%
à temps partiel (même si congé maladie de courte durée)	5	1,4%	2	1,8%	7	1,5%
jobs occasionnels (sans emploi fixe)	7	1,9%	4	3,6%	11	2,3%
en formation (école, études, apprentissage)	9	2,5%	6	5,4%	15	3,1%
sans travail, en quête	49	13,4%	11	9,8%	60	12,5%
sans travail, sans recherche car sans espoir d'en trouver un	146	39,8%	32	28,6%	178	37,2%
rentier, rentière (retraite, AVS, économies)	10	2,7%	3	2,7%	13	2,7%
incapacité de travail (AI, indemnités journalières)	48	13,1%	30	26,8%	78	16,3%
femme, homme au foyer	1	0,3%	4	3,6%	5	1,0%
autre: atelier protégé, mesure pour soutenir l'emploi, stage	5	1,4%	4	3,6%	9	1,9%
autre: détention préventive, emprisonnement	32	8,7%	2	1,8%	34	7,1%
autre: institution	10	2,7%	3	2,7%	13	2,7%
autre: aide sociale	1	0,3%	3	2,7%	4	0,8%
autre: div.	10	2,7%	3	2,7%	13	2,7%
Total	367	100,0%	112	100,0%	479	100,0%
Missing	16		7		23	



**B15** Au cours des 6 mois précédant leur admission, 31 % des clients et clientes n'avaient pas d'activité professionnelle (car sans espoir d'en trouver un), 14% étaient en incapacité de travail (AI, indemnités journalières) et 12% étaient en recherche d'emploi, 22% avaient une activité professionnelle (plein temps, temps partiel ou emplois occasionnels).

**B15 Activité rémunératrice (au cours des 6 mois précédant l'admission) (vnec110)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
à plein temps (70% ou plus) (même si congé maladie de courte durée)	56	15,1%	9	8,0%	65	13,4%
à temps partiel (même si congé maladie de courte durée)	15	4,0%	7	6,2%	22	4,5%
jobs occasionnels (sans emploi fixe)	18	4,8%	3	2,7%	21	4,3%
en formation (école, études, apprentissage)	13	3,5%	8	7,1%	21	4,3%
sans travail, en quête	49	13,2%	8	7,1%	57	11,8%
sans travail, sans recherche car sans espoir d'en trouver un	120	32,3%	31	27,4%	151	31,1%
rentier, rentière (retraite, AVS, économies)	10	2,7%	3	2,7%	13	2,7%
incapacité de travail (AI, indemnités journalières)	40	10,8%	29	25,7%	69	14,2%
femme, homme au foyer	1	0,3%	4	3,5%	5	1,0%
autre: atelier protégé, mesure pour soutenir l'emploi, stage	6	1,6%	4	3,5%	10	2,1%
autre: détention préventive, emprisonnement	28	7,5%	1	0,9%	29	6,0%
autre: institution	8	2,2%	2	1,8%	10	2,1%
autre: aide sociale	1	0,3%	3	2,7%	4	0,8%
autre: div.	7	1,9%	1	0,9%	8	1,6%
Total	372	100,0%	113	100,0%	485	100,0%
Missing	11		6		17	

**B16** 23% des clients et clientes ne sont pas endettés au début du traitement; 22% ont des dettes supérieures à 25 000 francs.

**B16 Dettes au moment de l'admission (vyef040)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
dettes pour un montant inconnu	47	14,0%	23	24,0%	70	16,2%
aucune dette	66	19,6%	35	36,5%	101	23,4%
jusqu'à 5000 CHF	43	12,8%	6	6,3%	49	11,3%
de 5001 à 10 000 CHF	42	12,5%	8	8,3%	50	11,6%
de 10 001 à 25 000 CHF	61	18,2%	8	8,3%	69	16,0%
de 25 001 à 50 000 CHF	41	12,2%	7	7,3%	48	11,1%
de 50 001 à 100 000 CHF	18	5,4%	4	4,2%	22	5,1%
plus de 100 000 CHF	18	5,4%	5	5,2%	23	5,3%
Total	336	100,0%	96	100,0%	432	100,0%
Missing	47		23		70	

## Situation juridique: mesures , procédures en cours, décisions

**B17** 58% de la clientèle a déjà fait l'objet d'une condamnation. La proportion est significativement plus basse pour les femmes (50%) que pour les hommes (61%; Cr' V=.09, p<.05).

### B17 Condamnation pénale en lien avec l'alcool et/ou les drogues? (vyer010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non, aucune condamnation	140	39,1%	52	50,0%	192	41,6%
oui	218	60,9%	52	50,0%	270	58,4%
Total	358	100,0%	104	100,0%	462	100,0%
Missing	25		15		40	

**B18** 76% des clients et clientes condamnés l'ont été pour des infractions liées aux stupéfiants. Cette catégorie comprend la production, la possession, la diffusion, l'importation et l'exportation de drogues. 48% de la clientèle a été condamnée pour des délits commis dans le but de se procurer des stupéfiants, tels que le vol, le recel, la falsification d'ordonnance et le brigandage. 44% a été condamnée pour des infractions commises sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments (p. ex. infractions routières, dommages corporels). Il est possible de donner plusieurs réponses à cette question.

### B18 Condamnation pénale pour..., sous-groupe: déjà été condamné-e (plusieurs réponses: vyer011a-e)

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
suspension de la procédure au profit de mesures	réponses	10	0	10
	personnes %	3,9%	0,0%	3,9%
infraction à la loi sur les stupéfiants (p.ex. production, possession, ...)	réponses	159	37	196
	personnes %	61,4%	14,3%	75,7%
infractions dans le but de se procurer des drogues (p.ex. vol, recel, fraude)	réponses	104	19	123
	personnes %	40,2%	7,3%	47,5%
infractions commises sous l'influence de l'alcool, de drogues, de médicaments	réponses	97	17	114
	personnes %	37,5%	6,6%	44,0%
autres délits	réponses	33	5	38
	personnes %	12,7%	1,9%	14,7%
Total	réponses	403	78	481
	réponses %	81,5%	18,5%	100,0%
	nombre de personnes	211	48	259
	personnes %	155,6%	30,1%	185,7%
Missing		7	4	11

**B19** 52% des clients et clientes ont déjà été en prison et/ou en détention préventive. Les femmes (41 %) sont plutôt moins nombreuses que les hommes (56 %) dans ce cas (Cr'sV=.09, p<.05)

**B19 Emprisonnement ou détention préventive (vzer020 )**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui, emprisonnement	55	15,8%	14	13,9%	69	15,3%
oui, détention préventive	55	15,8%	12	11,9%	67	14,9%
oui, emprisonnement et détention préventive	85	24,4%	15	14,9%	100	22,2%
non, jamais	154	44,1%	60	59,4%	214	47,6%
Total	349	100,0%	101	100,0%	450	100,0%
Missing	34		18		52	

**B20 Durée du séjour en prison/détention préventive, sous-groupe: déjà en prison/détention (vzer030)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
jusqu`à 1 mois	8	11,3%	5	31,3%	13	14,9%
1 à 2 mois	8	11,3%	2	12,5%	10	11,5%
plus de 2 jusqu`à 6 mois	19	26,8%	6	37,5%	25	28,7%
plus de 6 jusqu`à 12 mois	11	15,5%	2	12,5%	13	14,9%
plus de 12 mois	25	35,2%	1	6,3%	26	29,9%
Total	71	100,0%	16	100,0%	87	100,0%
Missing	124		25		149	

**B21** Pour 22% des clients et clientes, une mesure pénale ou administrative est à l'origine du traitement. Suspension de la procédure (renoncement à infliger une peine, réprimande art. 19a ch. 2 LStup y compris). Les hommes (24 %) sont plus nombreux que les femmes (15%) à commencer le traitement en raison d'une mesure (Cr'sV=09,p<.05).

**B21 Le traitement est-il consécutif à une mesure judiciaire? (vyer040)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non, pas de mesure	272	75,8%	92	85,2%	364	77,9%
suspension de la procédure	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
oui, consécutif à une mesure	87	24,2%	16	14,8%	103	22,1%
Total	359	100,0%	108	100,0%	467	100,0%
Missing	24		11		35	

**B22** Pour 70% des clients et clientes, les bases juridiques sont des traitements institutionnels des addictions au sens de l'article 60 CP. 20% ont reçu une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 CP.

**B22 De quelle mesure judiciaire s'agit-il? sous-groupe: mesures (plusieurs réponses: vyer041a-g)**

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
abandon de la poursuite pénale en cas de soumission à des mesures de protection contrôlées par un médecin (art. 19a ch. 3 LStup)	réponses	2	0	2
	personnes %	2,0%	0,0%	2,0%
mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP)	réponses	16	4	20
	personnes %	16,0%	4,0%	20,0%
traitement résidentiel des addictions (art. 60 CP)	réponses	63	7	70
	personnes %	63,0%	7,0%	70,0%
prise en charge ambulatoire	réponses	2	2	4
	personnes %	2,0%	2,0%	4,0%
placement dans une institution pour jeunes adultes	réponses	6	2	8
	personnes %	6,0%	2,0%	8,0%
en attente d'un jugement	réponses	8	0	8
	personnes %	8,0%	0,0%	8,0%
autre	réponses	3	3	6
	personnes %	3,0%	3,0%	6,0%
Total	réponses	100	18	118
	réponses %	84,0%	16,0%	100,0%
	nombre de personnes	84	16	100
	personnes %	100,0%	18,0%	118,0%
Missing		3	0	3

## C CONSOMMATIONS et DÉPENDANCE

### C1 Problème principal: substance ou comportement comparable à une dépendance (vmed005)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
substance(s)	370	99,5%	110	98,2%	480	99,2%
comportement comparable à une dépendance	2	0,5%	2	1,8%	4	0,8%
Total	372	100,0%	112	100,0%	484	100,0%
Missing	11		7		18	

**C2** Lorsqu'on leur demande quelles substances leur posent problème au début du traitement, 58% des clients et clientes répondent la cocaïne, 48% l'héroïne, 46% l'alcool, et 22% des benzodiazépines hors prescription. Pour 50% des personnes, le cannabis pose également problème, et le tabac est une substance problématique pour 53%.

### C2 Quelles substances sont un problème pour vous (incl. principale substance)? (plusieurs réponses: VNED070y-kd)

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
aucune substance n'est un problème	réponses	4	3	7
	personnes %	0,8%	0,6%	1,4%
alcool	réponses	170	55	225
	personnes %	34,6%	11,2%	45,7%
héroïne (sans prescription)	réponses	180	54	234
	personnes %	36,6%	11,0%	47,6%
méthadone (sans prescription)	réponses	44	13	57
	personnes %	8,9%	2,6%	11,6%
buprénorphine (sans prescription)	réponses	4	2	6
	personnes %	0,8%	0,4%	1,2%
fentanyl (sans prescription)	réponses	1	0	1
	personnes %	0,2%	0,0%	0,2%
autres opioïdes (sans prescription)	réponses	9	0	9
	personnes %	1,8%	0,0%	1,8%
cocaïne	réponses	222	62	284
	personnes %	45,1%	12,6%	57,7%
crack	réponses	40	10	50
	personnes %	8,1%	2,0%	10,2%
autres formes de cocaïne	réponses	7	6	13
	personnes %	1,4%	1,2%	2,6%
amphétamines	réponses	53	20	73
	personnes %	10,8%	4,1%	14,8%
métamphétamines (crystal meth, ice, pilules thaï)	réponses	23	5	28
	personnes %	4,7%	1,0%	5,7%
MDMA et substances similaires (Ecstasy)	réponses	59	16	75
	personnes %	12,0%	3,3%	15,2%
cathinones de synthèse (MDPV, méphédron, méthédron)	réponses	2	2	4
	personnes %	0,4%	0,4%	0,8%
autres stimulants	réponses	1	0	1
	personnes %	0,2%	0,0%	0,2%

**C2 Quelles substances sont un problème pour vous (incl. principale substance)? (plusieurs réponses: VNED070y-kd)**

(Fort.)

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
barbituriques (sans prescription)	réponses	2	3	5
	personnes %	0,4%	0,6%	1,0%
benzodiazépines (sans prescription)	réponses	85	23	108
	personnes %	17,3%	4,7%	22,0%
GHB/GBL	réponses	6	3	9
	personnes %	1,2%	0,6%	1,8%
autres somnifères, tranquillisants	réponses	15	4	19
	personnes %	3,0%	0,8%	3,9%
LSD	réponses	37	11	48
	personnes %	7,5%	2,2%	9,8%
kétamine	réponses	11	3	14
	personnes %	2,2%	0,6%	2,8%
autres hallucinogènes	réponses	14	4	18
	personnes %	2,8%	0,8%	3,7%
substances volatiles	réponses	2	1	3
	personnes %	0,4%	0,2%	0,6%
cannabis	réponses	191	56	247
	personnes %	38,8%	11,4%	50,2%
tabac	réponses	190	72	262
	personnes %	38,6%	14,6%	53,3%
autres substances (tous types)	réponses	10	6	16
	personnes %	2,0%	1,2%	3,3%
troubles comparables à une addiction	réponses	14	6	20
	personnes %	2,8%	1,2%	4,1%
Total	réponses	1396	440	1836
	réponses %	76,0%	24,0%	100,0%
	nombre de personnes	374	118	492
	personnes %	283,7%	89,4%	373,2%
Missing		9	1	10

**C2.1 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème ALCOOL (vned070a, vned73a)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	49	31,0%	17	36,2%	66	32,2%
4-6 jours par semaine	15	9,5%	5	10,6%	20	9,8%
2-3 jours par semaine	20	12,7%	10	21,3%	30	14,6%
1 jour par semaine ou moins	25	15,8%	6	12,8%	31	15,1%
aucune consommation	49	31,0%	9	19,1%	58	28,3%
Total	158	100,0%	47	100,0%	205	100,0%
Missing	12		8		20	

**C2.2 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème HÉROÏNE, sans prescription (vned070ba, vned073ba)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	47	28,3%	13	32,5%	60	29,1%
4-6 jours par semaine	9	5,4%	0	0,0%	9	4,4%
2-3 jours par semaine	9	5,4%	3	7,5%	12	5,8%
1 jour par semaine ou moins	19	11,4%	8	20,0%	27	13,1%
aucune consommation	82	49,4%	16	40,0%	98	47,6%
Total	166	100,0%	40	100,0%	206	100,0%
Missing	14		14		28	

**C2.3 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème MÉTHADONE, sans prescription (vned070bb, vned073bb)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	21	52,5%	8	72,7%	29	56,9%
4-6 jours par semaine	2	5,0%	0	0,0%	2	3,9%
2-3 jours par semaine	1	2,5%	2	18,2%	3	5,9%
1 jour par semaine ou moins	5	12,5%	0	0,0%	5	9,8%
aucune consommation	11	27,5%	1	9,1%	12	23,5%
Total	40	100,0%	11	100,0%	51	100,0%
Missing	4		2		6	

**C2.4 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème BUPRÉNORPHINE, sans prescription (vned070bc, vned073bc)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	2	66,7%	0	0,0%	2	40,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune consommation	1	33,3%	2	100,0%	3	60,0%
Total	3	100,0%	2	100,0%	5	100,0%
Missing	1		0		1	

**C2.5 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème FENTANYL, sans prescription (vned070bd, vned073bd)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune consommation	1	100,0%	0	0,0%	1	100,0%
Total	1	100,0%	0	0,0%	1	100,0%
Missing	0		0		0	

**C2.6 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème autres OPIOÏDES, sans prescription (vned070be, vned073be)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	4	50,0%	0	0,0%	4	50,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	1	12,5%	0	0,0%	1	12,5%
1 jour par semaine ou moins	1	12,5%	0	0,0%	1	12,5%
aucune consommation	2	25,0%	0	0,0%	2	25,0%
Total	8	100,0%	0	0,0%	8	100,0%
Missing	1		0		1	

**C2.7 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème COCAÏNE (vned070ca, vned073ca)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	35	16,8%	14	29,8%	49	19,2%
4-6 jours par semaine	12	5,8%	1	2,1%	13	5,1%
2-3 jours par semaine	28	13,5%	4	8,5%	32	12,5%
1 jour par semaine ou moins	50	24,0%	9	19,1%	59	23,1%
aucune consommation	83	39,9%	19	40,4%	102	40,0%
Total	208	100,0%	47	100,0%	255	100,0%
Missing	14		15		29	

**C2.8 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème CRACK (vned070cb, vned073cb)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	9	23,7%	2	22,2%	11	23,4%
4-6 jours par semaine	2	5,3%	1	11,1%	3	6,4%
2-3 jours par semaine	2	5,3%	1	11,1%	3	6,4%
1 jour par semaine ou moins	10	26,3%	1	11,1%	11	23,4%
aucune consommation	15	39,5%	4	44,4%	19	40,4%
Total	38	100,0%	9	100,0%	47	100,0%
Missing	2		1		3	

**C2.9 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème autres formes de COCAÏNE (vned070cc, vned073cc)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	2	28,6%	1	20,0%	3	25,0%
4-6 jours par semaine	1	14,3%	1	20,0%	2	16,7%
2-3 jours par semaine	1	14,3%	2	40,0%	3	25,0%
1 jour par semaine ou moins	1	14,3%	1	20,0%	2	16,7%
aucune consommation	2	28,6%	0	0,0%	2	16,7%
Total	7	100,0%	5	100,0%	12	100,0%
Missing	0		1		1	



**C2.10 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème AMPHÉTAMINES (vned070da, vned073da)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	3	5,8%	0	0,0%	3	4,3%
4-6 jours par semaine	3	5,8%	2	11,1%	5	7,1%
2-3 jours par semaine	5	9,6%	1	5,6%	6	8,6%
1 jour par semaine ou moins	14	26,9%	5	27,8%	19	27,1%
aucune consommation	27	51,9%	10	55,6%	37	52,9%
Total	52	100,0%	18	100,0%	70	100,0%
Missing	1		2		3	

**C2.11 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème MÉTAMPHÉTAMINES (vned070db, vned073db)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	1	25,0%	1	4,2%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	7	35,0%	1	25,0%	8	33,3%
aucune consommation	13	65,0%	2	50,0%	15	62,5%
Total	20	100,0%	4	100,0%	24	100,0%
Missing	3		1		4	

**C2.12 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème MDMA (vned070dc, vned073dc)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	1	1,8%	0	0,0%	1	1,5%
4-6 jours par semaine	3	5,5%	1	7,7%	4	5,9%
2-3 jours par semaine	8	14,5%	2	15,4%	10	14,7%
1 jour par semaine ou moins	14	25,5%	3	23,1%	17	25,0%
aucune consommation	29	52,7%	7	53,8%	36	52,9%
Total	55	100,0%	13	100,0%	68	100,0%
Missing	4		3		7	

**C2.13 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème CATHINONES (vned070dd, vned073dd)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	1	100,0%	1	50,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune consommation	1	100,0%	0	0,0%	1	50,0%
Total	1	100,0%	1	100,0%	2	100,0%
Missing	1		1		2	

**C2.14 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème autres STIMULANTS (vned070de, vned073de)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	1	100,0%	0	0,0%	1	100,0%
aucune consommation	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	1	100,0%	0	0,0%	1	100,0%
Missing	0		0		0	

**C2.15 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème BARBITURIQUES (vned070ea, vned073ea)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune consommation	2	100,0%	2	100,0%	4	100,0%
Total	2	100,0%	2	100,0%	4	100,0%
Missing	0		1		1	

**C2.16 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème BENZODIAZÉPINES (vned070eb, vned073eb)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	33	41,3%	7	46,7%	40	42,1%
4-6 jours par semaine	5	6,3%	2	13,3%	7	7,4%
2-3 jours par semaine	10	12,5%	1	6,7%	11	11,6%
1 jour par semaine ou moins	11	13,8%	1	6,7%	12	12,6%
aucune consommation	21	26,3%	4	26,7%	25	26,3%
Total	80	100,0%	15	100,0%	95	100,0%
Missing	5		8		13	

**C2.17 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème GHB/GBL (vned070ec, vned073ec)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	1	16,7%	0	0,0%	1	11,1%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	1	16,7%	0	0,0%	1	11,1%
1 jour par semaine ou moins	2	33,3%	1	33,3%	3	33,3%
aucune consommation	2	33,3%	2	66,7%	4	44,4%
Total	6	100,0%	3	100,0%	9	100,0%
Missing	0		0		0	

**C2.18 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème autre SOMNIFÈRES (vned070ed, vned073ed)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	6	50,0%	3	100,0%	9	60,0%
4-6 jours par semaine	1	8,3%	0	0,0%	1	6,7%
2-3 jours par semaine	1	8,3%	0	0,0%	1	6,7%
1 jour par semaine ou moins	1	8,3%	0	0,0%	1	6,7%
aucune consommation	3	25,0%	0	0,0%	3	20,0%
Total	12	100,0%	3	100,0%	15	100,0%
Missing	3		1		4	

**C2.19 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème LSD (vned070fa, vned073fa)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	2	5,9%	1	10,0%	3	6,8%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	1	2,9%	0	0,0%	1	2,3%
1 jour par semaine ou moins	15	44,1%	5	50,0%	20	45,5%
aucune consommation	16	47,1%	4	40,0%	20	45,5%
Total	34	100,0%	10	100,0%	44	100,0%
Missing	3		1		4	

**C2.20 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème KÉTAMINE (vned070fb, vned073fb)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	1	33,3%	1	7,1%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	3	27,3%	0	0,0%	3	21,4%
1 jour par semaine ou moins	2	18,2%	1	33,3%	3	21,4%
aucune consommation	6	54,5%	1	33,3%	7	50,0%
Total	11	100,0%	3	100,0%	14	100,0%
Missing	0		0		0	

**C2.21 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème autres HALLUCINOGENES (vned070fc, vned073fc)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	6	50,0%	1	25,0%	7	43,8%
aucune consommation	6	50,0%	3	75,0%	9	56,3%
Total	12	100,0%	4	100,0%	16	100,0%
Missing	2		0		2	

**C2.22 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème SUBSTANCES VOLATILES (vned070g, vned073g)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	1	100,0%	1	33,3%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune consommation	2	100,0%	0	0,0%	2	66,7%
Total	2	100,0%	1	100,0%	3	100,0%
Missing	0		0		0	

**C2.23 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème CANNABIS (vned070h, vned073h)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	47	27,0%	18	40,0%	65	29,7%
4-6 jours par semaine	11	6,3%	4	8,9%	15	6,8%
2-3 jours par semaine	22	12,6%	10	22,2%	32	14,6%
1 jour par semaine ou moins	33	19,0%	5	11,1%	38	17,4%
aucune consommation	61	35,1%	8	17,8%	69	31,5%
Total	174	100,0%	45	100,0%	219	100,0%
Missing	17		11		28	

**C2.24 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème TABAC (vned070i, vned073i)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	165	93,8%	62	93,9%	227	93,8%
4-6 jours par semaine	2	1,1%	0	0,0%	2	0,8%
2-3 jours par semaine	2	1,1%	2	3,0%	4	1,7%
1 jour par semaine ou moins	2	1,1%	0	0,0%	2	0,8%
aucune consommation	5	2,8%	2	3,0%	7	2,9%
Total	176	100,0%	66	100,0%	242	100,0%
Missing	14		6		20	

## Principale substance posant problème à l'admission

.....

**C3** En ce qui concerne la clientèle en traitement pour un problème lié à une substance, le problème principal au moment de l'admission est, pour 29%, l'héroïne; pour 25% il s'agit de la cocaïne et pour 18% c'est l'alcool.

### C3 Principale substance posant problème, liste détaillée (vned010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
alcool	62	16,7%	24	21,4%	86	17,8%
héroïne	109	29,3%	29	25,9%	138	28,5%
méthadone (sans prescription)	4	1,1%	1	0,9%	5	1,0%
buprénorphine (sans prescription)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
fentanyl (sans prescription)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres opioïdes	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
cocaïne	94	25,3%	29	25,9%	123	25,4%
crack	10	2,7%	2	1,8%	12	2,5%
autres formes de cocaïne	1	0,3%	1	0,9%	2	0,4%
amphétamines	7	1,9%	0	0,0%	7	1,4%
métamphétamines (crystal meth, ice, pilules thai)	6	1,6%	1	0,9%	7	1,4%
MDMA et substances similaires (Ecstasy)	4	1,1%	0	0,0%	4	0,8%
cathinones de synthèse (MDPV, méphédrone, autre)	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
autres stimulants	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
barbituriques (sans prescription)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
benzodiazépines (sans prescription)	9	2,4%	1	0,9%	10	2,1%
GHB/GBL	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
autres somnifères, tranquillisants	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
kétamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres hallucinogènes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
substances volatiles	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cannabis	55	14,8%	19	17,0%	74	15,3%
tabac	3	0,8%	3	2,7%	6	1,2%
autres substances (tous types)	3	0,8%	0	0,0%	3	0,6%
troubles comparables à une addiction	2	0,5%	2	1,8%	4	0,8%
Total	372	100,0%	112	100,0%	484	100,0%
Missing	11		7		18	

**C4** Conformément aux principes d'act-info, les substances sont réparties par groupes. Pour 30% des personnes, la substance posant le plus problème est un opioïde (héroïne, méthadone, morphine, codéine, etc.); 28% nomment la cocaïne et ses dérivés et 18% citent l'alcool. Tous les tableaux qui suivent, relatifs à la fréquence de consommation, à l'âge de la première consommation, etc. sont basés sur ces groupes de substances.

**C4 Principale substance posant problème, catégorisée selon les conventions act-info (vned010)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
alcool	62	16,7%	24	21,4%	86	17,8%
opioïdes (sans prescription)	114	30,6%	30	26,8%	144	29,8%
cocaïne	105	28,2%	32	28,6%	137	28,3%
stimulants	18	4,8%	1	0,9%	19	3,9%
somnifères, tranquillisants (sans prescription)	10	2,7%	1	0,9%	11	2,3%
hallucinogènes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cannabis	55	14,8%	19	17,0%	74	15,3%
tabac	3	0,8%	3	2,7%	6	1,2%
autres substances	3	0,8%	0	0,0%	3	0,6%
troubles comparables à une addiction	2	0,5%	2	1,8%	4	0,8%
Total	372	100,0%	112	100,0%	484	100,0%
Missing	11		7		18	

## Polytoxicomanie

.....

**C5** Pour 49% des clients et clientes, il existe un trouble dû à la consommation de multiples substances selon le CIM-10. Une association souvent citée est l'association des opioïdes et de la cocaïne (14%) (tab. **C6b**).

**C5 Troubles liés à l'utilisation de drogues multiples selon le CIM-10 ("polytoxicomanie") (vned015)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	152	48,3%	50	51,0%	202	48,9%
non	163	51,7%	48	49,0%	211	51,1%
Total	315	100,0%	98	100,0%	413	100,0%
Missing	68		21		89	

**C6a Combinaison de substances: sous-groupe polytoxicomanie (plusieurs réponses: vned016a-j)**

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
alcool	réponses	61	21	82
	personnes %	31,0%	10,7%	41,6%
opioïdes	réponses	84	29	113
	personnes %	42,6%	14,7%	57,4%
cocaïne	réponses	112	32	144
	personnes %	56,9%	16,2%	73,1%
stimulants	réponses	30	6	36
	personnes %	15,2%	3,0%	18,3%
somnifères, tranquillisants	réponses	42	15	57
	personnes %	21,3%	7,6%	28,9%
hallucinogènes	réponses	12	3	15
	personnes %	6,1%	1,5%	7,6%
substances volatiles	réponses	1	0	1
	personnes %	0,5%	0,0%	0,5%
cannabis	réponses	69	24	93
	personnes %	35,0%	12,2%	47,2%
tabac	réponses	45	15	60
	personnes %	22,8%	7,6%	30,5%
autres substances	réponses	4	1	5
	personnes %	2,0%	0,5%	2,5%
Total	réponses	460	146	606
	réponses %	75,1%	24,9%	100,0%
	nombre de personnes	148	49	197
	personnes %	233,5%	74,1%	307,6%
Missing		4	1	5

**C6b Combinaisons de substances (vned016a-j)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
opioïdes et cocaïne	19	12,9%	8	16,3%	27	13,8%
opioïdes, cocaïne et somnifères/ tranquillisants	10	6,8%	4	8,2%	14	7,1%
alcool, opioïdes et cocaïne	13	8,8%	5	10,2%	18	9,2%
alcool et cocaïne	14	9,5%	3	6,1%	17	8,7%
alcool, cocaïne et stimulants	4	2,7%	0	0,0%	4	2,0%
alcool, opioïdes et somnifères/ tranquillisants	1	0,7%	0	0,0%	1	0,5%
cocaïne et cannabis	7	4,8%	3	6,1%	10	5,1%
substances div.: alcool, opioïdes, cocaïne, somnifères/ tranquillisants, autre	11	7,5%	0	0,0%	11	5,6%
autre combinaison	68	46,3%	26	53,1%	94	48,0%
Total	147	100,0%	49	100,0%	196	100,0%
Missing	5		1		6	

## C7 Problème principal selon des catégories d'âge à l'entrée, sans valeurs missing d'âge (vned010, vmec020)

TOTAL act-info-FOS

	jusqu' à 19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-39 ans		40 ans et plus		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
alcool	5	1,0%	8	1,7%	15	3,1%	25	5,2%	33	6,8%	86	17,8%
opioïdes (sans prescription)	1	0,2%	19	3,9%	29	6,0%	53	11,0%	42	8,7%	144	29,8%
cocaïne	2	0,4%	9	1,9%	38	7,9%	59	12,2%	29	6,0%	137	28,3%
stimulants	4	0,8%	5	1,0%	2	0,4%	8	1,7%	0	0,0%	19	3,9%
somnifères, tranquillisants (sans prescription)	0	0,0%	1	0,2%	1	0,2%	4	0,8%	5	1,0%	11	2,3%
hallucinogènes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cannabis	23	4,8%	25	5,2%	10	2,1%	9	1,9%	7	1,4%	74	15,3%
tabac	0	0,0%	1	0,2%	1	0,2%	2	0,4%	2	0,4%	6	1,2%
autres substances	0	0,0%	1	0,2%	1	0,2%	1	0,2%	0	0,0%	3	0,6%
troubles comparables à une addiction	1	0,2%	0	0,0%	3	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	4	0,8%
Total	36	7,4%	69	14,3%	100	20,7%	161	33,3%	118	24,4%	484	100,0%



## Problème principal: fréquence de la consommation

.....

### C8 Fréquence de consommation (derniers 6 mois), sous-groupe: problème principal ALCOOL (vned010 vned025)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	34	63,0%	14	63,6%	48	63,2%
4-6 jours par semaine	6	11,1%	3	13,6%	9	11,8%
2-3 jours par semaine	3	5,6%	2	9,1%	5	6,6%
1 jour par semaine ou moins	5	9,3%	2	9,1%	7	9,2%
aucune consommation	6	11,1%	1	4,5%	7	9,2%
Total	54	100,0%	22	100,0%	76	100,0%
Missing	8		2		10	

### C9 Fréquence de consommation (derniers 6 mois), sous-groupe: problème principal OPIOÏDES, sans prescription (vned010 vned025)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	50	48,5%	12	48,0%	62	48,4%
4-6 jours par semaine	18	17,5%	1	4,0%	19	14,8%
2-3 jours par semaine	8	7,8%	4	16,0%	12	9,4%
1 jour par semaine ou moins	12	11,7%	4	16,0%	16	12,5%
aucune consommation	15	14,6%	4	16,0%	19	14,8%
Total	103	100,0%	25	100,0%	128	100,0%
Missing	11		5		16	

### C10 Fréquence de consommation (derniers 6 mois), sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010 vned025)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	36	36,7%	14	53,8%	50	40,3%
4-6 jours par semaine	17	17,3%	2	7,7%	19	15,3%
2-3 jours par semaine	15	15,3%	3	11,5%	18	14,5%
1 jour par semaine ou moins	17	17,3%	3	11,5%	20	16,1%
aucune consommation	13	13,3%	4	15,4%	17	13,7%
Total	98	100,0%	26	100,0%	124	100,0%
Missing	7		6		13	

**C11 Fréquence de consommation (derniers 6 mois), sous-groupe: problème principal CANNABIS (vned010 vned025)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	40	75,5%	13	76,5%	53	75,7%
4-6 jours par semaine	4	7,5%	2	11,8%	6	8,6%
2-3 jours par semaine	6	11,3%	0	0,0%	6	8,6%
1 jour par semaine ou moins	1	1,9%	2	11,8%	3	4,3%
aucune consommation	2	3,8%	0	0,0%	2	2,9%
Total	53	100,0%	17	100,0%	70	100,0%
Missing	2		2		4	

**Mode d`administration**

.....

**C12 Mode d`administration, sous-groupe: problème principal OPIOÏDES, sans prescription (vned010 vned030)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
injection	38	37,3%	8	33,3%	46	36,5%
fumée, inhalation	45	44,1%	12	50,0%	57	45,2%
ingestion (manger/boire)	4	3,9%	0	0,0%	4	3,2%
sniff	15	14,7%	4	16,7%	19	15,1%
autre	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	102	100,0%	24	100,0%	126	100,0%
Missing	12		6		18	

**C13 Mode d`administration, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010 vned030)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
injection	23	23,0%	15	53,6%	38	29,7%
fumée, inhalation	26	26,0%	6	21,4%	32	25,0%
ingestion (manger/boire)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
sniff	51	51,0%	7	25,0%	58	45,3%
autre	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	100	100,0%	28	100,0%	128	100,0%
Missing	5		4		9	

## Âge première consommation, consommation régulière et consommation problématique

### C14 Statistique: Âge première consommation de la principale substance posant problème (vmed040)

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	17,76	17,00	8,00	40,00	4,73	317	383
femmes	16,68	16,00	5,00	35,00	4,50	94	119
Total	17,52	17,00	5,00	40,00	4,70	411	502

### C15 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vmed010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	21	48,8%	8	34,8%	29	43,9%
15-17 ans	17	39,5%	9	39,1%	26	39,4%
18-20 ans	1	2,3%	5	21,7%	6	9,1%
plus de 20 ans	4	9,3%	1	4,3%	5	7,6%
Total	43	100,0%	23	100,0%	66	100,0%
Missing	19		1		20	

### C16 Statistique: Âge première consommation, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vned010)

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	14,65	15,00	8,00	29,00	3,88	43	62
femmes	16,00	16,00	5,00	30,00	4,38	23	24
Total	15,12	15,00	5,00	30,00	4,08	66	86

### C17 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal OPIOÏDES, sans prescription (vned010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	6	6,4%	3	15,0%	9	7,9%
15-17 ans	22	23,4%	5	25,0%	27	23,7%
18-20 ans	38	40,4%	5	25,0%	43	37,7%
plus de 20 ans	28	29,8%	7	35,0%	35	30,7%
Total	94	100,0%	20	100,0%	114	100,0%
Missing	20		10		30	

**C18 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal OPIOÏDES, sans prescription (vned010)**

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	19,45	19,00	9,00	30,00	3,96	94	114
femmes	19,00	18,50	11,00	27,00	4,44	20	30
Total	19,37	19,00	9,00	30,00	4,03	114	144

**C19 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	8	8,6%	5	19,2%	13	10,9%
15-17 ans	35	37,6%	8	30,8%	43	36,1%
18-20 ans	25	26,9%	10	38,5%	35	29,4%
plus de 20 ans	25	26,9%	3	11,5%	28	23,5%
Total	93	100,0%	26	100,0%	119	100,0%
Missing	12		6		18	

**C20 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010)**

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	19,17	18,00	13,00	40,00	4,87	93	105
femmes	17,73	17,00	11,00	35,00	4,64	26	32
Total	18,86	18,00	11,00	40,00	4,84	119	137

**C21 Âge début consommation régulière problème principal ALCOOL (vned010 vmed050)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	9	20,5%	2	9,5%	11	16,9%
15-17 ans	13	29,5%	7	33,3%	20	30,8%
18-20 ans	7	15,9%	4	19,0%	11	16,9%
plus de 20 ans	15	34,1%	8	38,1%	23	35,4%
Total	44	100,0%	21	100,0%	65	100,0%
Missing	18		3		21	

**C22 Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vned010 vmed050)**

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	19,23	17,50	10,00	36,00	5,64	44	62
femmes	22,33	19,00	5,00	43,00	10,01	21	24
Total	20,23	18,00	5,00	43,00	7,40	65	86

**C23 Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal OPIOÏDES, sans prescription (vned010 vmed050)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	5	5,3%	2	10,0%	7	6,1%
15-17 ans	11	11,6%	4	20,0%	15	13,0%
18-20 ans	40	42,1%	5	25,0%	45	39,1%
plus de 20 ans	39	41,1%	9	45,0%	48	41,7%
Total	95	100,0%	20	100,0%	115	100,0%
Missing	19		10		29	

**C24 Statistiek: Âge début consommation régulière problème principal OPIOÏDES, sans prescription(vned010 vmed050)**

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviat ion standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	20,93	20,00	13,00	35,00	4,44	95	114
femmes	20,80	20,00	11,00	31,00	5,27	20	30
Total	20,90	20,00	11,00	35,00	4,57	115	144

**C25 Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010 vmed050)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	1	1,1%	2	8,7%	3	2,6%
15-17 ans	22	23,7%	6	26,1%	28	24,1%
18-20 ans	25	26,9%	7	30,4%	32	27,6%
plus de 20 ans	45	48,4%	8	34,8%	53	45,7%
Total	93	100,0%	23	100,0%	116	100,0%
Missing	12		9		21	

**C26 Âge début consommation régulière, problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010 vmed050)**

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviat ion standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	21,96	20,00	13,00	40,00	6,05	93	105
femmes	19,70	18,00	12,00	36,00	5,80	23	32
Total	21,51	20,00	12,00	40,00	6,05	116	137

**C27 Âge consommation problématique problème principal ALCOOL (vned010 vmed060)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	3	6,7%	1	4,8%	4	6,1%
15-17 ans	10	22,2%	3	14,3%	13	19,7%
18-20 ans	6	13,3%	4	19,0%	10	15,2%
plus de 20 ans	26	57,8%	13	61,9%	39	59,1%
Total	45	100,0%	21	100,0%	66	100,0%
Missing	17		3		20	

**C28 Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal ALCOO (vned010 vmed060)**

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	22,40	22,00	14,00	44,00	6,65	45	62
femmes	25,67	22,00	14,00	43,00	9,30	21	24
Total	23,44	22,00	14,00	44,00	7,67	66	86

**C29 Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal OPIOÏDES, sans prescription (vned010 vmed060)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	3	3,1%	2	10,0%	5	4,3%
15-17 ans	7	7,3%	3	15,0%	10	8,6%
18-20 ans	31	32,3%	4	20,0%	35	30,2%
plus de 20 ans	55	57,3%	11	55,0%	66	56,9%
Total	96	100,0%	20	100,0%	116	100,0%
Missing	18		10		28	

**C30 Âge début consommation régulière, sous-groupe: OPIOÏDES, sans prescription (vned010 vmed060)**

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	22,32	21,00	13,00	38,00	4,80	96	114
femmes	22,75	21,50	11,00	38,00	7,12	20	30
Total	22,40	21,00	11,00	38,00	5,24	116	144

**C31 Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010 vmed060)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	1	1,1%	1	4,3%	2	1,8%
15-17 ans	12	13,2%	4	17,4%	16	14,0%
18-20 ans	23	25,3%	9	39,1%	32	28,1%
plus de 20 ans	55	60,4%	9	39,1%	64	56,1%
Total	91	100,0%	23	100,0%	114	100,0%
Missing	14		9		23	

**C32 Âge consommation problématique problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010 vmed060)**

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	24,07	23,00	13,00	48,00	6,97	91	105
femmes	20,57	20,00	13,00	36,00	5,41	23	32
Total	23,36	22,00	13,00	48,00	6,81	114	137

## Autres troubles addictifs selon sous-groupe problème principal

.....

Concernant les tableaux ci-après, plusieurs réponses sont possibles.

**C33** 44% des personnes du groupe **Alcool** mentionnent la cocaïne comme autre substance posant problème; 36% citent le cannabis, 34% l'héroïne et 23% les benzodiazépines. Pour 59% le tabac pose problème.

**C34** Les personnes du groupe **Opiïdes** mentionnent les substances problématiques suivantes : la cocaïne pour 71%, le cannabis pour 51%, les benzodiazépines pour 38% et l'alcool pour 35%,. Le tabac pose problème pour 60%.

**C35** Parmi le groupe **Cocaïne**, 50% de la clientèle mentionnent le cannabis comme autre substance problématique; 44% citent l'alcool, 42% l'héroïne et 20% les benzodiazépines. Pour 67% le tabac est une substance problématique.

**C36** 40% des personnes du groupe **Cannabis** citent l'alcool comme autre substance problématique, 34% mentionnent la cocaïne, 26% les amphétamines, 26 % MDMA et substances similaires et 25 % LSD.. Le tabac pose problème pour 74%.

**C33 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal ALCOOL (plusieurs réponses)**  
 (vned070y-kd)

		Sexe		TOTAL act- info-FOS
		hommes	femmes	
aucune substance n'est un problème	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
héroïne (sans prescription)	réponses	19	5	24
	personnes %	27,1%	7,1%	34,3%
méthadone (sans prescription)	réponses	7	3	10
	personnes %	10,0%	4,3%	14,3%
buprénorphine (sans prescription)	réponses	1	0	1
	personnes %	1,4%	0,0%	1,4%
fentanyl (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
autres opioïdes (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
cocaïne	réponses	23	8	31
	personnes %	32,9%	11,4%	44,3%
crack	réponses	4	0	4
	personnes %	5,7%	0,0%	5,7%
autres formes de cocaïne	réponses	1	0	1
	personnes %	1,4%	0,0%	1,4%
amphétamines	réponses	5	2	7
	personnes %	7,1%	2,9%	10,0%
méтамphétamines (crystal meth, ice, pilules thaï)	réponses	1	0	1
	personnes %	1,4%	0,0%	1,4%
MDMA et substances similaires (Ecstasy)	réponses	6	1	7
	personnes %	8,6%	1,4%	10,0%
cathinones de synthèse (MDPV, méphédron, méthédron)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
autres stimulants	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
barbituriques (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
benzodiazépines (sans prescription)	réponses	13	3	16
	personnes %	18,6%	4,3%	22,9%
GHB/GBL	réponses	1	0	1
	personnes %	1,4%	0,0%	1,4%
autres somnifères, tranquillisants	réponses	3	0	3
	personnes %	4,3%	0,0%	4,3%
LSD	réponses	4	0	4
	personnes %	5,7%	0,0%	5,7%
kétamine	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
autres hallucinogènes	réponses	2	0	2
	personnes %	2,9%	0,0%	2,9%
substances volatiles	réponses	1	0	1
	personnes %	1,4%	0,0%	1,4%
cannabis	réponses	21	4	25
	personnes %	30,0%	5,7%	35,7%
tabac	réponses	30	11	41
	personnes %	42,9%	15,7%	58,6%
autres substances (tous types)	réponses	2	1	3
	personnes %	2,9%	1,4%	4,3%
troubles comparables à une addiction	réponses	2	0	2
	personnes %	2,9%	0,0%	2,9%
Total	réponses	146	38	184
	réponses %	74,3%	25,7%	100,0%



**C33 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal ALCOOL (plusieurs réponses)  
(vned070y-kd)**

		Sexe		TOTAL act- info-FOS
		hommes	femmes	
Total	nombre de personnes	52	18	70
	personnes %	208,6%	54,3%	262,9%
Missing		10	6	16

**C34 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal OPIOÏDES, sans prescription  
(plusieurs réponses) (vned070y-kd)**

		Sexe		TOTAL act- info-FOS
		hommes	femmes	
aucune substance n'est un problème	réponses	1	0	1
	personnes %	0,8%	0,0%	0,8%
alcool	réponses	33	10	43
	personnes %	27,0%	8,2%	35,2%
cocaïne	réponses	71	15	86
	personnes %	58,2%	12,3%	70,5%
crack	réponses	12	6	18
	personnes %	9,8%	4,9%	14,8%
autres formes de cocaïne	réponses	2	3	5
	personnes %	1,6%	2,5%	4,1%
amphétamines	réponses	14	6	20
	personnes %	11,5%	4,9%	16,4%
méтамphétamines (crystal meth, ice, pilules thai)	réponses	8	3	11
	personnes %	6,6%	2,5%	9,0%
MDMA et substances similaires (Ecstasy)	réponses	17	4	21
	personnes %	13,9%	3,3%	17,2%
cathinones de synthèse (MDPV, méphédronne, méthédronne)	réponses	1	1	2
	personnes %	0,8%	0,8%	1,6%
autres stimulants	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
barbituriques (sans prescription)	réponses	2	2	4
	personnes %	1,6%	1,6%	3,3%
benzodiazépines (sans prescription)	réponses	38	8	46
	personnes %	31,1%	6,6%	37,7%
GHB/GBL	réponses	2	2	4
	personnes %	1,6%	1,6%	3,3%
autres somnifères, tranquillisants	réponses	5	3	8
	personnes %	4,1%	2,5%	6,6%
LSD	réponses	8	2	10
	personnes %	6,6%	1,6%	8,2%
kétamine	réponses	3	1	4
	personnes %	2,5%	0,8%	3,3%
autres hallucinogènes	réponses	4	1	5
	personnes %	3,3%	0,8%	4,1%
substances volatiles	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
cannabis	réponses	47	15	62
	personnes %	38,5%	12,3%	50,8%
tabac	réponses	52	21	73
	personnes %	42,6%	17,2%	59,8%
autres substances (tous types)	réponses	2	0	2
	personnes %	1,6%	0,0%	1,6%
troubles comparables à une addiction	réponses	4	0	4
	personnes %	3,3%	0,0%	3,3%
réponses		326	103	429
réponses %		77,9%	22,1%	100,0%
Total				

**C34 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal OPIOÏDES, sans prescription (plusieurs réponses) (vned070y-kd)**

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
Total	nombre de personnes	95	27	122
	personnes %	267,2%	84,4%	351,6%
Missing		19	3	22

**C35 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (plusieurs réponses; vned070y-kd)**

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
aucune substance n'est un problème	réponses	1	0	1
	personnes %	0,9%	0,0%	0,9%
alcool	réponses	41	10	51
	personnes %	35,0%	8,5%	43,6%
héroïne (sans prescription)	réponses	34	15	49
	personnes %	29,1%	12,8%	41,9%
méthadone (sans prescription)	réponses	7	1	8
	personnes %	6,0%	0,9%	6,8%
buprénorphine (sans prescription)	réponses	0	1	1
	personnes %	0,0%	0,9%	0,9%
fentanyl (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
autres opioïdes (sans prescription)	réponses	1	0	1
	personnes %	0,9%	0,0%	0,9%
amphétamines	réponses	13	5	18
	personnes %	11,1%	4,3%	15,4%
métamphétamines (crystal meth, ice, pilules thaï)	réponses	4	0	4
	personnes %	3,4%	0,0%	3,4%
MDMA et substances similaires (Ecstasy)	réponses	15	2	17
	personnes %	12,8%	1,7%	14,5%
cathinones de synthèse (MDPV, méphédron, méthédron)	réponses	0	1	1
	personnes %	0,0%	0,9%	0,9%
autres stimulants	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
barbituriques (sans prescription)	réponses	0	1	1
	personnes %	0,0%	0,9%	0,9%
benzodiazépines (sans prescription)	réponses	15	8	23
	personnes %	12,8%	6,8%	19,7%
GHB/GBL	réponses	1	1	2
	personnes %	0,9%	0,9%	1,7%
autres somnifères, tranquillisants	réponses	3	0	3
	personnes %	2,6%	0,0%	2,6%
LSD	réponses	9	2	11
	personnes %	7,7%	1,7%	9,4%
kétamine	réponses	1	0	1
	personnes %	0,9%	0,0%	0,9%
autres hallucinogènes	réponses	2	0	2
	personnes %	1,7%	0,0%	1,7%
substances volatiles	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
cannabis	réponses	45	14	59
	personnes %	38,5%	12,0%	50,4%
tabac	réponses	54	24	78
	personnes %	46,2%	20,5%	66,7%
autres substances (tous types)	réponses	1	3	4

**C35 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (plusieurs réponses; vned070y-kd)**

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
autres substances (tous types)	personnes %	0,9%	2,6%	3,4%
	réponses	2	5	7
troubles comparables à une addiction	personnes %	1,7%	4,3%	6,0%
	réponses	249	93	342
Total	réponses %	75,2%	24,8%	100,0%
	nombre de personnes	88	29	117
	personnes %	212,8%	79,5%	292,3%
Missing		17	3	20

**C36 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal CANNABIS (plusieurs réponses; vned070y-kd)**

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
aucune substance n'est un problème	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
alcool	réponses	13	8	21
	personnes %	24,5%	15,1%	39,6%
héroïne (sans prescription)	réponses	7	1	8
	personnes %	13,2%	1,9%	15,1%
méthadone (sans prescription)	réponses	1	0	1
	personnes %	1,9%	0,0%	1,9%
buprénorphine (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
fentanyl (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
autres opioïdes (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
cocaïne	réponses	13	5	18
	personnes %	24,5%	9,4%	34,0%
crack	réponses	0	1	1
	personnes %	0,0%	1,9%	1,9%
autres formes de cocaïne	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
amphétamines	réponses	7	7	14
	personnes %	13,2%	13,2%	26,4%
métamphétamines (crystal meth, ice, pilules thaï)	réponses	1	1	2
	personnes %	1,9%	1,9%	3,8%
MDMA et substances similaires (Ecstasy)	réponses	7	7	14
	personnes %	13,2%	13,2%	26,4%
cathinones de synthèse (MDPV, méphédron, méthédron)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
autres stimulants	réponses	1	0	1
	personnes %	1,9%	0,0%	1,9%
barbituriques (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
benzodiazépines (sans prescription)	réponses	4	1	5
	personnes %	7,5%	1,9%	9,4%
GHB/GBL	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
autres somnifères tranquillisants	réponses	1	0	1
	personnes %	1,9%	0,0%	1,9%

**C36 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal CANNABIS (plusieurs réponses; vned070y-kd)**

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
autres somnifères, tranquillisants	personnes %	1,9%	0,0%	1,9%
	réponses	7	6	13
LSD	personnes %	13,2%	11,3%	24,5%
	réponses	1	2	3
kétamine	personnes %	1,9%	3,8%	5,7%
	réponses	2	3	5
autres hallucinogènes	personnes %	3,8%	5,7%	9,4%
	réponses	0	1	1
substances volatiles	personnes %	0,0%	1,9%	1,9%
	réponses	29	10	39
tabac	personnes %	54,7%	18,9%	73,6%
	réponses	0	2	2
autres substances (tous types)	personnes %	0,0%	3,8%	3,8%
	réponses	2	0	2
troubles comparables à une addiction	personnes %	3,8%	0,0%	3,8%
	réponses	96	55	151
Total	réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes	39	14	53
	personnes %	181,1%	103,8%	284,9%
	réponses	16	5	21
Missing				

## Objectif de consommation

.....

**C37** Au début du traitement, 76% de la clientèle vise l'abstinence complète. 93% de la clientèle (principale substance : opioïde; **C39**) et 89% de la clientèle (principale substance : cocaïne; **C40**) vise l'abstinence complète.

### **C37 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance posant problème? (vzeo010)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	274	77,8%	74	70,5%	348	76,1%
abstinence limitée dans le temps	21	6,0%	7	6,7%	28	6,1%
consommation contrôlée	35	9,9%	17	16,2%	52	11,4%
aucune limitation envisagée	2	0,6%	2	1,9%	4	0,9%
pas déterminé pour l'instant	16	4,5%	4	3,8%	20	4,4%
autre	4	1,1%	1	1,0%	5	1,1%
Total	352	100,0%	105	100,0%	457	100,0%
Missing	31		14		45	

### **C38 Objectif de consommation: sous-groupe problème principal ALCOOL (vzeo010)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	31	55,4%	13	56,5%	44	55,7%
abstinence limitée dans le temps	4	7,1%	4	17,4%	8	10,1%
consommation contrôlée	15	26,8%	6	26,1%	21	26,6%
aucune limitation envisagée	2	3,6%	0	0,0%	2	2,5%
pas déterminé pour l'instant	3	5,4%	0	0,0%	3	3,8%
autre	1	1,8%	0	0,0%	1	1,3%
Total	56	100,0%	23	100,0%	79	100,0%
Missing	6		1		7	

### **C39 Objectif de consommation: sous-groupe problème principal OPIOÏDES (vzeo010)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	103	93,6%	24	88,9%	127	92,7%
abstinence limitée dans le temps	1	0,9%	0	0,0%	1	0,7%
consommation contrôlée	2	1,8%	1	3,7%	3	2,2%
aucune limitation envisagée	0	0,0%	1	3,7%	1	0,7%
pas déterminé pour l'instant	4	3,6%	1	3,7%	5	3,6%
autre	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	110	100,0%	27	100,0%	137	100,0%
Missing	4		3		7	

**C40 Objectif de consommation: sous-groupe problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vzeo010)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	91	89,2%	26	86,7%	117	88,6%
abstinence limitée dans le temps	5	4,9%	2	6,7%	7	5,3%
consommation contrôlée	3	2,9%	1	3,3%	4	3,0%
aucune limitation envisagée	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
pas déterminé pour l'instant	2	2,0%	1	3,3%	3	2,3%
autre	1	1,0%	0	0,0%	1	0,8%
Total	102	100,0%	30	100,0%	132	100,0%
Missing	3		2		5	

**Injection**

.....

**C41** 45% des clients et clientes se sont déjà au moins une fois injecté des drogues. Parmi les personnes qui ont déjà consommé des drogues par injection, 67% l'ont fait au cours des 12 mois précédant le début de la thérapie (tab. **C42**). Parmi les personnes qui ont consommé des drogues par injection au cours des 12 mois précédant le traitement, 47% l'ont également fait dans les 30 jours avant le début du traitement (tab. **C43**). L'âge moyen de la première injection est de 22 ans (tab. **C44**).

**C41 Déjà consommé une drogue illégale par injection? (vned090)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	151	43,6%	50	51,5%	201	45,4%
non	195	56,4%	47	48,5%	242	54,6%
Total	346	100,0%	97	100,0%	443	100,0%
Missing	37		22		59	

**C42 Déjà consommé une drogue illégale par injection (derniers 12 mois)? sous-groupe: déjà injecté (vned093)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	98	67,6%	29	64,4%	127	66,8%
non, pas dans les 12 derniers mois	47	32,4%	16	35,6%	63	33,2%
Total	145	100,0%	45	100,0%	190	100,0%
Missing	6		5		11	

**C43 Déjà consommé une drogue illégale par injection (derniers 30 jours)? sous-groupe: déjà injecté dans les 12 derniers mois) (vned095)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	40	44,4%	13	54,2%	53	46,5%
dans les 12 derniers mois mais pas dans les 30 derniers jours	50	55,6%	11	45,8%	61	53,5%
Total	90	100,0%	24	100,0%	114	100,0%
Missing	8		5		13	

**C44a Âge première injection (vmed096)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	5	3,9%	4	9,8%	9	5,3%
15-17 ans	17	13,2%	10	24,4%	27	15,9%
18-20 ans	44	34,1%	9	22,0%	53	31,2%
plus de 20 ans	63	48,8%	18	43,9%	81	47,6%
Total	129	100,0%	41	100,0%	170	100,0%
Missing	22		9		31	

**C44b Statistique: Âge première injection (vmed096)**

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviat standard	Valid Cases
hommes	21,93	20,00	12,00	40,00	5,19	129
femmes	21,02	20,00	10,00	36,00	6,49	41
Total	21,71	20,00	10,00	40,00	5,53	170

**C45** Parmi les personnes qui ont déjà consommé par injection, 34% ont indiqué avoir employé des seringues ou aiguilles d'autres consommateurs ou consommatrices. Parmi les personnes qui ont consommé par injection au cours des 12 derniers mois, 30% ont indiqué avoir employé des seringues ou aiguilles d'autres consommateurs ou consommatrices (2014: 47%) (tab. **C46**). Parmi les personnes qui ont consommé par injection au cours des 30 derniers jours, 47% ont indiqué avoir employé des seringues ou aiguilles d'autres consommateurs ou consommatrices (petit nombre)(tab. **C47**).

**C45 Déjà injecté une drogue illégale avec une seringue/aiguille déjà utilisée par une autre personne? (vned092)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	41	32,8%	14	38,9%	55	34,2%
non	84	67,2%	22	61,1%	106	65,8%
Total	125	100,0%	36	100,0%	161	100,0%
Missing	26		14		40	

**C46 Injecté une drogue illégale avec une seringue/aiguille déjà utilisée par une autre personne dans les 12 derniers mois (vned094)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	11	27,5%	5	38,5%	16	30,2%
non, pas dans les 12 derniers mois	29	72,5%	8	61,5%	37	69,8%
Total	40	100,0%	13	100,0%	53	100,0%
Missing	1		1		2	

**C47 Injecté une drogue illégale avec une seringue/aiguille déjà utilisée par une autre personne dans les 30 derniers jours (vned098)**

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	4	36,4%	3	75,0%	7	46,7%
dans les 12 derniers mois, mais pas dans les 30 derniers jours	7	63,6%	1	25,0%	8	53,3%
Total	11	100,0%	4	100,0%	15	100,0%
Missing	0		1		1	



## D SANTÉ

### VIH

.....

**D1** 88% des clients et clientes se sont déjà soumis à un test de dépistage du VIH Parmi les personnes qui ont effectué un test VIH, 69% l'ont effectué au cours des 12 mois précédents (tab. **D2**). Le résultat était positif pour 3% des personnes (tab. **D3**).

#### D1 Test VIH effectué (vyek040)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	289	87,3%	87	89,7%	376	87,9%
non	42	12,7%	10	10,3%	52	12,1%
Total	331	100,0%	97	100,0%	428	100,0%
Missing	52		22		74	

#### D2 Test VIH effectué dans les 12 derniers mois (vyek041)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	181	66,5%	58	76,3%	239	68,7%
non, pas dans les 12 derniers mois	91	33,5%	18	23,7%	109	31,3%
Total	272	100,0%	76	100,0%	348	100,0%
Missing	17		11		28	

#### D3 Résultat test VIH, sous-groupe: test effectué (vyek042)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
test VIH positif pour la première fois avant les 12 derniers mois	4	1,5%	8	9,5%	12	3,4%
test VIH positif pour la première fois au cours des 12 derniers mois	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
test VIH négatif	269	98,5%	76	90,5%	345	96,6%
Total	273	100,0%	84	100,0%	357	100,0%
Missing	16		3		19	

## Hépatite C

.....

**D4** 85% des clients et clientes se sont déjà soumis à un test de dépistage de l'hépatite C. Parmi les personnes qui ont effectué un test, 75% l'ont effectué au cours des 12 mois précédents (tab. **D5**). Le résultat était positif pour 29% d'entre elles (tab. **D6**).

### D4 Test hépatite C effectué (vyek060)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	263	83,8%	81	88,0%	344	84,7%
non	51	16,2%	11	12,0%	62	15,3%
Total	314	100,0%	92	100,0%	406	100,0%
Missing	69		27		96	

### D5 Test hépatite C effectué dans les 12 derniers mois (vyek061)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	181	73,0%	57	81,4%	238	74,8%
non, pas dans les 12 derniers mois, mais avant	67	27,0%	13	18,6%	80	25,2%
Total	248	100,0%	70	100,0%	318	100,0%
Missing	15		11		26	

### D6 Résultat test hépatite C, sous-groupe: test effectué (vyek062)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
test hépatite C positif pour la première fois avant les 12 derniers mois	50	20,3%	18	25,0%	68	21,4%
test hépatite C positif pour la première fois au cours des 12 derniers mois	17	6,9%	8	11,1%	25	7,9%
test hépatite C négatif	179	72,8%	46	63,9%	225	70,8%
Total	246	100,0%	72	100,0%	318	100,0%
Missing	17		9		26	

## TABLEAUX des SORTIES 2015

0.1 L'évaluation se base sur 477 questionnaires valablement remplis.

### 0.1 Source des informations (vmad040)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
informations fournies par le client/la cliente	67	18,3%	18	18,0%	85	18,2%
informations fournies par l' intervenant-e	300	81,7%	82	82,0%	382	81,8%
Total	367	100,0%	100	100,0%	467	100,0%
Missing_	7		3		10	

0.2 La proportion de femmes est de 22%.

### 0.2 Sexe (vmec010)

	n	%
hommes	374	78,4%
femmes	103	21,6%
Total	477	100,0%
Missing_	0	

### 0.3 Âge, catégorisé selon les conventions act-info (vmec020)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
15-19 ans	22	5,9%	16	15,5%	38	8,0%
20-24 ans	68	18,2%	13	12,6%	81	17,0%
25-29 ans	67	17,9%	20	19,4%	87	18,2%
30-34 ans	69	18,4%	27	26,2%	96	20,1%
35-39 ans	58	15,5%	8	7,8%	66	13,8%
40-44 ans	48	12,8%	9	8,7%	57	11,9%
45-49 ans	28	7,5%	6	5,8%	34	7,1%
50-54 ans	9	2,4%	3	2,9%	12	2,5%
55-59 ans	5	1,3%	1	1,0%	6	1,3%
Total	374	100,0%	103	100,0%	477	100,0%
Missing_	0		0		0	

**0.4 Âge, catégorisé selon les conventions act-info-FOS (vmec020)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jusqu'à 19 ans	22	5,9%	16	15,5%	38	8,0%
20-24 ans	68	18,2%	13	12,6%	81	17,0%
25-29 ans	67	17,9%	20	19,4%	87	18,2%
30-39 ans	127	34,0%	35	34,0%	162	34,0%
40 ans et plus	90	24,1%	19	18,4%	109	22,9%
Total	374	100,0%	103	100,0%	477	100,0%
Missing_	0		0		0	

**0.5b Statistique: Âge, moyenne (vmec020)**

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases
hommes	32,40	32,00	15,00	59,00	9,22	374
femmes	30,37	30,00	15,00	55,00	9,68	103
Total	31,96	31,00	15,00	59,00	9,35	477

**0.6 Nombre de client-e-s selon le domicile canton (vmac010c)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
AG	34	9,6%	9	9,3%	43	9,5%
AR	6	1,7%	1	1,0%	7	1,6%
BE	43	12,1%	14	14,4%	57	12,6%
BL	14	4,0%	4	4,1%	18	4,0%
BS	17	4,8%	2	2,1%	19	4,2%
FR	11	3,1%	1	1,0%	12	2,7%
GE	5	1,4%	1	1,0%	6	1,3%
GL	1	0,3%	2	2,1%	3	0,7%
GR	2	0,6%	4	4,1%	6	1,3%
LU	26	7,3%	9	9,3%	35	7,8%
NE	2	0,6%	0	0,0%	2	0,4%
NW	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
OW	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
SG	21	5,9%	1	1,0%	22	4,9%
SH	2	0,6%	0	0,0%	2	0,4%
SO	12	3,4%	5	5,2%	17	3,8%
TG	3	0,8%	1	1,0%	4	0,9%
TI	35	9,9%	5	5,2%	40	8,9%
UR	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
VD	58	16,4%	14	14,4%	72	16,0%
VS	12	3,4%	6	6,2%	18	4,0%
ZG	2	0,6%	0	0,0%	2	0,4%
ZH	45	12,7%	18	18,6%	63	14,0%
Total	354	100,0%	97	100,0%	451	100,0%
Missing_	20		6		26	

## A CADRE DE LA PRISE EN CHARGE

**A1** 29% de la clientèle a achevé le traitement selon les termes convenus sans passer à un autre suivi, 14% l'a achevé comme prévu pour passer dans un établissement de traitement des addictions – au total, 43% ont achevé le traitement comme convenu. Pour 48% des personnes, le traitement a été interrompu soit par le client soit par l'institution traitante (perte de contact comprise). On n'observe pas de différence significative entre les hommes et les femmes sur la question du genre de sortie. Aucun décès n'a été enregistré.

### A1 Raison principale de la fin du traitement (vmab040)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
fin régulière du traitement sans transfert vers une institution spécialisé-e en matière de dépendances	115	31,3%	22	22,2%	137	29,4%
fin régulière du traitement avec transfert vers une institution spécialisé-e en matière de dépendances	54	14,7%	10	10,1%	64	13,7%
changement de domicile	3	0,8%	1	1,0%	4	0,9%
hospitalisation	6	1,6%	4	4,0%	10	2,1%
détention	13	3,5%	2	2,0%	15	3,2%
perte de contact	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
rupture explicite du traitement de la part du client/de la cliente ou de l'institution	164	44,7%	59	59,6%	223	47,9%
autre raison pour la fin du traitement	10	2,7%	1	1,0%	11	2,4%
Total	367	100,0%	99	100,0%	466	100,0%
Missing_	7		4		11	

**A2** Parmi les personnes qui ont achevé le traitement comme prévu pour passer à un autre suivi, 48% vont en appartement protégé, 21% suivent un traitement résidentiel, 21% suivent un traitement en structure/clinique de jour.

### A2 Transfert vers une institution spécialisée en matière de dépendance, sous-groupe: fin régulière avec transfert (vnab041) sans missing

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
traitement résidentiel	10	18,9%	3	33,3%	13	21,0%
prise en charge dans une structure de jour/clinique de jour	12	22,6%	1	11,1%	13	21,0%
prise en charge ambulatoire	25	47,2%	5	55,6%	30	48,4%
autre institution	6	11,3%	0	0,0%	6	9,7%
Total	53	100,0%	9	100,0%	62	100,0%
Missing_	1		1		2	

**A4a-c** Les tableaux montrent la ventilation des deux groupes de clientèle «fin de traitement comme prévu» et «interruption de traitement» selon la substance principale qui posait problème au moment de l'ADMISSION d'abord pour le groupe complet, puis en fonction du sexe.

**A4a Principale substance posant problème au moment de l'ADMISSION et circonstances: TOTAL (vmab040, vmed010), sans missing**

	fin régulière avec ou sans tranfert		rupture ou perte de contact		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
alcool	35	17,7%	36	16,7%	71	17,2%
opioïdes (sans prescription)	73	36,9%	65	30,2%	138	33,4%
cocaïne et dérivé	49	24,7%	65	30,2%	114	27,6%
stimulants	5	2,5%	4	1,9%	9	2,2%
médicaments (sans prescription)	1	0,5%	4	1,9%	5	1,2%
hallucinogènes	0	0,0%	1	0,5%	1	0,2%
cannabis	29	14,6%	34	15,8%	63	15,3%
tabac	1	0,5%	1	0,5%	2	0,5%
autres substances	3	1,5%	2	0,9%	5	1,2%
troubles comparables à une addiction	2	1,0%	3	1,4%	5	1,2%
Total	198	100,0%	215	100,0%	413	100,0%

**A4b Principale substance posant problème au moment de l'ADMISSION et circonstances: HOMMES (vmab040, vmed010, vmec010), sans missing**

	fin régulière avec ou sans tranfert		rupture ou perte de contact		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
alcool	29	17,5%	26	16,3%	55	16,9%
opioïdes (sans prescription)	59	35,5%	46	28,7%	105	32,2%
cocaïne et dérivé	44	26,5%	48	30,0%	92	28,2%
stimulants	5	3,0%	4	2,5%	9	2,8%
médicaments (sans prescription)	1	0,6%	3	1,9%	4	1,2%
hallucinogènes	0	0,0%	1	0,6%	1	0,3%
cannabis	25	15,1%	26	16,3%	51	15,6%
tabac	0	0,0%	1	0,6%	1	0,3%
autres substances	1	0,6%	2	1,3%	3	0,9%
troubles comparables à une addiction	2	1,2%	3	1,9%	5	1,5%
Total	166	100,0%	160	100,0%	326	100,0%

**A4c Principale substance posant problème au moment de l'ADMISSION et circonstances: FEMMES (vmab040, vmed010, vmec010), sans missing**

	fin régulière avec ou sans tranfert		rupture ou perte de contact		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
alcool	6	18,8%	10	18,2%	16	18,4%
opioïdes (sans prescription)	14	43,8%	19	34,5%	33	37,9%
cocaïne et dérivé	5	15,6%	17	30,9%	22	25,3%
médicaments (sans prescription)	0	0,0%	1	1,8%	1	1,1%
cannabis	4	12,5%	8	14,5%	12	13,8%
tabac	1	3,1%	0	0,0%	1	1,1%
autres substances	2	6,3%	0	0,0%	2	2,3%
Total	32	100,0%	55	100,0%	87	100,0%

## Durée du séjour

.....

**A5** 9% des clients et clientes sont restés un mois ou moins en traitement, 17% entre 1 et 3 mois. Parmi les résidents de longue durée, 12% auront passé entre 12 et 18 mois en traitement résidentiel et 19% plus de 18 mois.

### A5 Durée du séjour (vmab040a, vmab020)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 1 mois (0-30 jours)	32	8,6%	12	11,7%	44	9,2%
1 à 3 mois (31-90 jours)	57	15,2%	25	24,3%	82	17,2%
3 à 6 mois (91-180 jours)	68	18,2%	22	21,4%	90	18,9%
6 à 9 mois (181-270 jours)	54	14,4%	9	8,7%	63	13,2%
9 à 12 mois (271-360 jours)	42	11,2%	8	7,8%	50	10,5%
12 à 18 mois (361-540 jours)	43	11,5%	14	13,6%	57	11,9%
18 mois et plus (plus de 540 jours)	78	20,9%	13	12,6%	91	19,1%
Total	374	100,0%	103	100,0%	477	100,0%
Missing_	0		0		0	

**A6** La durée moyenne du traitement est de 306 jours. Les hommes (321 jours) sont significativement plus longtemps en traitement que les femmes (253 jours) ( $p < .05$ ).

### A6 Statistk: Statistique: Durée du séjour (en jour)

	Moyenne	Médiane	Déviati on standard	Valid Cases
hommes	320,89	228,00	307,77	374
femmes	252,87	137,00	277,42	103
Total	306,20	205,00	302,50	477

**A7** La durée moyenne du séjour calculée sans tenir compte des personnes au séjour particulièrement long (plus de 2 ans) est de 230 jours. On observe là aussi une différence significative entre les hommes et les femmes sur cette question : les hommes (241 jours) restent plus longtemps en traitement que les femmes (191 jours) ( $p < .05$ ).

### A7 Statistique: Durée du séjour (en jour): sans les personnes avec un séjour de plus de 2 ans

	Moyenne	Médiane	Déviati on standard	Valid Cases
hommes	241,26	191,50	190,85	334
femmes	191,03	128,00	173,70	95
TOTAL	230,14	177,00	188,16	429

**A8** De façon prévisible, les personnes qui achèvent le traitement selon les termes convenus (qu'elles passent ou non à un autre suivi) se distinguent très significativement de celles qui interrompent le traitement: ces dernières sont significativement plus nombreuses à passer jusqu'à 1 mois, entre 1 et 3 mois en traitement, alors que celles qui achèvent le traitement comme convenu passent plus souvent entre 12 et 18 mois ou plus de 18 mois dans l'institution (Cr's V= .54; p< .000).

**A8 Durée du séjour (en jours) et circonstances de sortie (vmab040, vmab040a, vmab020)**

	fin régulière avec ou sans tranfert		rupture ou perte de contact		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 1 mois (0-30 jours)	3	1,5%	35	15,6%	38	8,9%
1 à 3 mois (31-90 jours)	11	5,5%	65	28,9%	76	17,8%
3 à 6 mois (91-180 jours)	35	17,4%	45	20,0%	80	18,8%
6 à 9 mois (181-270 jours)	23	11,4%	33	14,7%	56	13,1%
9 à 12 mois (271-360 jours)	21	10,4%	23	10,2%	44	10,3%
12 à 18 mois (361-540 jours)	31	15,4%	14	6,2%	45	10,6%
18 mois et plus (plus de 540 jours)	77	38,3%	10	4,4%	87	20,4%
Total	201	100,0%	225	100,0%	426	100,0%

**A9a-c** Les clients dont le traitement se termine comme convenu restent en traitement 468 jours en moyenne, contre 172 jours en moyenne en cas d'interruption. Cette différence est significative (p< .000). Ces différences valent aussi à l'intérieur des groupes formés par les hommes et les femmes respectivement.

**A9a Durée du séjour (en jours) et circonstances de sortie**

	Moyenne	Médiane	Déviat ion standard	Valid Cases
fin régulière avec ou sans tranfert	468,18	383,00	342,74	201
rupture ou perte de contact	171,77	102,00	195,83	225
TOTAL	311,63	204,00	312,15	426

**A9b Durée du séjour (en jours) et circonstances de sortie: HOMMES**

	Moyenne	Médiane	Déviat ion standard	Valid Cases
fin régulière avec ou sans tranfert	473,80	398,00	344,21	169
rupture ou perte de contact	181,54	113,50	199,39	166
TOTAL	328,98	224,00	317,25	335

**A9c Durée du séjour (en jours) et circonstances de sortie: FEMMES**

	Moyenne	Médiane	Déviat ion standard	Valid Cases
fin régulière avec ou sans tranfert	438,50	346,50	338,68	32
rupture ou perte de contact	144,29	75,00	184,30	59
TOTAL	247,75	132,00	285,23	91



**A10a Statistique: Durée du séjour (en jours) et principale substance posant problème au moment de l'ADMISSION: sans les personnes avec un séjour de plus de 2 ans**

	Moyenne	Médiane	Déviati on standard	Valid Cases
alcool	219,85	160,00	189,43	75
opioïdes (sans prescription)	259,30	216,50	191,74	132
cocaïne et dérivé	207,89	137,00	177,12	113
stimulants	239,00	244,00	184,48	12
médicaments (sans prescription)	232,67	176,50	227,05	6
hallucinogènes	258,00	258,00	.	1
cannabis	226,41	185,00	178,94	64
tabac	455,67	428,00	133,67	3
autres substances	188,33	156,00	58,62	3
troubles comparables à une addiction	212,83	186,50	211,64	6
TOTAL	232,36	182,00	185,44	415

**A10b Statistique: Durée du séjour (en jours) et principale substance posant problème au moment de l'ADMISSION: sans les personnes avec un séjour de plus de 2 ans: HOMMES**

	Moyenne	Médiane	Déviati on standard	Valid Cases
alcool	214,41	148,50	194,70	54
opioïdes (sans prescription)	275,75	241,00	195,66	102
cocaïne et dérivé	218,96	151,00	174,47	91
stimulants	227,82	234,00	189,18	11
médicaments (sans prescription)	266,00	287,00	236,87	5
hallucinogènes	258,00	258,00	.	1
cannabis	247,47	208,00	185,70	51
tabac	469,50	469,50	185,97	2
autres substances	188,33	156,00	58,62	3
troubles comparables à une addiction	170,50	186,50	107,75	4
TOTAL	242,38	194,00	187,40	324

**A10c Statistique: Durée du séjour (en jours) et principale substance posant problème au moment de l'ADMISSION: sans les personnes avec un séjour de plus de 2 ans: FEMMES**

	Moyenne	Médiane	Déviati on standard	Valid Cases
alcool	233,86	164,00	178,94	21
opioïdes (sans prescription)	203,37	163,50	168,99	30
cocaïne et dérivé	162,14	101,00	184,74	22
stimulants	362,00	362,00	.	1
médicaments (sans prescription)	66,00	66,00	.	1
hallucinogènes	.	.	.	
cannabis	143,77	111,00	123,03	13
tabac	428,00	428,00	.	1
autres substances	.	.	.	
troubles comparables à une addiction	297,50	297,50	409,41	2
TOTAL	196,69	129,00	174,67	91

**Programme de substitution effectué**

.....

**A11** 40% des client-e-s ont suivi un traitement de substitution pendant leur traitement résidentiel (année précédente : 38%). Les femmes (50%) ont été significativement plus nombreuses à suivre un traitement de substitution pendant leur traitement résidentiel que les hommes (37%) (Cr's V=.11,  $p < .05$ ).

**A11 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne effectué (vmab050)**

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
non	227	63,2%	50	50,5%	277	60,5%
oui	132	36,8%	49	49,5%	181	39,5%
Total	359	100,0%	99	100,0%	458	100,0%
Missing_	15		4		19	

**A12 Quel programme de substitution, sous-groupe: programme de substitution effectué (vmab055)**

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
méthadone	94	72,3%	37	78,7%	131	74,0%
autres opioïdes: p. ex. la buprénorphine (Temgesic®, Subutex®)	34	26,2%	10	21,3%	44	24,9%
autres substances: p. ex. la naltrexone (Naltrexin®)	2	1,5%	0	0,0%	2	1,1%
Total	130	100,0%	47	100,0%	177	100,0%
Missing_	2		2		4	

**A13** Immédiatement après la fin du traitement, un traitement de substitution (y compris prescription d'héroïne) a été prévu pour 35% de la clientèle. 84% des personnes avec un traitement de substitution après la fin du traitement l'étaient déjà au début du traitement résidentiel (sans tableau).

**A13 Programme de substitution prévu après la fin du traitement? (vmab060)**

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
non	237	68,7%	51	52,6%	288	65,2%
oui: prescription d'héroïne	3	0,9%	1	1,0%	4	0,9%
oui: traitement de substitution (méthadone, Subutex®, etc.)	105	30,4%	45	46,4%	150	33,9%
Total	345	100,0%	97	100,0%	442	100,0%
Missing_	29		6		35	

**Postcure prévue ou mise en place**

**A14.** Une postcure a été prévue ou mise en place pour 55% des clients et clientes.

**A14 Postcure prévue et mise en place? (vzaj010)**

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
non	147	45,0%	41	44,6%	188	44,9%
oui	180	55,0%	51	55,4%	231	55,1%
Total	327	100,0%	92	100,0%	419	100,0%
Missing_	47		11		58	

**A15** Le projet de postcure consistait, pour 27% de la clientèle concernée, en un contact avec un centre de conseil ambulatoire pour les problèmes liés aux drogues, pour 21% en un contact avec un service de postcure de l'institution et pour 18% en un contact avec un service de postcure extérieur.

**A15 Quel service ou groupe est-il prévu de solliciter, sous-groupe: postcure prévue et mise en place? (plusieurs réponses) (vzaj015y-vzaj015j)**

		sexe		Total
		hommes	femmes	
appartement protégé de l'institution	réponses	23	6	29
	personnes %	10,2%	2,7%	12,9%
service de postcure de l'institution	réponses	40	7	47
	personnes %	17,8%	3,1%	20,9%
appartement protégé extérieur	réponses	10	3	13
	personnes %	4,4%	1,3%	5,8%
service de postcure extérieur	réponses	36	4	40
	personnes %	16,0%	1,8%	17,8%
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	réponses	6	1	7
	personnes %	2,7%	0,4%	3,1%
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	réponses	53	8	61
	personnes %	23,6%	3,6%	27,1%
autre centre de consultation	réponses	17	1	18
	personnes %	7,6%	0,4%	8,0%
groupe d'entraide	réponses	2	0	2
	personnes %	0,9%	0,0%	0,9%
groupe d'anciens/anciennes client-e-s de l'institution	réponses	3	0	3
	personnes %	1,3%	0,0%	1,3%
autre: psychothérapie, psychiatre	réponses	7	4	11
	personnes %	3,1%	1,8%	4,9%
autre: traitement résidentiel de la toxicomanie	réponses	4	5	9
	personnes %	1,8%	2,2%	4,0%
autre: clinique psychiatrique	réponses	3	3	6
	personnes %	1,3%	1,3%	2,7%
autre: prison	réponses	1	1	2
	personnes %	0,4%	0,4%	0,9%
autre: foyer, foyer-logement	réponses	3	0	3
	personnes %	1,3%	0,0%	1,3%
autre: divers	réponses	12	7	19
	personnes %	5,3%	3,1%	8,4%
Total	réponses	220	50	270
	réponses %	79,1%	20,9%	100,0%
	nombre de personnes	178	47	225
	personnes %	97,8%	22,2%	120,0%
Missing		2	4	6

## B DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

**B1** À leur sortie, 25% des clients habitent seuls, 19% logent chez leur famille d'origine (parents ou chez l'un des deux etc.) et 17% dans un établissement thérapeutique ou un foyer; 11% vivent avec leur partenaire (avec ou sans enfants).

### B1 Ménage avec qui après la sortie (vnac030)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
seul-e en ménage	86	26,4%	19	21,1%	105	25,2%
avec la famille d'origine (parents, etc.)	59	18,1%	19	21,1%	78	18,8%
avec un-e partenaire (avec ou sans enfant)	29	8,9%	17	18,9%	46	11,1%
avec des amis ou d'autres personnes (sans relation de parenté)	32	9,8%	7	7,8%	39	9,4%
en prison	29	8,9%	3	3,3%	32	7,7%
institution thérapeutique/foyer	57	17,5%	12	13,3%	69	16,6%
hôpital/clinique	11	3,4%	7	7,8%	18	4,3%
autre	23	7,1%	6	6,7%	29	7,0%
Total	326	100,0%	90	100,0%	416	100,0%
Missing_	48		13		61	

**B2** Pour 55% des personnes, le logement à la sortie peut être qualifié de stable.

### B2 Type de domicile après la sortie (vnac040)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
situation de logement stable	179	53,9%	56	59,6%	235	55,2%
situation de logement instable et/ou sdf	45	13,6%	12	12,8%	57	13,4%
en prison	29	8,7%	3	3,2%	32	7,5%
institution therap., foyer, hôpital, clinique	75	22,6%	23	24,5%	98	23,0%
autre	4	1,2%	0	0,0%	4	0,9%
Total	332	100,0%	94	100,0%	426	100,0%
Missing_	42		9		51	

## Relations

.....

**B3** 59% des client-e-s ne sont pas en couple au moment de leur sortie. Les femmes sont 40% à vivre seules à ce moment-là, ce qui est significativement plus rare que pour les hommes (64%) (Cr's  $V=.21$ ,  $p<.01$ ).

### B3 Type de domicile après la sortie (vzas010)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
sans partenaire, seul-e	210	64,4%	38	40,4%	248	59,0%
relation(s) temporaire(s)	32	9,8%	17	18,1%	49	11,7%
partenaire fixe en vivant séparé-e	51	15,6%	23	24,5%	74	17,6%
partenaire fixe en ménage commun	33	10,1%	16	17,0%	49	11,7%
Total	326	100,0%	94	100,0%	420	100,0%
Missing_	48		9		57	

## Source de revenu

.....

**B4** A/après leur sortie, 53% des personnes ont pour source de revenu principale l'aide sociale, 19% une rente et 15% leur propre activité lucrative. Le mode de sortie laisse apparaître une différence très significative (sans tableau): 28% des client-e-s étant sortis comme prévu ont à leur sortie leur propre activité lucrative contre 3% dans les cas d'interruption de traitement. Les personnes dont le traitement est interrompu sont significativement plus nombreuses (65%) que celles dont le traitement s'est achevé comme prévu (42%) à être financées par l'aide sociale (Cr's  $V=.38$ ;  $p<.000$ ).

### B4 Principale source de revenu après la sortie (vnac050)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
salaire	60	17,6%	5	5,3%	65	15,0%
économies, épargne	5	1,5%	0	0,0%	5	1,2%
rente (AVS/AI ou autres types de prévoyance)	55	16,2%	28	29,8%	83	19,1%
aide sociale	177	52,1%	53	56,4%	230	53,0%
assurance-chômage	5	1,5%	2	2,1%	7	1,6%
soutien du/de la partenaire	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
soutien des parents/autres membres de la famille/ami-e-s	14	4,1%	4	4,3%	18	4,1%
deal/petit trafic	2	0,6%	0	0,0%	2	0,5%
autres revenus illégaux	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
assurance d'indemnités journalières	7	2,1%	1	1,1%	8	1,8%
autre: mesure, justice	11	3,2%	1	1,1%	12	2,8%
autre: divers	2	0,6%	0	0,0%	2	0,5%
Total	340	100,0%	94	100,0%	434	100,0%
Missing_	34		9		43	

## Activité rémunératrice

.....

**B5** Après leur sortie, 39% des client-e-s ne sont pas actifs sur le marché de l'emploi (y compris les catégories suivantes: sans travail, car sans espoir d'en trouver un; rente; incapacité de travail; sans la catégorie «sans travail, mai en quête d'emploi»). 21% ont un travail, que ce soit à temps plein ou à temps partiel ou encore sous forme d'activités occasionnelles. Ils sont 20% sans travail mais en recherche d'emploi et 10% en formation. Une différence très significative apparaît selon le mode de sortie (sans tableau): les client-e-s qui ont achevé le traitement comme prévu sont 34% à être actifs sur le marché du travail (à temps plein ou à temps partiel), une fréquence significativement plus élevée que les 5% de celles et ceux qui ont interrompu le traitement. Ces client-e-s sont d'ailleurs aussi plus souvent en formation (18%) que les client-e-s qui ont interrompu le traitement (3%). Ces client-e-s, en revanche, sont proportionnellement bien plus nombreux à ne pas avoir de perspective d'emploi (39%) que les client-e-s ayant achevé le traitement comme prévu (9%) (Cr's  $V=.54$ ,  $p<.000$ ).

### B5 Activité rémunératrice après la sortie (vnac060)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
activité professionnelle à plein temps (70% ou plus) (même si congé maladie de courte durée)	57	17,0%	2	2,2%	59	13,9%
activité professionnelle à temps partiel (même si congé maladie de courte durée)	16	4,8%	3	3,3%	19	4,5%
jobs occasionnels (sans emploi fixe)	9	2,7%	0	0,0%	9	2,1%
en formation (école, études, apprentissage)	31	9,3%	10	11,1%	41	9,6%
sans travail, mais en quête d'emploi	70	20,9%	14	15,6%	84	19,8%
sans travail, sans recherche d'emploi car sans espoir d'en trouver un	78	23,3%	24	26,7%	102	24,0%
rentier/rentière (retraite, AVS, économies)	4	1,2%	3	3,3%	7	1,6%
incapacité de travail (AI/indemnités journalières)	39	11,6%	19	21,1%	58	13,6%
femme/homme au foyer	0	0,0%	5	5,6%	5	1,2%
autre: mesure pour soutenir l'emploi, atelier protégé, stage	5	1,5%	2	2,2%	7	1,6%
autre: détention préventive, emprisonnement	8	2,4%	0	0,0%	8	1,9%
autre: institution	5	1,5%	1	1,1%	6	1,4%
autre: divers	13	3,9%	7	7,8%	20	4,7%
Total	335	100,0%	90	100,0%	425	100,0%
Missing_	39		13		52	



## Formation

### B6 Au cours du traitement: commencé ou poursuivi une ou plusieurs formations (vnac068y-b)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
non, aucune	325	88,8%	89	89,9%	414	89,0%
oui, commencée	31	8,5%	9	9,1%	40	8,6%
oui, poursuivie	10	2,7%	1	1,0%	11	2,4%
Total	366	100,0%	99	100,0%	465	100,0%
Missing_	8		4		12	

### B8 Niveau de formation le plus élevé (avec obtention d'un certificat ou d'un diplôme) (vnac070y - vnac070h)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
aucune ou école obligatoire inachevée	24	7,4%	10	11,2%	34	8,2%
école obligatoire	137	42,2%	37	41,6%	174	42,0%
formation de transition	10	3,1%	6	6,7%	16	3,9%
formation générale sans maturité	3	0,9%	2	2,2%	5	1,2%
formation professionnelle de base et apprentissage	136	41,8%	26	29,2%	162	39,1%
maturité ou école normale	6	1,8%	2	2,2%	8	1,9%
formation professionnelle supérieure	5	1,5%	3	3,4%	8	1,9%
haute école spécialisée et université	4	1,2%	3	3,4%	7	1,7%
Total	325	100,0%	89	100,0%	414	100,0%
Missing_	49		14		63	

## Dettes

.....

**B9** L'endettement reste un problème important pour la clientèle, y compris après la sortie. A leur sortie les client-e-s ne sont que 18% à ne pas être endettés. Pour 22% de la clientèle, l'endettement va de 25 001 à 100 000 francs ou plus.

### B9 Dettes au moment de la sortie (vyaf030)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
dettes pour un montant inconnu	76	27,2%	30	40,5%	106	30,0%
aucune dette	51	18,3%	14	18,9%	65	18,4%
jusqu'à 5000 CHF	24	8,6%	11	14,9%	35	9,9%
de 5001 à 10 000 CHF	30	10,8%	5	6,8%	35	9,9%
de 10 001 à 25 000 CHF	29	10,4%	6	8,1%	35	9,9%
de 25 001 à 50 000 CHF	35	12,5%	4	5,4%	39	11,0%
de 50 001 à 100 000 CHF	22	7,9%	1	1,4%	23	6,5%
plus de 100 000 CHF	12	4,3%	3	4,1%	15	4,2%
Total	279	100,0%	74	100,0%	353	100,0%
Missing_	95		29		124	

## Situation juridique: mesures , procédures en cours, décisions

.....

**B10** Une mesure est prévue à la sortie pour 26% de la clientèle.

### B10 Mesures en vigueur à la sortie? (vyar009)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
non, aucune mesure	236	69,8%	51	65,4%	287	69,0%
en attente de clarification	16	4,7%	3	3,8%	19	4,6%
oui, une ou plusieurs mesure(s) sont encore en vigueur	86	25,4%	24	30,8%	110	26,4%
Total	338	100,0%	78	100,0%	416	100,0%
Missing_	36		25		61	

**B11** Parmi les mesures prévues, 24% sont une poursuite de la mesure, 22% une assistance de probation, 18% une exécution d'une peine suspendue et 12% une curatelle de portée générale.

**B11 Quelles mesures en vigueur à la sortie (plusieurs réponses: vyar010a - vyar010i)**

		sexe		TOTAL
		hommes	femmes	
curatelle de portée générale (tutelle) (art. 398 CC)	réponses	7	6	13
	personnes %	6,5%	5,6%	12,1%
curatelle de représentation (curatelle de représ.) (art. 394 CC)	réponses	10	1	11
	personnes %	9,3%	0,9%	10,3%
curatelle d'accompagnement (curatelle volontaire) (art. 393 CC)	réponses	3	1	4
	personnes %	2,8%	0,9%	3,7%
curatelle de coopération (conseil légal coopérant) (art. 396 CC)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
assistance de probation (art. 93 CP)	réponses	20	4	24
	personnes %	18,7%	3,7%	22,4%
exécution d'une peine suspendue (p.ex. selon art. 62a CP)	réponses	18	1	19
	personnes %	16,8%	0,9%	17,8%
mesure de droit pénal des mineurs (p.ex. selon art. 10 ss. DPMIn, art. 14 DPMIn)	réponses	5	4	9
	personnes %	4,7%	3,7%	8,4%
poursuite de la mesure	réponses	24	2	26
	personnes %	22,4%	1,9%	24,3%
autre mesure	réponses	10	5	15
	personnes %	9,3%	4,7%	14,0%
Total	réponses	97	24	121
	réponses %	79,4%	20,6%	100,0%
	nombre de personnes	85	22	107
	personnes %	90,7%	22,4%	113,1%
Missing		1	2	3

**B12** Une procédure est en cours pour 17% de la clientèle

**B12 Procédures en cours au moment de la sortie (vyar019)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
non, aucune procédure en cours	245	81,9%	75	86,2%	320	82,9%
oui, procédure(s) en cours	54	18,1%	12	13,8%	66	17,1%
Total	299	100,0%	87	100,0%	386	100,0%
Missing_	75		16		91	

**B13** Pour 64% des personnes, les procédures concernent des infractions à la loi sur les stupéfiants; pour 25%, elles portent sur des vols.

**B13 Quelles procédures en cours au moment de la sortie (plusieurs réponses: vzar020a - vzar020j)**

		sexe		Total
		hommes	femmes	
procédure fondée sur le droit matrimonial	réponses	3	0	3
	personnes %	5,4%	0,0%	5,4%
procédure tutélaire	réponses	1	2	3
	personnes %	1,8%	3,6%	5,4%
conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire	réponses	4	1	5
	personnes %	7,1%	1,8%	8,9%
infractions à la loi sur la circulation routière	réponses	6	2	8
	personnes %	10,7%	3,6%	14,3%
infractions à la loi sur les stupéfiants	réponses	29	7	36
	personnes %	51,8%	12,5%	64,3%
vol	réponses	12	2	14
	personnes %	21,4%	3,6%	25,0%
autres atteintes à la propriété	réponses	3	0	3
	personnes %	5,4%	0,0%	5,4%
atteinte aux mœurs	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
actes de violence	réponses	5	1	6
	personnes %	8,9%	1,8%	10,7%
autres délits	réponses	5	1	6
	personnes %	8,9%	1,8%	10,7%
Total	réponses	68	16	84
	réponses %	82,1%	17,9%	100,0%
	nombre de personnes	46	10	56
	personnes %	121,4%	28,6%	150,0%
Missing		8	2	10

**B14** Des mesures ou décisions administratives ou judiciaires ont été prononcées à l'encontre de 22% de la clientèle.

**B14 Mesures ou décisions administratives ou judiciaires prononcées au moment de la sortie (vyar029)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
non, aucune règle de conduite prononcée	242	77,8%	63	78,8%	305	78,0%
oui, règle(s) de conduite prononcée(s)	69	22,2%	17	21,3%	86	22,0%
Total	311	100,0%	80	100,0%	391	100,0%
Missing_	63		23		86	

**B15** Pour 28% de la clientèle concernés par une mesure ou une décision, cette mesure ou décision consiste dans la poursuite d'une mesure; pour 19%, elle consiste dans une assistance de probation et pour 18%, dans l'exécution d'une peine suspendue.

**B15 Quelles mesures ou décisions administratives ou judiciaires prononcées au moment de la sortie? (plusieurs réponses: vyar030b - vyar030h)**

		sexe		Total
		hommes	femmes	
retrait du permis de conduire	réponses	7	1	8
	personnes %	9,7%	1,4%	11,1%
prise en charge ambulatoire (art. 63 CP)	réponses	10	1	11
	personnes %	13,9%	1,4%	15,3%
exécution d'une peine suspendue (selon art. 62aCP)	réponses	12	1	13
	personnes %	16,7%	1,4%	18,1%
poursuite de la mesure (selon art. 59 ou 60 CP)	réponses	18	2	20
	personnes %	25,0%	2,8%	27,8%
assistance de probation (art. 93 CP)	réponses	12	2	14
	personnes %	16,7%	2,8%	19,4%
suspension conditionnelle de la mesure (art. 62 CP)	réponses	9	0	9
	personnes %	12,5%	0,0%	12,5%
autre	réponses	10	4	14
	personnes %	13,9%	5,6%	19,4%
Total	réponses	78	11	89
	réponses %	86,1%	13,9%	100,0%
	nombre de personnes	62	10	72
	personnes %	108,3%	15,3%	123,6%
Missing		7	7	14

## C CONSOMMATIONS et DÉPENDANCE

**C1** Indépendamment de toute consommation effective ou non, l'alcool représentait un problème pour 50% des client-e-s au moment de la sortie; il en va de même pour 42% avec la cocaïne, pour 39% avec l'héroïne et pour 35% avec le cannabis.

### C1 Quelles substances sont un problème au moment de la sortie? (plusieurs réponses; vnad010y-j)

		sexe		TOTAL
		hommes	femmes	
aucune substance n'est un problème	réponses	38	6	44
	personnes %	8,4%	1,3%	9,7%
alcool	réponses	171	55	226
	personnes %	37,7%	12,1%	49,8%
héroïne (sans prescription)	réponses	138	38	176
	personnes %	30,4%	8,4%	38,8%
méthadone (sans prescription)	réponses	11	5	16
	personnes %	2,4%	1,1%	3,5%
buprénorphine (sans prescription)	réponses	4	0	4
	personnes %	0,9%	0,0%	0,9%
fentanyl (sans prescription)	réponses	1	0	1
	personnes %	0,2%	0,0%	0,2%
autres opioïdes (sans prescription)	réponses	4	0	4
	personnes %	0,9%	0,0%	0,9%
cocaïne	réponses	150	39	189
	personnes %	33,0%	8,6%	41,6%
crack	réponses	11	6	17
	personnes %	2,4%	1,3%	3,7%
autres formes de cocaïne	réponses	4	0	4
	personnes %	0,9%	0,0%	0,9%
amphétamines	réponses	28	6	34
	personnes %	6,2%	1,3%	7,5%
méтамphétamines (crystal meth, ice, pilules thai)	réponses	11	2	13
	personnes %	2,4%	0,4%	2,9%
MDMA et substances similaires (ecstasy)	réponses	18	1	19
	personnes %	4,0%	0,2%	4,2%
cathinones synthétiques (MDPV, méphédrone, méthédrone)	réponses	3	0	3
	personnes %	0,7%	0,0%	0,7%
autres stimulants	réponses	3	0	3
	personnes %	0,7%	0,0%	0,7%
barbituriques (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
benzodiazépines (sans prescription)	réponses	33	13	46
	personnes %	7,3%	3,3%	10,6%

**C1 Quelles substances sont un problème au moment de la sortie? (plusieurs réponses; vnad010y-j)**

(Fort.)

		sexe		TOTAL
		hommes	femmes	
prescription)	personnes %	7,3%	2,9%	10,1%
	réponses	3	0	3
GHB, GBL	personnes %	0,7%	0,0%	0,7%
	réponses	3	1	4
autres somnifères, tranquillisants	personnes %	0,7%	0,2%	0,9%
	réponses	12	0	12
LSD	personnes %	2,6%	0,0%	2,6%
	réponses	2	0	2
kétamine	personnes %	0,4%	0,0%	0,4%
	réponses	4	0	4
autres hallucinogènes	personnes %	0,9%	0,0%	0,9%
	réponses	1	0	1
substances volatiles	personnes %	0,2%	0,0%	0,2%
	réponses	132	27	159
cannabis	personnes %	29,1%	5,9%	35,0%
	réponses	120	41	161
tabac	personnes %	26,4%	9,0%	35,5%
	réponses	6	3	9
autres substances (tous types)	personnes %	1,3%	0,7%	2,0%
	réponses	10	7	17
troubles comparables à une addiction	personnes %	2,2%	1,5%	3,7%
	réponses	921	250	1171
Total	réponses %	78,9%	21,1%	100,0%
	nombre de personnes	358	96	454
	personnes %	202,9%	55,1%	257,9%
	Missing	16	7	23

**C2** Si l'on regroupe les substances, l'alcool pose problème à 50% de la clientèle, la cocaïne et ses dérivés à 42%, les opioïdes à 40% des client-e-s, et enfin le cannabis à 35% des client-e-s. Le tabac pose problème pour 36% de la clientèle.

**C2 Quelles substances sont un problème au moment de la sortie? catégorisé (vnad010y-kd)**

		sexe		TOTAL
		hommes	femmes	
aucune substance n'est un problème	réponses	38	6	44
	personnes %	8,4%	1,3%	9,7%
alcool	réponses	171	55	226
	personnes %	37,7%	12,1%	49,8%
opioïdes (sans prescription)	réponses	144	38	182
	personnes %	31,7%	8,4%	40,1%
cocaïne et dérivé	réponses	151	41	192
	personnes %	33,3%	9,0%	42,3%
stimulants	réponses	40	8	48
	personnes %	8,8%	1,8%	10,6%
somnifères, tranquillisants (sans prescription)	réponses	34	13	47
	personnes %	7,5%	2,9%	10,4%
halluzinogènes	réponses	14	0	14
	personnes %	3,1%	0,0%	3,1%
cannabis	réponses	132	27	159
	personnes %	29,1%	5,9%	35,0%
tabac	réponses	120	41	161
	personnes %	26,4%	9,0%	35,5%
autres substances (tous types)	réponses	6	3	9
	personnes %	1,3%	0,7%	2,0%
troubles comparables à une addiction	réponses	10	7	17
	personnes %	2,2%	1,5%	3,7%
Total	réponses	860	239	1099
	réponses %	78,9%	21,1%	100,0%
	nombre de personnes	358	96	454
	personnes %	189,4%	52,6%	242,1%
Missing		16	7	23



## Substance posant problème : fréquence de la consommation (derniers 30 jours)

.....

Les tableaux **C2.1 - C2.8** ci-après présentent la fréquence de consommation, durant les 30 jours qui précèdent la sortie, des substances indiquées comme posant problème au moment de l'ENTRÉE, hormis la substance la plus problématique. Il apparaît ainsi que la consommation quotidienne ou quasi-quotidienne est plutôt rare (exception: le tabac).

### C2.1 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe ALCOOL (vnad015a)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	11	7,9%	3	7,3%	14	7,8%
4-6 jours par semaine	7	5,0%	3	7,3%	10	5,6%
2-3 jours par semaine	21	15,1%	9	22,0%	30	16,7%
1 jour par semaine ou moins	52	37,4%	14	34,1%	66	36,7%
aucune consommation	48	34,5%	12	29,3%	60	33,3%
Total	139	100,0%	41	100,0%	180	100,0%
Missing_	32		14		46	

### C2.2 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe OPIOÏDES, sans prescription (vnad015ba-be)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	5	4,1%	0	0,0%	5	3,4%
4-6 jours par semaine	1	0,8%	1	3,6%	2	1,3%
2-3 jours par semaine	15	12,4%	4	14,3%	19	12,8%
1 jour par semaine ou moins	45	37,2%	10	35,7%	55	36,9%
aucune consommation	55	45,5%	13	46,4%	68	45,6%
Total	121	100,0%	28	100,0%	149	100,0%
Missing_	23		10		33	

**C2.3 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe COCAÏNE ou DÉRIVÉ (vnad015ca-cc)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	4	3,2%	1	3,4%	5	3,3%
4-6 jours par semaine	2	1,6%	1	3,4%	3	2,0%
2-3 jours par semaine	18	14,5%	3	10,3%	21	13,7%
1 jour par semaine ou moins	42	33,9%	13	44,8%	55	35,9%
aucune consommation	58	46,8%	11	37,9%	69	45,1%
Total	124	100,0%	29	100,0%	153	100,0%
Missing_	27		12		39	

**C2.4 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe STIMULANTS (vnad015da-de)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	1	3,0%	1	14,3%	2	5,0%
4-6 jours par semaine	1	3,0%	1	14,3%	2	5,0%
2-3 jours par semaine	3	9,1%	0	0,0%	3	7,5%
1 jour par semaine ou moins	9	27,3%	1	14,3%	10	25,0%
aucune consommation	19	57,6%	4	57,1%	23	57,5%
Total	33	100,0%	7	100,0%	40	100,0%
Missing_	7		1		8	

**C2.5 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe SOMNIFÈRES, TRANQUILLISANTS (vnad015ea-ed)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	3	13,0%	0	0,0%	3	9,1%
4-6 jours par semaine	1	4,3%	1	10,0%	2	6,1%
2-3 jours par semaine	1	4,3%	1	10,0%	2	6,1%
1 jour par semaine ou moins	8	34,8%	5	50,0%	13	39,4%
aucune consommation	10	43,5%	3	30,0%	13	39,4%
Total	23	100,0%	10	100,0%	33	100,0%
Missing_	11		3		14	

**C2.6 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe HALLUCINOGENES (vnad015fa-fc)**

	sexe		TOTAL	
	hommes		n	%
	n	%		
2-3 jours par semaine	1	10,0%	1	10,0%
1 jour par semaine ou moins	4	40,0%	4	40,0%
aucune consommation	5	50,0%	5	50,0%
Total	10	100,0%	10	100,0%
Missing_	4		4	

**C2.7 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe CANNABIS (vnad015h)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	9	7,8%	4	19,0%	13	9,6%
4-6 jours par semaine	6	5,2%	1	4,8%	7	5,1%
2-3 jours par semaine	16	13,9%	1	4,8%	17	12,5%
1 jour par semaine ou moins	29	25,2%	7	33,3%	36	26,5%
aucune consommation	55	47,8%	8	38,1%	63	46,3%
Total	115	100,0%	21	100,0%	136	100,0%
Missing_	17		6		23	

**C2.8 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe TABAC (vnad015i)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	104	94,5%	38	100,0%	142	95,9%
4-6 jours par semaine	2	1,8%	0	0,0%	2	1,4%
1 jour par semaine ou moins	2	1,8%	0	0,0%	2	1,4%
aucune consommation	2	1,8%	0	0,0%	2	1,4%
Total	110	100,0%	38	100,0%	148	100,0%
Missing_	10		3		13	

## Problème principal à l'ADMISSION et consommation au cours des 30 jours précédant la sortie

.....

### C3 Problème principal à l'admission (vmed010 resp. vned010)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
alcool	61	16,8%	21	21,2%	82	17,7%
opioïdes (sans prescription)	117	32,2%	35	35,4%	152	32,9%
cocaïne et dérivé	102	28,1%	23	23,2%	125	27,1%
stimulants	11	3,0%	1	1,0%	12	2,6%
médicaments (sans prescription)	5	1,4%	1	1,0%	6	1,3%
hallucinogènes	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
cannabis	56	15,4%	13	13,1%	69	14,9%
tabac	2	0,6%	1	1,0%	3	0,6%
autres substances	3	0,8%	2	2,0%	5	1,1%
troubles comparables à une addiction	5	1,4%	2	2,0%	7	1,5%
Total	363	100,0%	99	100,0%	462	100,0%
Missing_	11		4		15	

### C4 Consommation (derniers 30 jours): sous-groupe: problème principal à l'admission ALCOOL (vmed010/vned010, vnad015a)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	6	12,2%	1	6,3%	7	10,8%
4-6 jours par semaine	3	6,1%	1	6,3%	4	6,2%
2-3 jours par semaine	6	12,2%	4	25,0%	10	15,4%
1 jour par semaine ou moins	15	30,6%	5	31,3%	20	30,8%
aucune consommation	19	38,8%	5	31,3%	24	36,9%
Total	49	100,0%	16	100,0%	65	100,0%
Missing_	12		5		17	

**C5 Consommation (derniers 30 jours): sous-groupe: problème principal à l'admission OPIOÏDES, sans prescription (vmed010/vned010, vнад015ba-be)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	5	6,8%	0	0,0%	5	5,3%
4-6 jours par semaine	1	1,4%	1	5,0%	2	2,1%
2-3 jours par semaine	7	9,5%	4	20,0%	11	11,7%
1 jour par semaine ou moins	24	32,4%	7	35,0%	31	33,0%
aucune consommation	37	50,0%	8	40,0%	45	47,9%
Total	74	100,0%	20	100,0%	94	100,0%
Missing_	43		15		58	

**C6 Consommation (derniers 30 jours): sous-groupe: problème principal à l'admission COCAÏNE et DÉRIVÉ (vmed010/vned010, vнад015ca-cc)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	1	1,6%	1	12,5%	2	2,9%
4-6 jours par semaine	2	3,2%	1	12,5%	3	4,3%
2-3 jours par semaine	13	21,0%	0	0,0%	13	18,6%
1 jour par semaine ou moins	19	30,6%	5	62,5%	24	34,3%
aucune consommation	27	43,5%	1	12,5%	28	40,0%
Total	62	100,0%	8	100,0%	70	100,0%
Missing_	40		15		55	

**C7 Consommation (derniers 30 jours): sous-groupe: problème principal à l'admission STIMULANTS (vmed010/vned010, vнад015da-de)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
4-6 jours par semaine	0	0,0%	1	100,0%	1	14,3%
1 jour par semaine ou moins	1	16,7%	0	0,0%	1	14,3%
aucune consommation	5	83,3%	0	0,0%	5	71,4%
Total	6	100,0%	1	100,0%	7	100,0%
Missing_	5		0		5	

**C8 Consommation (derniers 30 jours): sous-groupe: problème principal à l'admission MÉDICAMENTS (vmed010/vend010, vнад015ea-ed)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	1	50,0%	0	0,0%	1	50,0%
4-6 jours par semaine	1	50,0%	0	0,0%	1	50,0%
Total	2	100,0%	0	0,0%	2	100,0%
Missing_	3		1		4	

**C9 Consommation (derniers 30 jours): sous-groupe: problème principal à l'admission CANNABIS (vmed010/vned010, vнад015h)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	3	8,1%	3	42,9%	6	13,6%
4-6 jours par semaine	3	8,1%	0	0,0%	3	6,8%
2-3 jours par semaine	4	10,8%	0	0,0%	4	9,1%
1 jour par semaine ou moins	8	21,6%	1	14,3%	9	20,5%
aucune consommation	19	51,4%	3	42,9%	22	50,0%
Total	37	100,0%	7	100,0%	44	100,0%
Missing_	19		6		25	

**Objectif de consommation**

.....

**C10** 55% des client-e-s indiquent avoir pour objectif de consommation l'abstinence complète, 22% la consommation contrôlée. 62% des client-e-s (problème OPIOÏDES, **C12**) et 61% des client-e-s (problème COCAÏNE et dérivés, **C13**) indiquent avoir pour objectif de consommation l'abstinence complète.

**C10 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance posant problème au moment de la sortie? (vzao010)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
abstinence définitive	156	57,1%	28	44,4%	184	54,8%
abstinence limitée dans le temps	14	5,1%	2	3,2%	16	4,8%
consommation contrôlée	57	20,9%	16	25,4%	73	21,7%
aucune limitation envisagée	15	5,5%	6	9,5%	21	6,3%
pas déterminé pour l'instant	28	10,3%	11	17,5%	39	11,6%
autre	3	1,1%	0	0,0%	3	0,9%
Total	273	100,0%	63	100,0%	336	100,0%
Missing_	101		40		141	

**C11 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance: ALCOOL (vzao010, vmed010/vned010)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
abstinence définitive	20	46,5%	7	50,0%	27	47,4%
abstinence limitée dans le temps	2	4,7%	1	7,1%	3	5,3%
consommation contrôlée	17	39,5%	4	28,6%	21	36,8%
aucune limitation envisagée	1	2,3%	1	7,1%	2	3,5%
pas déterminé pour l'instant	2	4,7%	1	7,1%	3	5,3%
autre	1	2,3%	0	0,0%	1	1,8%
Total	43	100,0%	14	100,0%	57	100,0%
Missing_	18		7		25	

**C12 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance: OPIOÏDES, sans prescription (vzao010, vmed010/vned010)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
abstinence définitive	54	67,5%	9	40,9%	63	61,8%
abstinence limitée dans le temps	2	2,5%	1	4,5%	3	2,9%
consommation contrôlée	12	15,0%	7	31,8%	19	18,6%
aucune limitation envisagée	7	8,8%	2	9,1%	9	8,8%
pas déterminé pour l'instant	5	6,3%	3	13,6%	8	7,8%
Total	80	100,0%	22	100,0%	102	100,0%
Missing_	37		13		50	

**C13 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance: COCAÏNE et DÉRIVÉ (vzao010, vmed010/vned010)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
abstinence définitive	46	62,2%	8	53,3%	54	60,7%
abstinence limitée dans le temps	6	8,1%	0	0,0%	6	6,7%
consommation contrôlée	9	12,2%	2	13,3%	11	12,4%
aucune limitation envisagée	2	2,7%	1	6,7%	3	3,4%
pas déterminé pour l'instant	10	13,5%	4	26,7%	14	15,7%
autre	1	1,4%	0	0,0%	1	1,1%
Total	74	100,0%	15	100,0%	89	100,0%
Missing_	28		8		36	

**C14 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance: STIMULANTS (vzao010, vmed010/vned010)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
abstinence définitive	8	72,7%	0	0,0%	8	66,7%
abstinence limitée dans le temps	1	9,1%	0	0,0%	1	8,3%
consommation contrôlée	1	9,1%	0	0,0%	1	8,3%
pas déterminé pour l'instant	1	9,1%	1	100,0%	2	16,7%
Total	11	100,0%	1	100,0%	12	100,0%
Missing_	0		0		0	

**C15 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance: MÉDICAMENTS, sans prescription (vzao010, vmed010/vned010)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
abstinence définitive	1	25,0%	0	0,0%	1	25,0%
abstinence limitée dans le temps	1	25,0%	0	0,0%	1	25,0%
pas déterminé pour l'instant	2	50,0%	0	0,0%	2	50,0%
Total	4	100,0%	0	0,0%	4	100,0%
Missing_	1		1		2	

**C16 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance: CANNABIS (vzao010, vmed010/vned010)**

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
abstinence définitive	22	47,8%	3	33,3%	25	45,5%
abstinence limitée dans le temps	2	4,3%	0	0,0%	2	3,6%
consommation contrôlée	11	23,9%	3	33,3%	14	25,5%
aucune limitation envisagée	3	6,5%	2	22,2%	5	9,1%
pas déterminé pour l'instant	8	17,4%	1	11,1%	9	16,4%
Total	46	100,0%	9	100,0%	55	100,0%
Missing_	10		4		14	



## Périodes de rechute au cours du traitement

.....

**C17** 25% des client-e-s indiquent ne pas avoir connu de périodes de rechute durant le traitement concernant leur problème de dépendance, ou alors les thérapeutes indiquent qu'il n'y a pas eu de rechutes. Parmi les personnes qui terminent le traitement comme prévu, 29% indiquent ne pas avoir de période de rechute. Ce taux est de 21% pour les personnes dont le traitement est interrompu. La différence est significative (pas de tableau en illustration; Cr's  $V=.21$ ,  $p < .05$ ).

### C17 Périodes de rechute en lien avec le problème de dépendance (vyaz010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
aucune	78	23,2%	27	30,0%	105	24,6%
une fois	47	14,0%	7	7,8%	54	12,7%
deux fois	30	8,9%	2	2,2%	32	7,5%
trois ou quatre fois	72	21,4%	17	18,9%	89	20,9%
cinq fois ou plus	109	32,4%	37	41,1%	146	34,3%
Total	336	100,0%	90	100,0%	426	100,0%
Missing_ 1,00	38		13		51	

**C18** Les rechutes signalées le sont par rapport aux substances suivantes (plusieurs réponses possibles): pour 55% l'alcool, pour 43% la cocaïne et ses dérivés et pour 42% les opioïdes.

**C18 Périodes de rechute: quelle substances? (plusieurs réponses: vyaz020a - vyaz020j)**

		sexe		TOTAL
		hommes	femmes	
alcool	réponses	141	33	174
	personnes %	44,9%	10,5%	55,4%
opioïde (héroïne, méthadone, codéïne, etc.)	réponses	105	27	132
	personnes %	33,4%	8,6%	42,0%
cocaïne ou dérivé	réponses	112	24	136
	personnes %	35,7%	7,6%	43,3%
autres stimulants (amphétamine, MDMA, méthamphétamine, etc.)	réponses	25	5	30
	personnes %	8,0%	1,6%	9,6%
somnifères/tranquillisants (benzodiazépine etc.)	réponses	20	11	31
	personnes %	6,4%	3,5%	9,9%
hallucinogène (LSD, kétamine, etc.)	réponses	5	1	6
	personnes %	1,6%	0,3%	1,9%
substances volatiles	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
cannabis	réponses	88	15	103
	personnes %	28,0%	4,8%	32,8%
tabac	réponses	16	0	16
	personnes %	5,1%	0,0%	5,1%
autres substances	réponses	9	2	11
	personnes %	2,9%	0,6%	3,5%
Total	réponses	521	118	639
	réponses %	80,9%	19,1%	100,0%
	nombre de personnes	254	60	314
	personnes %	165,9%	37,6%	203,5%
Missing		4	3	7

## D PRONOSTIC

**D1** Par rapport au problème d'addiction, le pronostic établi est bon pour 30% des client-e-s sortant du traitement, et très bon pour 9%. Il n'y a pas de différence entre les sexes.

### D1 Pronostic face au problème de dépendance (vzag010)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
très bon pronostic	27	7,9%	12	13,8%	39	9,1%
bon pronostic	108	31,7%	19	21,8%	127	29,7%
plutôt mauvais pronostic	125	36,7%	30	34,5%	155	36,2%
mauvais pronostic	81	23,8%	26	29,9%	107	25,0%
Total	341	100,0%	87	100,0%	428	100,0%
Missing_	33		16		49	

**D2a** De manière prévisible, le pronostic est étroitement lié au mode de sortie: pour 44% de la clientèle dont le traitement est interrompu, il est plutôt défavorable et pour 44% de cette même clientèle, il est défavorable. Tel n'est pas le cas pour les personnes ayant achevé le traitement comme prévu: le pronostic est plutôt défavorable pour 29 % de ce groupe seulement et défavorable pour 4%. Il est bon ou très bon pour 67% des personnes dont le traitement arrive à terme comme prévu, ce qui n'est le cas que pour 13% de la clientèle interrompant le traitement (Cr's  $V=,61$ ,  $p<.000$ ).

### D2a Pronostic face au problème de dépendance et circonstances des sortie: TOTAL (vzag010, vmab040 sans autre raisons), sans missing

	fin régulière avec ou sans transfert		rupture ou perte de contact		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
très bon pronostic	27	14,4%	7	3,5%	34	8,8%
bon pronostic	98	52,4%	18	9,0%	116	29,9%
plutôt mauvais pronostic	55	29,4%	88	43,8%	143	36,9%
mauvais pronostic	7	3,7%	88	43,8%	95	24,5%
Total	187	100,0%	201	100,0%	388	100,0%

### D2b Pronostic face au problème de dépendance et circonstances des sortie: HOMMES (vzag010, vmab040 sans autre raisons), sans missing

	fin régulière avec ou sans transfert		rupture ou perte de contact		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
très bon pronostic	20	12,6%	4	2,7%	24	7,8%
bon pronostic	85	53,5%	13	8,7%	98	31,7%
plutôt mauvais pronostic	47	29,6%	67	44,7%	114	36,9%
mauvais pronostic	7	4,4%	66	44,0%	73	23,6%
Total	159	100,0%	150	100,0%	309	100,0%

**D2c Pronostic face au problème de dépendance et circonstances des sortie:  
FEMMES (vzag010, vmab040 sans autre raisons), sans missing**

	fin régulière avec ou sans tranfert		rupture ou perte de contact		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
très bon pronostic	7	25,0%	3	5,9%	10	12,7%
bon pronostic	13	46,4%	5	9,8%	18	22,8%
plutôt mauvais pronostic	8	28,6%	21	41,2%	29	36,7%
mauvais pronostic	0	0,0%	22	43,1%	22	27,8%
Total	28	100,0%	51	100,0%	79	100,0%