



**University of
Zurich** ^{UZH}

**Zurich Open Repository and
Archive**

University of Zurich
University Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch

Year: 2010

**Der Forschungsverbund stationäre Suchttherapie act-info-FOS im Jahr 2009
- Tätigkeitsbericht und Jahresstatistik - Lebenssituation bei Eintritt und bei
Austritt - Vergleich ausgewählter Aspekte für die im Jahr 2009
ausgetretenen Klienten und Klientinnen**

Schaaf, Susanne ; Grichting, Esther

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich
ZORA URL: <https://doi.org/10.5167/uzh-43887>
Published Research Report

Originally published at:

Schaaf, Susanne; Grichting, Esther (2010). Der Forschungsverbund stationäre Suchttherapie act-info-FOS im Jahr 2009 - Tätigkeitsbericht und Jahresstatistik - Lebenssituation bei Eintritt und bei Austritt - Vergleich ausgewählter Aspekte für die im Jahr 2009 ausgetretenen Klienten und Klientinnen. Zürich: ISGF Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung.



**University of
Zurich** ^{UZH}

**Zurich Open Repository and
Archive**

University of Zurich
Main Library
Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch

Year: 2010

**Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la
toxicomanie act-info-FOS en 2009 - Rapport d'activités et
statistiques annuelles globales - Situation des clients et des
clientes à leur admission et à leur sortie: comparaison de
certains aspects pour la clientèle dont l'année de sortie est
2009**

S Schaaf, E Grichting

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich
<http://dx.doi.org/10.5167/uzh-43899>

Originally published at:

Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie act-info-FOS en 2009 - Rapport d'activités et statistiques annuelles globales - Situation des clients et des clientes à leur admission et à leur sortie: comparaison de certains aspects pour la clientèle dont l'année de sortie est 2009. Edited by: Schaaf, S; Grichting, E. Zurich, 2010.



Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie act-*info*-FOS en 2009

- Rapport d'activités et statistiques annuelles globales
- Situation des clients et des clientes à leur admission et à leur sortie : comparaison de certains aspects pour la clientèle dont l'année de sortie est 2009

Ed. : Service de coordination act-*info*-FOS
Etabli par Susanne Schaaf et Esther Grichting
avec la collaboration de Heidi Bolliger

Le projet act-*info*-FOS est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)

act-*info*-FOS

Ligue pour l'évaluation des
thérapies résidentielles
de la toxicodépendance

Rapport de recherche de l'Institut de recherche sur la santé publique
et les addictions ISGF

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	3
1. RÉSUMÉ	4
2. RAPPORT D'ACTIVITÉS 2009	6
2.1. Personnel du Service de coordination <i>act-info-FOS</i>	6
2.2. Centres participants	6
2.2.1. Liste des centres ayant participé à <i>act-info-FOS</i> en 2009.....	6
2.3. Activités du Service de coordination <i>act-info-FOS</i> dans le cadre de la statistique de base	8
2.3.1. Participation dans l'équipe du monitoring national d'aide aux personnes dépendantes <i>act-info</i>	8
2.3.2. Rencontres, rapports et publications.....	9
2.4. Autres projets.....	11
2.4.1. Autres projets <i>act-info-FOS</i>	11
2.4.2. Autres projets globaux.....	12
2.5. Perspectives	12
3. STATISTIQUES SUR LA CLIENTÈLE DE LA LIGUE POUR L'ÉVALUATION DES TRAITEMENTS RÉSIDENTIELS DE LA TOXICOMANIE ACT-INFO-FOS – MÉTHODOLOGIE	13
3.1. Instruments et collecte des données.....	13
3.2. Règles concernant la protection des données	13
3.3. Saisie électronique et contrôle des données	14
3.4. Préparation des données.....	14
3.5. Echantillons 2009.....	14
4. SITUATION DES CLIENTS ET DES CLIENTES À LEUR ADMISSION ET À LEUR SORTIE : COMPARAISON DE CERTAINS ASPECTS POUR LA CLIENTÈLE DONT L'ANNÉE DE SORTIE EST 2009	16
4.1. Traitement de substitution.....	16
4.2. Logement.....	18
4.3. Relation de couple	20
4.4. Sources de revenu.....	21

4.5. Activité rémunératrice	23
4.6. Endettement	25
4.7. Consommation.....	28
4.8. Résumé	35
4.9. Annexe aux tableaux : tableaux des entrées et des sorties 2009	36
4.9.1. Tableaux des entrées et des sorties 2009	38

Remerciements

Outil éprouvé de coopération entre les chercheurs et les praticiens, la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie se poursuit sous l'ère *act-info-FOS*. Nous souhaitons remercier ici tous ceux qui font partie de la Ligue *act-info-FOS* et qui ont contribué à la parution du présent rapport :

- les clients et les clientes pour leur disponibilité à répondre aux questions ;
- les collaborateurs et les collaboratrices des établissements thérapeutiques participant au projet *act-info-FOS* pour leur investissement ;
- l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en tant que mandataire du projet, ainsi que les responsables à l'OFSP ;
- Sylvie Gentizon, pour la traduction en français du présent rapport.

Service de coordination *act-info-FOS*

1. Résumé

En 2009, la documentation nationale act-*info*-FOS sur la clientèle des établissements thérapeutiques résidentiels s'est poursuivie pour la septième année consécutive, après avoir existé durant huit ans en tant que Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie (FOS). Cette année, 50 établissements thérapeutiques faisaient partie de la Ligue.

Le présent rapport annuel est composé du rapport d'activité du Service de coordination act-*info*-FOS et des statistiques annuelles 2009 sous forme de tableaux commentés. Durant l'année écoulée, 602 admissions et 591 sorties ont été consignées.

L'évaluation spéciale (chap. 4) porte sur les clients et clientes d'act-*info*-FOS ayant quitté la thérapie en 2009 et compare leur situation avant leur admission et celle à leur sortie selon certains critères choisis. À première vue, la situation avant l'entrée et à la sortie semble – sur la *globalité* du groupe – assez similaire. Un examen plus détaillé met en évidence des déplacements à l'intérieur de certains sous-groupes de la clientèle (p. ex. du financement par l'aide sociale avant la thérapie à un revenu propre à la sortie), mais aussi des situations inchangées (p. ex. le même endettement lourd avant l'admission et à la sortie). Le mode de sortie, facteur d'influence pertinent du point de vue du résultat, apparaît également dans l'évaluation spéciale comme une caractéristique distinctive entre les modifications qui surviennent : ainsi, les clients et clientes ayant achevé la thérapie par une sortie prévue recourent plus rarement, par exemple, à la substitution, sont plutôt intégrés sur le marché du travail, moins fréquemment endettés et consomment moins avant la sortie.

Le Service de coordination act-*info*-FOS a, en 2009, à nouveau travaillé dans le cadre de l'équipe du projet de statistiques nationales d'aide aux personnes dépendantes act-*info*, une équipe qui vise à améliorer la diffusion des résultats des travaux de monitoring, des produits, et du potentiel d'utilisation d'act-*info*.

En 2009, le Service de coordination act-*info*-FOS a mené la huitième enquête relative à la satisfaction de la clientèle QuaTheSI-39, puis adressé aux institutions participantes le rapport confidentiel relatif à chacune d'entre elles en temps utile pour un Management Review.

Perspectives : le Service de coordination act-*info*-FOS poursuivra son action dans le cadre du projet global act-*info* ainsi que sa participation au développement du système de monitoring national act-*info*. Le projet act-*info* a fait l'objet d'une grande évaluation externe. Sur cette base, il est prévu de continuer à améliorer l'adéquation et l'efficacité d'act-*info* et des produits act-*info*, compte tenu des groupes cibles. Un raccourcissement du questionnaire est aussi au programme pour 2010/2011, qui réduira nettement le temps que les établissements participants y consacrent et facilitera l'entrée dans act-*info* de ceux qui ne participent pas encore. Il est aussi prévu de poursuivre la publication annuelle de l'infolettre « Éclairages » d'act-*info*.

act-*info* vise à collaborer avec le projet national QuaTheDA-E (qui porte sur la qualité des résultats dans le traitement de l'addiction), et avec le futur projet de monitoring des dépendances, pour permettre l'exploitation des synergies.

2. Rapport d'activités 2009

2.1. Personnel du Service de coordination act-info-FOS

Au cours de l'année 2009, les personnes suivantes ont pris part aux projets act-info-FOS ou du Service de coordination act-info-FOS à l'Institut de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF) :

- Susanne Schaaf, lic. psychologie : responsable du projet Documentation de base act-info-FOS, directrice de recherche des projets act-info-FOS
- Esther Grichting, lic., ass. sociale dipl. : coordination d'act-info-FOS en Suisse romande et au Tessin, collaboration au projet
- Heidi Bolliger : collaboratrice de projet, secrétariat du Service de coordination act-info-FOS.

2.2. Centres participants

En 2009, 50 établissements faisaient partie d'act-info-FOS : 38 de Suisse alémanique (dont trois situés au Tessin), 9 de Suisse romande (dont un établissement germanophone dans le canton du Jura) et 3 centres italophones dans le canton du Tessin. Parmi ces centres, 44 ont donné des questionnaires de la clientèle pour évaluation. En 2009, aucun établissement n'a quitté act-info-FOS ou n'a été fermé.

2.2.1. Liste des centres ayant participé à act-info-FOS en 2009

AG	Institut für Sozialtherapie, Sozialtherapeutische Klinik, 5704 Egliswil
	Inst. für Sozialtherapie, Stiftung, Reha.zentrum Niederlenz, 5702 Niederlenz
	Klinik im Hasel, 5728 Gontenschwil
	Stiftung Wendepunkt, Wohngemeinschaft Shalom, 5033 Oftringen
AR	Best Hope, 9104 Waldstatt/Herisau
	RehabilitationsZentrum Lutzenberg, 9426 Lutzenberg
BE	Chly Linde, Therapeutische Gemeinschaft, 3089 Vorderfultigen
	PRISMA, Suchttherapie in Gastfamilien des Contact Netz, 3000 Bern
	Projekt Alp, Familienplatzierung, Münsingen
	St. Johannsen, Massnahmenzentrum, 2525 Le Landeron
	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft Bordei, 6657 Palagnedra (TI)
	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft Brienzwiler, 3856 Brienzwiler

BE (suite)	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft zum Schlüssel, 3036 Detligen
	Stiftung Terra Vecchia, Familienplätze, 3011 Bern
	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft Melchenbühl, 3073 Gümligen
	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft Saurehorn, 3054 Schüpfen
	suchttherapiebärn (anciennement : Stiftung Hilfe zum Leben), 3006 Bern
	Zueflucht, Christlich-therap. Wohngemeinschaft, 3715 Adelboden
FR	Foyer Horizon, Fondation Le Tremplin, 1783 Pensier
	Le Radeau, Centre d'Accueil communautaire, 1693 Orsonnens
JU	Clos-Henri, Centre de traitement pour personnes dépendantes, 2714 Le Prédame
LU	Ausserhofmatt (AHM), Therapeutische Gemeinschaft, 6105 Schachen
	Lehn, Therapie- und Bildungswerkstatt, 6012 Obernau/Kriens
	Neuhof, Therapeutische Gemeinschaft, 6020 Emmenbrücke
	Ufwind, 6206 Neuenkirch
NE	Foyer André, 2117 La Côte-aux-Fées
SO	Casa Fidelio, 4626 Niederbuchsiten
	Chratten, Therapeutische Wohngemeinschaft, 4229 Oberbeinwil
	Lilith, Teil/stationäre therap. Frauen-Kind Wohngem., 4625 Oberbuchsiten
TI	Bognago, Therapeutische Wohngemeinschaft, 6614 Brissago
	Centro Residenziale a medio termine, 6516 Gerra Piano
	Drogentherapie Camarco, Therapeutische Wohngemeinschaft, 6823 Pugerna
	Il Gabbiano, Fondazione, Comunità terapeutica, 6904 Lugano
	Villa Argentina, Centro terapeutico, 6900 Lugano
VD	Fondation Bartimée, 1422 Grandson
	Fondation Le Levant (Couvét, Pichollette), 1005 Lausanne
	Foyer du Relais, Association du Relais, 1110 Morges
VS	Foyer Rives du Rhône (via LVT), 1951 Sion
	CAAD (anciennement : Courte Echelle), 1907 Saxon
ZG	Sennhütte, Therapeutische Gemeinschaft, 6300 Zug
ZH	Arche, Therapiegemeinschaft, 8180 Bülach
	Suchtbehandlung Frankental, Stationäre Therapie, 8049 Zürich
	Freihof Küsnacht, Wohngruppe, 8700 Küsnacht
	Fuente Alamo Kontaktstelle, 8008 Zürich
	Meilestei, 8124 Uessikon bei Maur
	Neuthal, Therapeutische Gemeinschaft, 8344 Bäretswil
	Quellenhof, 8546 Gundetswil
	Rehazentrum Sunedörfli, 8816 Hirzel
	start again, Zentrum für Suchttherapie, 8032 Zürich
	Ulmenhof, 8913 Ottenbach

Au cours de la période sous revue, le Service de coordination *act-info*-FOS a reçu des « Données relatives à l'institution » actualisées (questionnaire sur les institutions, version 3.1) concernant 50 centres de traitement. Parmi ces établissements, 56 % (28) sont des centres de traitement résidentiel traitant exclusivement des problèmes liés aux substances *illégal*es, 10 % (5) accueillent des clients et clientes dont les problèmes sont liés à tout type de substance, 16 % (8) traitent des problèmes de *dépendance* divers (liés ou non à des substances) et 18 % (9) traitent des problèmes de dépendance tout en assurant d'autres fonctions. Les écarts par rapport à l'exercice précédent sont minimes, par exemple une part un peu plus élevée d'établissements traitant une clientèle souffrant de problèmes liés à tout type de substances ou de problèmes de dépendance divers, avec logiquement une légère baisse parmi les autres types d'institutions mentionnés. Dans 34 % des institutions (17), il est possible de suivre un traitement de sevrage complet ou partiel.

2.3. Activités du Service de coordination *act-info*-FOS dans le cadre de la statistique de base

En 2009, les activités principales du Service de coordination *act-info*-FOS auront été la participation aux travaux de l'équipe du projet de système de monitoring national *act-info* (2.3.1) ainsi que des rencontres, rapports et publications (cf. chap. 2.3.2). Etant donné que quelques institutions continuent à collecter leurs données sur papier, les travaux de routine tels que l'enregistrement et le codage des questionnaires remplis ainsi que l'organisation de la saisie des données sont restés des tâches centrales. Enfin, dans le cadre des statistiques de base, il a également fallu assurer l'apurement des données, la coordination de toutes les activités au sein d'*act-info*-FOS et la communication des renseignements concernant le recueil des données et les rapports.

2.3.1. Participation dans l'équipe du monitoring national d'aide aux personnes dépendantes *act-info*

L'équipe du projet de statistiques nationales d'aide aux personnes dépendantes *act-info*¹, à laquelle appartient la direction du projet *act-info*-FOS, a terminé l'évaluation complète des données *act-info* 2008 au cours de l'année de référence. Le rapport *act-info* 2008 peut être commandé gratuitement en version reliée, ou téléchargé sous

www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00632/03290/03295/index.html?lang=fr

¹ *act-info* comprend les domaines partiels suivants : traitements résidentiels des dépendances à l'alcool et aux médicaments (*act-info*-Residalc : Marina Delgrande Jordan) ; traitements résidentiels des dépendances aux drogues illégales (*act-info*-FOS : Susanne Schaaf) ; aide psycho-sociale ambulatoire en cas de problèmes de dépendance (SAMBAD : Etienne Maffli) ; statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone (Urs Künzi) ; traitements avec prescription d'héroïne (HeGeBe : Michael Schaub). Pour plus d'informations sur le projet global *act-info* : www.act-info.ch ou www.isgf.ch (>*act-info*-FOS).

Souhaitant rendre compte activement des résultats du monitoring, *act-info* a publié début 2009 le premier numéro de l'infolettre périodique « Éclairages », consacré à l'évolution des consommations des jeunes usagers des secteurs ambulatoire et résidentiel de prise en charge des dépendances en Suisse :

<http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00632/03290/03295/index.html?lang=fr>

Le deuxième numéro de ces « Éclairages », qui s'arrête sur « La prise en charge des personnes âgées de 40 ans ou plus dans le domaine des dépendances : chronicisation ou incidence tardive ? », est achevé et il peut être téléchargé sur le site Web d'*act-info*.

Pour mieux se faire connaître et mieux faire connaître ses produits, *act-info* a organisé un symposium en collaboration avec Infodrog. Ce symposium, qui s'est tenu le 5 mars 2009 à Berne, était intitulé « Consommation de substances psychotropes en Suisse – Tendances et nouveaux défis ». Les contributions figurent à l'adresse suivante : <http://www.actinfo2009.ch/fr/programme.htm>. Ce symposium visait à permettre des échanges entre spécialistes et à dégager les tendances futures pour déterminer les approches les plus adaptées pour y faire face. Il a aussi été l'occasion de présenter les principaux résultats de l'évaluation externe d'*act-info* et les propositions d'optimisation qui en découlent. Ce symposium était le premier d'une série de rencontres annuelles destinées aux spécialistes.

2.3.2. Rencontres, rapports et publications

Réunions consacrées aux rapports annuels :

Deux réunions se sont tenues en 2009, une en Suisse alémanique (à Zurich, le 23 juin) et l'autre en Suisse romande (à Lausanne, le 17 septembre). Chacune des séances de 2009 sur le rapport annuel était consacrée au thème spécifique « Exigences posées par le double diagnostic pour la clientèle en traitement résidentiel : que faire ? ». Ce thème présente un grand intérêt pour de nombreuses institutions puisque la clientèle concernée par un double diagnostic constitue une réalité quotidienne dans les établissements dispensant des traitements résidentiels (40 % des établissements résidentiels enregistrés dans la banque de données exploitée par Infodrog sur l'aide aux personnes dépendantes en Suisse citent explicitement ce groupe de clients et clientes comme groupe cible). Une fois encore, les réunions ont été conçues de manière ciblée, en prise directe sur la pratique.

A Zurich, le docteur Franz Moggi, chef du service de psychologie clinique de la clinique psychiatrique universitaire de Berne (PUK Bern), a offert une solide introduction au thème, sur la base de sa longue expérience de clinicien et de chercheur, en donnant des définitions et en exposant l'avancée du double diagnostic, ainsi que des modèles explicatifs courants et des approches de traitements confirmées. Puis, trois représentants de la pratique ont apporté leur point de vue. Peter Marti (services psychiatriques du canton de Soleure) s'est exprimé sur l'approche pour le traitement d'une clientèle confrontée à une problématique multiple, en se basant sur les principes du modèle de construction de solutions et des entretiens de motivation. Friedhelm Löffelhardt et Daniel

Bühler (Reha-Zentrum Niederlenz) ont décrit leur conception et leurs expériences avec une clientèle qui se distingue de plus en plus par des troubles de la personnalité antisociale. Les actes ont été adressés aux institutions ayant participé à act-*info*-FOS et ils sont disponibles (en allemand) à l'adresse :

www.isgf.ch/index.php?id=60&pub_id=100085

A la séance de Lausanne consacrée au même thème, le docteur Miguel Marset (auparavant à la Fondation Phénix de Genève) a lui aussi recouru à sa longue pratique pour introduire le sujet et ses différentes facettes. La deuxième partie de la rencontre était une table ronde, donnant à toutes les personnes présentes l'occasion de partager leurs propres expériences, de poser des questions et de débattre. Dans cette deuxième partie, le docteur Marset jouait aussi le rôle de spécialiste de référence. La discussion a été extrêmement animée et les participants ont fait grand usage de la possibilité de poser des questions. Cette rencontre de Lausanne fait également l'objet d'actes qui ont déjà été envoyés et sont disponibles à l'adresse :

http://www.isgf.ch/index.php?id=60&pub_id=100088.

Rapports et publications :

- Gerlich, M; Schaaf, S; Salis Gross, C; Uchtenhagen, A (2009). Comparison of heroin-assisted treatment and abstinence-oriented residential treatment in Switzerland based on patient characteristics. In: Contemporary Drug Problems 36(1/2), 327-343
- Schaaf, S, Griching, E (2009): Gesamtbericht Achte Stichtagserhebung zur Klientenzufriedenheit in stationärer Suchttherapie QuaTheSI-39 - 21.-25. September 2009 - für Einrichtungen zur Behandlung von Problemen mit illegalen Drogen und Alkohol (Nr. 278)
- Schaaf, S; Griching, E (ed.) (2009): Der Forschungsverbund stationäre Suchttherapie act-*info*-FOS im Jahr 2008 - Tätigkeitsbericht und Jahresstatistik - Behandlungserfahrung vor Eintritt, Austrittsmodus und Anschlussbehandlung - die FOS-Klientel im Vergleich mit der Klientel anderer Behandlungssektoren (Nr. 271)
- Schaaf, S; Griching, E (ed.) (2009): Doppeldiagnose – anspruchsvolle Klientinnen und Klienten in stationärer Suchttherapie: was tun? Dokumentation zur Jahresberichtssitzung vom 23. Juni 2009 in Zürich
- Schaaf, S, Griching, E (éd.) (2010): Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie act-*info*-FOS en 2008 – Rapport d'activités et statistiques annuelles globales – Parcours thérapeutique avant l'admission, mode de sortie et traitement prévu après la sortie: la clientèle FOS comparée avec celle d'autres secteurs de traitement de l'addiction (n°279)
- Schaaf, S, Griching E (2010) : Rapport général Huitième enquête de satisfaction des clientes et des clients d'institutions du domaine des dépendances QuaTheSI-39 – 21-25 septembre 2009 – destiné aux institutions accueillant des personnes dépendantes des drogues illégales et de l'alcool (n°280)
- Schaaf, S, Griching E (éd.) (2010) : Documentation de l'exposé fait sur le thème « Exigences posées par le double diagnostic pour la clientèle en traitement résidentiel : que faire ?

Conférences et rencontres :

- Schaaf, S: Der Aspekt "Nationalität" im Rahmen des Suchthilfemonitorings act-*info*. Nationale Fachtagung migrationsgerechte Suchtarbeit, Bienne, 4.6.2009

2.4. Autres projets

En 2009, le Service de coordination *act-info-FOS* s'est engagé dans d'autres projets, parfois coordonnés avec *act-info-FOS* et parfois distincts, mais qui étaient exclusivement ou essentiellement liés au domaine de l'aide en matière de dépendance dispensée dans le secteur résidentiel.

2.4.1. Autres projets *act-info-FOS*

Documentation de la clientèle des centres de désintoxication dans le canton d'Argovie : la description de la clientèle des centres de sevrage du canton d'Argovie, effectuée dans le cadre du controlling cantonal, a également été réalisée en 2009. Comme l'an passé, les données ont été saisies en ligne au moyen d'un questionnaire court et compatible avec *act-info*. L'évaluation des données a été remise tous les trimestres au mandant.

Petits projets mandatés par des institutions ou des cantons : en 2009, diverses institutions et autorités cantonales nous ont mandatés pour de petits projets visant le plus souvent à l'évaluation ciblée de données existantes. Des évaluations ne sont remises à des organes cantonaux qu'avec l'accord des institutions concernées pour l'exploitation des données.

Post-enquête menée auprès de la clientèle des centres de traitement résidentiel du canton de Berne – suivi de 12 mois : cette post-enquête est un projet du groupe de travail du traitement des addictions et de réhabilitation bernois BeAK, de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne et de l'Institut de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF). Initiée par le groupe de travail BeAK, elle vise à appréhender la situation des clients et clientes 12 mois après leur sortie d'un traitement résidentiel. Les résultats présentent, aux institutions comme à la Direction de la santé publique, des bases de réflexion autour de la qualité des résultats et leur inscription dans la durée. Il est prévu que ce projet s'intègre dans QuaTheDA-E. En 2009, l'ISGF a interrogé les clients et clientes sortis l'année précédente des institutions bernoises participantes.

Nationalités et traitement résidentiel des addictions : sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les données 2008 d'*act-info-FOS* ont été analysées succinctement sous l'angle de la nationalité en 2009. Les clients et clientes n'ayant pas la nationalité suisse ont été répartis en quatre groupes de nationalités et des comparaisons ont été établies sur le sexe et l'âge, la formation, le mode de subsistance et le type de revenus avant l'entrée en thérapie, la principale substance d'addiction, le mode de sortie de thérapie et l'intégration au travail après le séjour thérapeutique. L'OFSP mettra le rapport correspondant à disposition sur son site Web.

2.4.2. Autres projets globaux

Enquête relative à la satisfaction de la clientèle en traitement résidentiel de la toxicomanie QuaTheSI-39 : en septembre 2009, l'ISGF a réalisé sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique la huitième enquête relative à la « Satisfaction des clients en traitement résidentiel ». Le financement de l'enquête de cette année a, une nouvelle fois, été assuré par Infodrog. Pour cette enquête, l'ISGF a utilisé l'instrument QuaTheSI-39, qui permet d'obtenir des données qualitatives et quantitatives sur la satisfaction. Les résultats sont adressés sous forme d'un rapport global et d'un rapport individuel aux institutions participantes qui ont co-financé le projet.

L'OFSP prépare actuellement l'extension de QuaTheSI à certains autres secteurs de traitement.

2.5. Perspectives

Dans le cadre du projet global *act-info*, le Service de coordination *act-info*-FOS continuera d'être intégré à l'équipe de projet et de participer au développement du système de monitoring national. Il est notamment prévu de publier la prochaine édition de l'infolettre annuelle « Éclairages » d'*act-info* consacrée à un sujet d'actualité sur les dépendances et d'assurer la poursuite de l'ensemble du projet.

Un autre point fort de l'année 2010 consistera à poursuivre la mise en application des résultats de l'évaluation externe portant sur *act-info*. Selon cette évaluation, il s'agit notamment de continuer d'améliorer la qualité, l'actualité et l'adéquation des produits d'*act-info* ainsi que leur utilité pour les acteurs concernés. En outre, *act-info* vise à collaborer avec le projet national QuaTheDA-E (qui porte sur la qualité des résultats dans le traitement de l'addiction), et avec le projet de monitoring national des addictions (statistiques sur les consommations), pour renforcer le travail en réseau et pour éviter les travaux réalisés à double.

Au niveau d'*act-info*-FOS, la poursuite de la statistique partielle sur les thérapies résidentielles est garantie et les résultats des recherches sont présentés lors de plusieurs rencontres (p. ex. journée Migration et Dépendances : tous les exposés sont disponibles sous www.migration.infodrog.ch/fr/index.htm).

De plus, des analyses spécifiques sont effectuées à la demande d'institutions de thérapie (p. ex. comparaison pluriannuelle du profil de la clientèle d'une institution, complétée par une enquête supplémentaire de catamnèse) et des réflexions sont engagées sur une utilisation plus large des données d'*act-info*-FOS.

3. Statistiques sur la clientèle de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie act-*info*-FOS – Méthodologie

La Ligue act-*info*-FOS produit une documentation nationale, en continu, de la clientèle des établissements thérapeutiques résidentiels et de l'évaluation du séjour qui y est fait. Pour ce faire, des informations sont recueillies au moment de l'admission de la clientèle et au moment de leur sortie, sur des sujets tels que leur situation sociale (logement, travail, etc.), leur consommation de drogues, leur santé ou encore leur situation juridique.

Ces relevés nationaux sur la clientèle des établissements de traitement résidentiel des toxicomanies en Suisse sont effectués depuis 1995 sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et dépouillés annuellement. Depuis le 1^{er} janvier 2003, act-*info*-FOS emploie les questionnaires act-*info*.

3.1. Instruments et collecte des données

Les données ont été recueillies au moyen des questionnaires standard act-*info*-FOS, disponibles en allemand, français et italien (questionnaire d'entrée E3.1 et questionnaire de sortie A3.1). Le questionnaire de sortie est rempli dès lors qu'un client ou une cliente cesse la thérapie, selon les termes convenus ou non, qu'il passe à un autre traitement ou qu'il s'installe en appartement protégé.

La collecte des questionnaires se fait dans les centres participant à l'enquête act-*info*-FOS. Le client est interrogé par un collaborateur du centre de traitement, si possible dans les deux premières semaines qui suivent son admission. Le questionnaire de sortie est également rempli par un membre de l'équipe, mais pas forcément dans le cadre d'une enquête auprès de la clientèle. En effet, en raison des sorties non prévues (interruptions), cela s'avère souvent impossible. Les personnes participant à la recherche disposent d'un manuel et de l'appui téléphonique du Service de coordination act-*info*-FOS.

3.2. Règles concernant la protection des données

Dans le cadre du projet global act-*info*, la protection des données est garantie par un procédé de chiffrement multiple élaboré selon les standards de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Dans un premier temps, les différents *établissements thérapeutiques* attribuent un code personnel à chaque client selon des règles uniformes. Ce code, qui se compose de quatre lettres, accompagne les données qui sont transmises à l'Institut de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF). Un deuxième chiffrement intervient au *niveau de l'ISGF*, avant que les données de base ne soient intégrées sous forme totalement anonymisée dans la base de données nationale de l'OFSP. Chaque série de données est automatiquement chiffrée à l'aide du code personnel ainsi que d'autres

données par un système à double clé (clé personnelle de 16 caractères et clé de session de 256 caractères). Un troisième chiffrement, réalisé au moyen d'une clé annuelle, est effectué à l'OFSP dans la base de données nationale.

L'utilisation de la base de données de l'ISGF, qui rassemble les variables du noyau et des modules, est réservée au Service de coordination act-*info*-FOS. Les objectifs convenus doivent être respectés et la protection des données est garantie, conformément à la législation. Toute tierce personne (canton, autres instituts de recherche) qui souhaite obtenir un accès à cette banque de données doit effectuer une demande préalable en ce sens et obtenir l'accord des institutions concernées.

3.3. Saisie électronique et contrôle des données

En 2009, 30 institutions ont saisi leurs données en ligne, totalisant ainsi une majorité de questionnaires. Ceux qui ont été adressés au Service de coordination act-*info*-FOS sous forme papier ont été saisis informatiquement à l'aide du logiciel DataPool par une société extérieure.

La saisie des données avec le logiciel DataPool, qui constitue en même temps une banque de données centrale d'administration et d'enregistrement des épisodes de traitement, s'accompagne de premiers contrôles (p. ex. pas de réponses multiples aux questions simples, vérification des données de base d'un épisode de traitement à l'ouverture du questionnaire). Le logiciel DataPool procède à d'autres vérifications de routine qui permettent de s'assurer de la cohérence et de l'exhaustivité des réponses données aux questions-clés. Des informations complémentaires ont été demandées aux institutions lorsque cela s'est avéré nécessaire. Enfin, après avoir été contrôlées et corrigées dans la banque de données centrale (DataPool), les données apurées ont été exportées dans le logiciel de statistiques SPSS, où leur traitement s'est poursuivi.

3.4. Préparation des données

Grâce aux procédures de contrôle intégrées dans DataPool, les données sont de grande qualité avant même leur transfert dans le programme SPSS. Là où cela était nécessaire, des vérifications de plausibilité supplémentaires ont été effectuées et les réponses manquantes ou non valables définies (*missing data*). Enfin, les recodages nécessaires au chapitre consacré aux tableaux ont été entrepris.

3.5. Echantillons 2009

Les données ont été collectées régulièrement auprès de tous les clients et clientes entrés et sortis des centres act-*info*-FOS. L'évaluation 2009 se base sur 602 questionnaires d'entrée et 591 questionnaires de sortie. Près des deux tiers proviennent de Suisse alémanique, un bon quart de Suisse romande et les autres d'institutions italophones du canton du Tessin (tableau 1). Par rapport à l'année précédente, le pourcentage de questionnaires provenant d'établissements de Suisse alémanique a un peu augmenté,

alors que les établissements de Suisse romande, mais aussi ceux du canton du Tessin, ont proportionnellement rendu moins de questionnaires.

Tab. 1 : Base de données pour le Rapport annuel 2009

Région linguistique	ENTREES		SORTIES	
	N	%	N	%
Suisse alémanique *	394	65%	379	64%
Suisse romande	157	26%	154	26%
Suisse italienne *	51	9%	58	10%
TOTAL Suisse	602	100%	591	100%

*Les centres de langue allemande se trouvant au Tessin sont comptabilisés ici avec la Suisse alémanique.

4. Situation des clients et des clientes à leur admission et à leur sortie : comparaison de certains aspects pour la clientèle dont l'année de sortie est 2009

Le chapitre thématique est consacré à la comparaison de la situation des clients et des clientes avant et après leur traitement, sur la base d'une série de questions act-info-FOS qui figurent à la fois sur le questionnaire d'entrée et sur le questionnaire de sortie. Pour ce faire, les données à l'admission de tous les clients et clientes sortis en 2009 ont été réunies. Le tableau 2 montre la ventilation de la clientèle par année d'admission, étant précisé que les données de 9 personnes admises entre 2003 et 2005 ont été écartées.

Tab. 2 : Ventilation par année d'admission de la clientèle dont l'année de sortie est 2009

		Sortie en 2009	
Année d'admission	2006	10	1,7 %
	2007	85	14,6 %
	2008	269	46,2 %
	2009	218	37,5 %
Total		582	100,0%

La comparaison de la situation de la clientèle au moment de l'admission et au moment de la sortie porte sur les éléments suivants :

- Traitement de substitution
- Logement
- Relation de couple
- Sources de revenu
- Activité rémunératrice
- Endettement
- Consommation

4.1. Traitement de substitution

La combinaison, en mode résidentiel, d'un traitement de substitution avec une thérapie s'appuyant sur les ressources et visant l'abstinence est de plus en plus répandue. Quelque 33% des clients et clientes considérés ici sont admis en thérapie avec un traitement de substitution. Au moment de la sortie, il a été constaté que 35 % suivent un traitement de substitution durant la thérapie (tableau 3).

Tab. 3 : Traitement de substitution à l'admission et à la sortie (I)

	Admission entre 2006 et 2009 Traitement parallèle de substitution ou avec prescription d'héroïne à l'admission		Sortie en 2009 Traitement de substitution ou avec prescription d'héroïne durant le traitement	
	N	%	N	%
Oui	169	32,5 %	197	34,9 %
Non	351	67,5 %	367	65,1 %
Total	520	100,0 %	564	100,0 %
Données manquantes	62		18	

Étant donné que la clientèle avec traitement de substitution représente un tiers de la clientèle entrante et un tiers de la clientèle sortante, on peut se demander s'il s'agit des mêmes personnes ou bien si l'on constate une certaine fluctuation. De façon prévisible, 90 % de la clientèle qui suit un traitement de substitution au moment de son admission le poursuit au moment de sa sortie (tableau 4). Il est rare que le lancement d'un traitement combiné soit suivi d'un arrêt du traitement substitutif, tout comme un traitement substitutif est rarement introduit durant un traitement résidentiel.

Tab. 4 : Traitement de substitution à l'admission et à la sortie (II)

		Sortie en 2009 Traitement de substitution ou avec prescription d'héroïne durant le traitement				Total	
		non		oui			
Admission entre 2006 et 2009 Traitement parallèle de substitution ou avec prescription d'héroïne à l'admission	non	314	92,1 %	27	7,9 %	341	100 %
	oui	16	9,7 %	149	90,3 %	165	100 %
Total		330	69,2 %	176	34,8 %	506	100 %

Une substitution en relais du traitement est prévue pour 76 % de la clientèle sous traitement de substitution à l'admission (pas de tableau).

Le tableau 5, qui ajoute à ces éléments le *mode de sortie*, montre que le taux de clientèle avec traitement substitutif parmi la clientèle qui achève son traitement comme convenu sans passer à un autre traitement, qui est de 23 %, est significativement plus faible que parmi la clientèle qui a interrompu le traitement (40 %; Cr's $V=.16$, $p < .004$).

Tab. 5 : Traitement de substitution et mode de sortie

			Raison principale de la fin du traitement				Total
			Traitement terminé comme prévu, sans transfert	Traitement terminé comme prévu, avec transfert	Interruption explicite	Autres (détention, expulsion du pays, absence de financement, décès)	
Substitution durant le traitement	non	Nombre	107	61	166	31	365
		En % du mode de sortie	77,0 %	67,0 %	59,9 %	57,4 %	65.1%
	oui	Nombre	32	30	111	23	196
		En % du mode de sortie	23,0 %	33,0 %	40,1 %	42,6 %	34.9%
Total		Nombre	139	91	277	54	561
		En % du mode de sortie	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

4.2. Logement

Dans l'ensemble, la clientèle est logée de manière sensiblement pareille avant son admission (durant les 6 mois précédant celle-ci) et à sa sortie. Le plus grand groupe en l'espèce (voir ci-dessous le tableau 6) réunit la clientèle vivant seule, qui représente 32 % du total avant l'admission et 29 % à la sortie. Il est difficile de mesurer si la situation des clients et des clientes s'est améliorée, car les catégories de logement ne sont pas pertinentes pour ce faire, à l'exception de la catégorie de la détention. Autre exemple, si passer d'un logement en solo à un logement avec accompagnement représente un net progrès pour certains, pour d'autres, passer d'un logement avec accompagnement à un logement autonome égale une prise d'autonomie.

Tab. 6 : Logement 6 mois avant l'admission et à la sortie (I)

	Admission entre 2006 et 2009 Avec qui principale- ment avez-vous habi- té durant les 6 mois précédant votre ad- mission ?		Sortie en 2009 Avec qui habitez- vous après votre sortie ?	
	N	%	N	%
Seul ou seule	163	31,7 %	135	28,7 %
Chez les parents ou chez l'un des deux	85	16,5 %	65	13,8 %
Sans conjoint ou conjointe, avec un ou des en- fant(s)	9	1,8 %	6	1,3 %
Avec conjoint ou conjointe (sans enfant)	59	11,5 %	33	7,0 %
Avec conjoint ou conjointe et un ou des enfant(s)	28	5,4 %	22	4,7 %
Avec d'autres proches ou parents	10	1,9 %	14	3,0 %
Avec un ou des amis ou amies (collocation)	34	6,6 %	57	12,1 %
Autres : détention, préventive ou non	37	7,2 %	32	6,8 %
Autres : traitement résidentiel	26	5,1 %	3	,6 %
Autres : appartement protégé	pas de données		18	3,8 %
Autres : foyer, logement avec accompagnement	18	3,5 %	18	3,8 %
Autres : hôpital, hôpital psychiatrique	6	1,2 %	7	1,5 %
Autres : institution en général	8	1,6 %	39	8,3 %
Autres : divers	31	6,0 %	21	4,5 %
Total	514	100,0 %	470	99,9* %
Données manquantes	68		112	

* Erreur due à l'arrondissement

Parmi les 32 personnes qui passent en détention à l'issue de leur traitement, 12, soit 38 %, étaient déjà en détention durant les 6 mois précédant leur admission (pas de tableau).

Parmi la clientèle, 61 % a un logement stable durant les 6 mois précédant le traitement. Ce pourcentage est de 53 % (tableau 7) à la sortie ; 24 % vivent dans un cadre institutionnel durant les 6 mois précédant le traitement, tout comme 27 % à la sortie.

Tab. 7 : Logement 6 mois avant l'admission et à la sortie (II)

	Admission entre 2006 et 2009 Quel a été votre type de logement principal durant les 6 mois précédant votre admission ?		Sortie en 2009 Quel est votre type de logement après votre sor- tie ?	
	N	%	N	%
Logement stable	315	60,8 %	258	53,4 %
Logement instable	77	14,9 %	93	19,3 %
Institution	126	24,3 %	132	27,3 %
Total	518	100,0 %	483	100,0 %
Données manquantes	64		99	

Parmi la clientèle logée de manière stable durant les 6 mois précédant le traitement, 63 % retrouvent cette stabilité à la sortie (tableau 8). Parmi la clientèle logée sans stabilité avant un traitement, 42 % disposent d'un logement stable à la sortie, tout comme 38 % de celle logée en institution avant son traitement.

Tab. 8 : Logement 6 mois avant l'admission et à la sortie (III)

		Sortie en 2009 Logement à la sortie						Total	
		stable		instable		institution			
Admis- sion 2006-2009 Logement 6 mois avant l'ad- mission	stable	168	63,2 %	47	17,7 %	51	19,2 %	266	100,1* %
	instable	26	41,9 %	18	29,0 %	18	29,0 %	62	99,9* %
	institution	41	37,6 %	19	17,4 %	49	45,0 %	109	100,0 %
Total		235	53,8 %	84	19,2 %	118	27,0 %	437	100,0 %

* Erreur due à l'arrondissement

4.3. Relation de couple

Parmi la clientèle, 47 % ne sont pas en couple durant les 6 mois précédant le traitement, un pourcentage de 57 % à la sortie (tableau 9).

Tab. 9 : Relation de couple avant l'admission et à la sortie

	Admission entre 2006 et 2009 Quel genre de relation de couple avez-vous connue durant les 6 mois précédant votre admission ?		Sortie en 2009 Quel genre de relation de couple avez-vous au moment de votre sortie ?	
	N	%	N	%
Hors relation, je vis seul (seule)	245	47,2 %	290	57,4 %
Relation(s) temporaire(s)	102	19,7 %	73	14,5 %
Relation stable sans vie commune	83	16,0 %	86	17,0 %
Relation stable en vie commune	89	17,1 %	56	11,1 %
Total	519	100,0 %	505	100,0 %
Données manquantes	63		77	

4.4. Sources de revenu

En ce qui concerne ses sources de revenu, la clientèle présente peu ou prou le même profil à son admission (durant les 6 mois précédant celle-ci) et à sa sortie : au cours des six mois précédant l'admission, 21 % tire principalement son revenu de sa propre activité lucrative, un taux qui est de 19 % à la sortie. Ils sont 11 % qui touchent une rente avant leur admission, et 15 % à leur sortie; pour ceux qui bénéficient d'une aide sociale, les taux sont de 46 % et 55 % respectivement (tableau 10).

Tab. 10 : Source principale de revenu avant l'admission et à la sortie (I)

	Admission entre 2006 et 2009 Source principale de revenu durant les 6 mois précédant l'admission		Sortie en 2009 Source principale de re- venu après la sortie	
	N	%	N	%
Activité lucrative	103	20,9 %	94	19,0 %
Économies	4	,8 %	2	,4 %
Rente (AVS/AI par exemple)	52	10,5 %	72	14,5 %
Aide sociale	227	46,0 %	273	55,2 %
Assurance-chômage	22	4,5 %	17	3,4 %
Revenu fourni par le ou la partenaire, les parents, la famille, les amis	27	5,5 %	12	2,4 %
Petit trafic de drogue ou autre trafic, autres revenus illégaux, prostitution	32	6,5 %	3	,6 %
Autres : détention, préventive ou non, justice	18	3,7 %	11	2,2 %
Autres : divers	8	1,6 %	11	2,2 %
Total	493	100,0 %	495	99,9 %*
Données manquantes	89		87	

* Erreur due à l'arrondissement

Le tableau 11 présente l'évolution de la source principale de revenu, sous forme de catégories synthétiques. Lorsque le nombre de cas concernés est très faible, les pourcentages ne sont pas interprétables.

Il apparaît que 47 % (21) de la clientèle qui tire principalement son revenu de sa propre activité lucrative avant le traitement continue de le faire après la sortie. Quant à la clientèle qui touche une rente avant son admission, 73 % (35) continue d'obtenir ainsi sa principale source de revenu après sa sortie. Et 73 % (167) également des personnes au bénéfice d'une aide sociale avant leur admission continuent de subvenir à leurs besoins principalement au moyen de l'aide sociale après leur sortie. Des évolutions apparaissent toutefois également : parmi les 84 personnes qui vivent principalement d'un revenu provenant de leur propre activité lucrative après leur sortie, 55 % (46) avaient à leur admission pour source principale de revenu une rente, l'aide sociale, des revenus illégaux ou décidés par la justice.

Tab. 11 : Source principale de revenu avant l'admission et à la sortie (II)

			Sortie en 2009							Total
			Source principale de revenu après la sortie (recodé)							
			Activité lucrative	Rente (AVS/AI)	Aide sociale	Partenaire, famille, amis	Petit trafic de drogue, autres revenus illégaux, prostitution	Détention, préventive ou non, justice	Divers (indemnités journalières par ex.)	
Admission 2006 -2009 6 mois avant l'admission (recodé)	Activité lucrative	N	21	5	15	2	0	0	2	45
		%*	46,7 %	11,1 %	33,3 %	4,4 %	,0 %	,0 %	4,4 %	100,0 %
	Rente (AVS/AI)	N	2	35	10	0	0	1	0	48
		%*	4,2 %	72,9 %	20,8 %	,0 %	,0 %	2,1 %	,0 %	100,0 %
	Aide sociale	N	29	15	167	3	2	4	8	228
		%*	12,7 %	6,6 %	73,2 %	1,3 %	,9 %	1,8 %	3,5 %	100,0 %
	Partenaire, famille, amis	N	8	2	11	5	0	2	4	32
		%*	25,0 %	6,3 %	34,4 %	15,6 %	,0 %	6,3 %	12,5 %	100,0 %
	Petit trafic de drogue, autres revenus illégaux, prostitution	N	8	1	7	1	0	0	1	18
		%*	44,4 %	5,6 %	38,9 %	5,6 %	,0 %	,0 %	5,6 %	100,0 %
	Détention, préventive ou non, justice	N	7	0	11	0	0	1	1	20
		%*	35,0 %	,0 %	55,0 %	,0 %	,0 %	5,0 %	5,0 %	100,0 %
	Divers	N	9	2	17	1	0	1	7	37
		%*	24,3 %	5,4 %	45,9 %	2,7 %	,0 %	2,7 %	18,9 %	100,0 %
Total	N	84	60	238	12	2	9	23	428	
	%*	19,6 %	14,0 %	55,6 %	2,8 %	,5 %	2,1 %	5,4 %	100,0 %	

* En % des admissions

Si l'on met en regard le *mode de sortie* et la source principale de revenu, de nettes différences apparaissent (pas de tableau) : parmi les clients et clientes qui vivent principalement de leurs propres revenus à la sortie, 64 % ont terminé leur traitement comme prévu, sans transfert vers un autre établissement de traitement des addictions. Pour la clientèle qui touche une rente, ce pourcentage tombe à 32 %, et il est de 14 % pour ceux au bénéfice d'une aide sociale. Un taux d'abandon particulièrement élevé (56 %) s'observe notamment chez ceux dont la source principale de revenu au moment de la sortie est l'aide sociale.

4.5. Activité rémunératrice

Parmi l'ensemble du groupe de clientèle considéré, 43 % ne sont pas sur le marché de l'emploi durant les 6 mois précédant l'admission, contre 37 % à la sortie (tableau 12). Si 31 % des clients et des clientes travaillent (à plein temps, à temps partiel ou de façon occasionnelle) avant le traitement, ils sont 26% à la sortie. A leur sortie en revanche, ils sont plus nombreux qu'avant leur admission à être sans activité rémunératrice mais en recherche d'emploi (23 % contre 14 %).

Tab. 12 : *Activité rémunératrice principale avant l'admission et à la sortie (I)*

	Admission entre 2006 et 2009 Activité rémunératrice au cours des 6 mois précédant l'admission		Sortie en 2009 Activité rémunératrice à la sortie	
	N	%	N	%
Plein temps (70 % et plus)	88	18,4 %	99	21,2 %
Temps partiel	31	6,5 %	16	3,4 %
Plusieurs activités lucratives (temps partiel, emplois occasionnels)	28	5,8 %	5	1,1 %
Formation (école, études, apprentissage)	18	3,8 %	28	6,0 %
Inactif sur le marché du travail (rente/ AVS/AI, homme ou femme au foyer)	204	42,6 %	175	37,4 %
Sans activité mais en recherche d'emploi	69	14,4 %	106	22,6 %
Sans activité mais futur poste assuré	2	,4 %	8	1,7 %
Autres : détention, préventive ou non, clini- que, institution	23	4,8 %	10	2,1 %
Autres : divers	16	3,3 %	21	4,5 %
Total	479	100,0 %	468	100,0 %
Données manquantes	103		114	

Une comparaison (tableau 13) des catégories d'activités rémunératrices avant l'admission et à la sortie montre que 53 % de la clientèle qui travaille avant son admission travaille également à sa sortie. Quant aux personnes inactives sur le marché du travail avant leur admission, 50 % d'entre elles n'ont pas de travail à leur sortie non plus. En revanche, 24 % des personnes inactives sur le marché du travail avant leur admission (51 sur 213) et 30 % de celles en recherche d'emploi avant leur admission (21 sur 69) ont un travail à leur sortie.

Tab. 13 : *Activité rémunératrice principale (recodé) avant l'admission et à la sortie (II)*

			Sortie en 2009					Total	
			Activité rémunératrice à la sortie (recodé)						
			Travail	En formation	Inactif sur le marché du travail	En recherche d'emploi	Autres : détention, clinique, divers		
Admission 2006-2009 Activité rémunératrice des 6 mois avant l'admission (recodé)	Travail	N	31	3	10	13	2	59	
		%*	52,5 %	5,1 %	16,9 %	22,0 %	3,4 %	100,0 %	
	Formation (école, études, apprentissage)	N	2	5	4	2	1	14	
		%*	14,3 %	35,7 %	28,6 %	14,3 %	7,1 %	100,0 %	
	Inactif sur le marché du travail	N	51	9	106	38	9	213	
		%*	23,9 %	4,2 %	49,8 %	17,8 %	4,2 %	100,0 %	
	En recherche d'emploi	N	21	2	13	28	5	69	
		%*	30,4 %	2,9 %	18,8 %	40,6 %	7,2 %	100,0 %	
	Autres : détention, clinique, divers	N	6	5	11	11	6	39	
		%*	15,4 %	12,8 %	28,2 %	28,2 %	15,4 %	100,0 %	
	Total		N	111	24	144	92	23	394
			%*	28,2 %	6,1 %	36,5 %	23,4 %	5,8 %	100,0 %

*En % des admissions

Le tableau 14 ci-après observe à quel mode de sortie peut correspondre une activité rémunératrice à la sortie. Les différences sont significatives (Cr's $V=.45$, $p < .000$) : à leur sortie, 45 % des personnes ayant achevé leur traitement comme convenu ont un emploi, contre 11 % de celles dont le traitement a été interrompu. Parmi les personnes dont le traitement s'est interrompu, 53 % sont inactives sur le marché du travail et 30 % en recherche d'emploi, des taux significativement plus élevés que parmi les personnes dont le traitement s'achève comme convenu (taux de 22 % et de 18 % respectivement). Le rapport annuel de 2007, qui a étudié en détail la question de la situation professionnelle, a mis en évidence que le traitement permet d'obtenir de nettes améliorations pour un certain groupe de clients.²

Tab. 14 : Activité rémunératrice principale à la sortie et mode de sortie

			Sortie en 2009 Conditions de sortie (recodé)		Total
			Fin comme prévu avec ou sans transfert	Interruption et perte de contact	
Sortie en 2009 Activité rémunératrice (recodé)	Travail	Nombre	101	22	123
		En % du mode de sortie	45,1 %	10,6 %	28,5 %
	En formation	Nombre	21	6	27
		En % du mode de sortie	9,4 %	2,9 %	6,3 %
	Inactif sur le marché du travail	Nombre	49	110	159
		En % du mode de sortie	21,9 %	53,1 %	36,9 %
	En recherche d'emploi	Nombre	40	61	101
		En % du mode de sortie	17,9 %	29,5 %	23,4 %
	Autres : déten- tion, clinique, divers	Nombre	13	8	21
		En % du mode de sortie	5,8 %	3,9 %	4,9 %
Total		Nombre	224	207	431
		En % du mode de sortie	100,0 %	100,0 %	100,0 %

4.6. Endettement

Du point de vue de l'ensemble de la clientèle, l'endettement à la sortie n'est pas foncièrement différent de celui prévalant au moment de l'admission. A l'admission comme à

² Service de coordination act-info-FOS (Ed.). (2008). Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie act-info-FOS en 2007. Rapport d'activités et statistiques annuelles globales. Evolution de la situation professionnelle après un séjour thérapeutique. Rapport de recherche n° 252. Zurich : ISGF. http://www.isgf.ch/index.php?id=60&pub_id=100079

la sortie, 23 % des clients et clientes ne sont pas endettés. De même, à leur admission comme à leur sortie, 30 % des clients et clientes sont endettés de 10 000 francs au maximum. Quelque 30 % de ceux qui débutent leur traitement et 33 % de ceux qui l'achèvent ont un endettement compris entre 10 001 et 50 000 francs; ce montant va au-delà pour 17 % de ceux qui entament une thérapie et pour 15 % de ceux qui la terminent (tableau 15).

Tab. 15 : Endettement à l'admission et à la sortie (I)

Catégories d'endettement	Admission entre 2006 et 2009 Endettement à l'entrée		Sortie en 2009 Endettement à la sortie	
	N	%	N	%
Absence de dettes	104	22,7 %	94	23,0 %
Jusqu'à 10 000 francs	138	30,1 %	121	29,7 %
Entre 10 001 et 50 000 francs	139	30,3 %	133	32,6 %
De 50 001 à plus de 100 000 francs	77	16,8 %	60	14,7 %
Total	458	99,9 %*	408	100,0 %
Données manquantes	124		174	

* Erreur due à l'arrondissement

Le tableau 16 permet de comparer les catégories d'endettement à la sortie et à l'admission : 73 % des clients et clientes qui ne sont pas endettés au moment de leur admission n'ont pas de dettes non plus à leur sortie. Pour une majorité, la catégorie d'endettement est la même à l'admission et à la sortie : il en va ainsi de 69 % des personnes de la catégorie « Jusqu'à 10 000 francs », de 73 % de celles de la catégorie « Entre 10 001 et 50 000 francs » et de 67 % de celles de la catégorie « De 50 001 à plus de 100 000 francs ». Même si la précarité qu'entraîne un endettement ne peut naturellement être résorbée durant le court laps de temps que représente un séjour thérapeutique, la situation d'une série de personnes est meilleure à la sortie.

Tab. 16 : Endettement à l'admission et à la sortie (II)

			Sortie en 2009				Total
			Endettement à la sortie				
			Absence de dettes	Jusqu'à 10 000 francs	Entre 10 001 et 50 000 francs	De 50 001 à plus de 100 000 francs	
Admission entre 2006 et 2009	Absence de dettes	Nombre	52	14	5	0	71
		En % des admissions	73,2 %	19,7 %	7,0 %	,0 %	100.0%
	Jusqu'à 10 000 francs	Nombre	18	68	12	0	98
		En % des admissions	18,4 %	69,4 %	12,2 %	,0 %	100.0%
	Entre 10 001 et 50 000 francs	Nombre	3	18	80	9	110
		En % des admissions	2,7 %	16,4 %	72,7 %	8,2 %	100.0%
	De 50 001 à plus de 100 000 francs	Nombre	4	2	14	41	61
		En % des admissions	6,6 %	3,3 %	23,0 %	67,2 %	100.0%
Total		Nombre	77	102	111	50	340
		En % des admissions	22,6 %	30,0 %	32,6 %	14,7 %	100,0 %

Si l'on met en rapport l'endettement et le *mode de sortie*, une différence légèrement significative apparaît : les clients et clientes dont le traitement s'achève comme prévu sont plus souvent sans dettes que ceux dont le traitement s'interrompt. Pour ces derniers par contre, l'endettement est plus souvent compris dans les catégories allant jusqu'à 10 000 francs ou jusqu'à 50 000 francs (pas de tableau ; Cr's $V=.15$, $p<.05$).

4.7. Consommation

Parmi les clients et clientes ayant achevé leur traitement en 2009, les substances qu'ils indiquent comme les plus problématiques au moment de leur admission sont les suivantes – indiquées avec le taux de clientèle concernée : pour 34 % les opiacés, pour 28 % la cocaïne ou le crack, pour 13 % les cocktails et pour 12 % l'alcool (tableau 17).

Tab. 17 : Substance la plus problématique au moment de l'admission

	Admission entre 2006 et 2009 Substance qui constitue le problème principal	
	N	%
Alcool	67	11,9 %
Cocktail	73	12,9 %
Héroïne, méthadone, autres opiacés	191	33,8 %
Cocaïne, crack/freebase	156	27,6 %
Amphétamines, substances apparentées aux amphétamines (MDMA)	12	2,1 %
Benzodiazépines	19	3,4 %
Cannabis	41	7,3 %
Autres substances	6	1,1 %
Total	565	100,1 %*
Données manquantes	17	

* Erreur due à l'arrondissement

Les tableaux qui suivent mettent en évidence la consommation des 30 jours précédant la sortie de trois groupes de personnes qui ont en commun une substance problématique – soit l'alcool, soit les opiacés, soit encore la cocaïne ou le crack. Nous le soulignons, il s'agit uniquement de constater une consommation, sans considération de la fréquence ni de l'ampleur de cette consommation (qui peut aller de la consommation récréative à la rechute).

Pour les clients et clientes pour qui le problème principal à l'admission est *l'alcool*, 20 % indiquent ne pas avoir consommé de substances peu avant leur sortie (tableau 18). Dans ce groupe, 59 % ont consommé de l'alcool avant leur sortie, étant précisé qu'il n'existe pas d'indications quant au genre de consommation (contrôlée, occasionnelle, en très grande quantité notamment). Quelque 23 % ont consommé des opiacés avant la sortie (plusieurs réponses possibles).

Tab. 18 : Substance la plus problématique à l'admission : ALCOOL
 Consommation au cours des 30 jours précédant la sortie, catégorie « pas de consommation » comprise (plusieurs réponses possibles)

		Total
Aucune	Réponses	13
	% de personnes	20,0 %
Alcool	Réponses	38
	% de personnes	58,5 %
Cocktail (héroïne et cocaïne)	Réponses	2
	% de personnes	3,1 %
Opiacés (héroïne, méthadone, etc.)	Réponses	15
	% de personnes	23,1 %
Cocaïne, crack/freebase	Réponses	8
	% de personnes	12,3 %
Stimulants	Réponses	4
	% de personnes	6,2 %
Médicaments	Réponses	7
	% de personnes	10,8 %
Hallucinogènes	Réponses	1
	% de personnes	1,5 %
Cannabis	Réponses	9
	% de personnes	13,8 %
Tabac	Réponses	21
	% de personnes	32,3 %
Autre(s) substance(s)	Réponses	3
	% de personnes	4,6 %
Total	Nombre de réponses	120
	Taux de réponses	100,0 %
	Nombre de personnes	65
	% de personnes	184,6 %
Données manquantes		2

Parmi les clients et clientes qui indiquent comme *problème principal à leur admission l'alcool*, ceux qui terminent la thérapie comme prévu indiquent nettement plus souvent n'avoir consommé aucune substance dans les 30 jours précédant leur sortie que ceux avec interruption de thérapie. La consommation est surtout le fait des personnes ayant interrompu leur traitement (tableau 19).

Tab. 19 : Substance la plus problématique à l'admission : ALCOOL
 Mise en regard des circonstances de sortie avec la consommation au cours des 30 jours précédant la sortie, catégorie « pas de consommation » comprise (plusieurs réponses possibles)

		Sorties 2009		Total
		Circonstances de sortie (re-codé) de la clientèle avec pour problème principal à l'admission L'ALCOOL		
		Fin comme prévu avec ou sans transfert	Interruption et perte de contact	
Aucune	Réponses	10	3	13
	% de personnes	45,5 %	8,6 %	22,8 %
Alcool	Réponses	6	26	32
	% de personnes	27,3 %	74,3 %	56,1 %
Cocktail (héroïne et cocaïne)	Réponses	0	2	2
	% de personnes	,0 %	5,7 %	3,5 %
Opiacés (héroïne, méthadone, etc.)	Réponses	2	10	12
	% de personnes	9,1 %	28,6 %	21,1 %
Cocaïne, crack/freebase	Réponses	2	6	8
	% de personnes	9,1 %	17,1 %	14,0 %
Stimulants	Réponses	0	3	3
	% de personnes	,0 %	8,6 %	5,3 %
Médicaments	Réponses	0	4	4
	% de personnes	,0 %	11,4 %	7,0 %
Cannabis	Réponses	0	8	8
	% de personnes	,0 %	22,9 %	14,0 %
Tabac	Réponses	7	13	20
	% de personnes	31,8 %	37,1 %	35,1 %
Autre(s) substance(s)	Réponses	0	3	3
	% de personnes	,0 %	8,6 %	5,3 %
Total	Nombre de réponses	27	78	105
	Taux de réponses	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Nombre de personnes	22	35	57
	% de personnes	122,7 %	222,9 %	184,2 %
Données manquantes		0	1	1

Pour les clients et clientes pour qui le problème principal à l'admission sont *les opiacés* (héroïne, méthadone, autres), 27 % indiquent ne pas avoir consommé de substances peu avant leur sortie (tableau 20). Dans ce groupe, 44 % ont consommé des opiacés avant leur sortie, étant à nouveau précisé qu'il n'existe pas d'indications quant au genre de consommation. Quelque 35 % de l'ancienne clientèle « opiacés » ont consommé de l'alcool avant la sortie (plusieurs réponses possibles).

Tab. 20 : Substance la plus problématique à l'admission : OPIACES
Consommation au cours des 30 jours précédant la sortie, catégorie « pas de consommation » comprise (plusieurs réponses possibles)

		Total
Aucune	Réponses	46
	% de personnes	26,9 %
Alcool	Réponses	60
	% de personnes	35,1 %
Cocktail (héroïne et cocaïne)	Réponses	12
	% de personnes	7,0 %
Opiacés (héroïne, méthadone, etc.)	Réponses	75
	% de personnes	43,9 %
Cocaïne, crack/freebase	Réponses	31
	% de personnes	18,1 %
Stimulants	Réponses	3
	% de personnes	1,8 %
Médicaments	Réponses	23
	% de personnes	13,5 %
Cannabis	Réponses	26
	% de personnes	15,2 %
Tabac	Réponses	54
	% de personnes	31,6 %
Autre(s) substance(s)	Réponses	4
	% de personnes	2,3 %
Total	Nombre de réponses	334
	Taux de réponses	100,0 %
	Nombre de personnes	171
	% de personnes	195,3 %
Données manquantes		20

Parmi les clients et clientes qui indiquent comme *problème principal à leur admission les opiacés*, ceux qui terminent la thérapie comme prévu sont majoritaires à indiquer n'avoir pas consommé de substances avant leur sortie, ou alors à les avoir consommées de manière sporadique, tandis que ceux qui l'interrompent sont plus rares à signaler n'avoir pas consommé de substances avant leur sortie. Les substances consommées par ceux qui

ont interrompu leur thérapie sont plus particulièrement (et plus souvent) les opiacés, l'alcool et la cocaïne (tableau 21).

*Tab. 21 : Substance la plus problématique à l'admission : OPIACES
Mise en regard des circonstances de sortie avec la consommation au cours des 30 jours
précédant la sortie, catégorie « pas de consommation » comprise
(plusieurs réponses possibles)*

			Sorties 2009		Total	
			Circonstances de sortie (recodé) de la clientèle avec pour problème principal à l'admission OPIACES			
			Fin comme prévu avec ou sans transfert	Interruption et perte de contact		
	Aucune	Réponses	32	13	45	
		% de personnes	44,4 %	15,5 %	28,8 %	
	Alcool	Réponses	14	37	51	
		% de personnes	19,4 %	44,0 %	32,7 %	
	Cocktail (héroïne et cocaïne)	Réponses	2	9	11	
		% de personnes	2,8 %	10,7 %	7,1 %	
	Opiacés (héroïne, méthadone, etc.)	Réponses	16	50	66	
		% de personnes	22,2 %	59,5 %	42,3 %	
	Cocaïne, crack/freebase	Réponses	3	22	25	
		% de personnes	4,2 %	26,2 %	16,0 %	
	Stimulants	Réponses	1	1	2	
		% de personnes	1,4 %	1,2 %	1,3 %	
	Médicaments	Réponses	3	16	19	
		% de personnes	4,2 %	19,0 %	12,2 %	
	Cannabis	Réponses	5	16	21	
		% de personnes	6,9 %	19,0 %	13,5%	
	Tabac	Réponses	28	22	50	
		% de personnes	38,9 %	26,2 %	32,1%	
	Autre(s) substance(s)	Réponses	1	1	2	
		% de personnes	1,4 %	1,2 %	1,3%	
	Total	Nombre de réponses		105	187	292
		Taux de réponses		100,0 %	100,0 %	100,0 %
Nombre de personnes			72	84	156	
% de personnes			145,8 %	222,6 %	187,2 %	
Données manquantes			3	14	17	

Pour les clients et clientes pour qui le problème principal à l'admission est la cocaïne (et/ou crack/freebase), 30 % indiquent ne pas avoir consommé de substances peu avant leur sortie (tableau 22). Quelque 38 % de l'ancienne clientèle « cocaïne » ont consommé de l'alcool avant la sortie, 24 % de la cocaïne ou du crack et 22 % des opiacés (plusieurs réponses possibles).

Tab. 22 : Substance la plus problématique à l'admission : COCAÏNE et/ou CRACK
Consommation au cours des 30 jours précédant la sortie, catégorie « pas de consommation » comprise (plusieurs réponses possibles)

		Total	
	Aucune	Réponses	45
		% de personnes	30,2 %
	Alcool	Réponses	57
		% de personnes	38,3 %
	Cocktail (héroïne et cocaïne)	Réponses	11
		% de personnes	7,4 %
	Opiacés (héroïne, méthadone, etc.)	Réponses	33
		% de personnes	22,1 %
	Cocaïne, crack/freebase	Réponses	36
		% de personnes	24,2 %
	Stimulants	Réponses	6
		% de personnes	4,0 %
	Médicaments	Réponses	12
		% de personnes	8,1 %
	Cannabis	Réponses	26
		% de personnes	17,4 %
	Tabac	Réponses	59
		% de personnes	39,6 %
	Autre(s) substance(s)	Réponses	4
		% de personnes	2,7 %
Total	Nombre de réponses	289	
	Taux de réponses	100,0 %	
	Nombre de personnes	149	
	% de personnes	194,0 %	
Données manquantes		7	

Il apparaît également, en ce qui concerne l'ancienne clientèle « cocaïne » en traitement résidentiel, que les personnes dont le traitement se termine comme prévu se distinguent de celles dont le traitement s'interrompt par une absence plus fréquente de toute consommation de substance avant la sortie (tableau 23). De nouveau, les personnes qui ont consommé diverses substances avant leur sortie sont plus fréquemment celles qui interrompent leur traitement.

Tab. 23 : Substance la plus problématique à l'admission : COCAÏNE (crack compris)
Mise en regard des circonstances de sortie avec la consommation au cours des 30 jours précédant la sortie, catégorie « pas de consommation » comprise (plusieurs réponses possibles)

		Sorties 2009			Total
		Circonstances de sortie (recodé) de la clientèle avec pour problème principal à l'admission COCAÏNE (crack compris)			
			Fin comme prévu avec ou sans transfert	Interruption et perte de contact	
	Aucune	Réponses	30	13	43
		% de personnes	44,1 %	19,4 %	31,9 %
	Alcool	Réponses	15	34	49
		% de personnes	22,1 %	50,7 %	36,3 %
	Cocktail (héroïne et cocaïne)	Réponses	2	7	9
		% de personnes	2,9 %	10,4 %	6,7 %
	Opiacés (héroïne, méthadone, etc.)	Réponses	7	19	26
		% de personnes	10,3 %	28,4 %	19,3 %
	Cocaïne, crack/freebase	Réponses	5	25	30
		% de personnes	7,4 %	37,3 %	22,2 %
	Stimulants	Réponses	1	5	6
		% de personnes	1,5 %	7,5 %	4,4 %
	Médicaments	Réponses	3	6	9
		% de personnes	4,4 %	9,0 %	6,7 %
	Cannabis	Réponses	8	12	20
		% de personnes	11,8 %	17,9 %	14,8 %
	Tabac	Réponses	27	25	52
		% de personnes	39,7 %	37,3 %	38,5 %
	Autre(s) substance(s)	Réponses	0	3	3
		% de personnes	,0 %	4,5 %	2,2 %
Total	Nombre de réponses		98	149	247
	Taux de réponses		100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Nombre de personnes		68	67	135
	% de personnes		144,1 %	222,4 %	183,0 %
Données manquantes			0	5	5

4.8. Résumé

Le présent chapitre spécial compare certains éléments de la situation de la clientèle ayant quitté un établissement en 2009, en mettant en regard ces aspects tels qu'ils se présentent au moment où ces clients et clientes débutent leur traitement et tels qu'ils sont au moment où elles le terminent. Cette comparaison se fonde sur les données de 582 personnes. Elle montre, *pour l'ensemble du groupe de clientèle considéré*, que les différents aspects analysés paraissent de prime abord très semblables avant et après un traitement. Cette constatation n'exclut toutefois pas que des évolutions puissent apparaître pour certains sous-groupes de clients et clientes. Des tableaux croisés ont donc été utilisés pour mettre en évidence dans quels pourcentages ces évolutions sont apparues. De plus, des mises en regard ont été faites avec un élément de comparaison supplémentaire, le mode de sortie, qui est un facteur pertinent concernant l'évolution de la situation et le résultat d'un traitement.

Concernant les aspects retenus, les principaux résultats sont les suivants :

- **Traitement de substitution** : une majorité des clients et des clientes qui ont débuté leur traitement résidentiel avec un traitement de substitution en cours continuent ce traitement au moment de leur sortie. Par ailleurs, on compte un taux plus élevé de clients et clientes suivant un traitement de substitution parmi les personnes qui interrompent leur traitement résidentiel que parmi celles qui le terminent comme prévu.
- **Logement** : plus de la moitié de toute la clientèle a un logement stable au moment de son admission et à sa sortie ; à ces deux moments, un quart réside en institution. Deux tiers des clients et clientes logés de manière stable à leur sortie connaissent déjà cette stabilité à leur entrée ; mais pour un bon tiers de ce groupe, le logement avant l'admission est instable ou alors constitue dans une institution.
- **Source de revenu et activité rémunératrice** : pour l'ensemble de la clientèle considérée, la source principale de revenu à l'admission ne se différencie pas sensiblement de celle à la sortie. Aux deux moments, une moitié environ des personnes interrogées indiquent l'aide sociale comme étant leur principale source de revenu ; un cinquième vit principalement de son propre revenu. Trois quarts des personnes au bénéfice d'une aide sociale avant leur admission continuent de subvenir à leurs besoins principalement au moyen de l'aide sociale après leur sortie. On constate toutefois aussi des évolutions : par exemple, plus de la moitié des personnes qui tirent principalement leur revenu de leur propre activité lucrative à leur sortie avaient auparavant pour source principale de revenu une rente, l'aide sociale, des revenus illégaux ou des revenus ordonnés par la justice. Les clients et clientes qui terminent leur traitement selon les termes convenus tendent à être mieux intégrés sur le marché de l'emploi que ceux dont le traitement a été interrompu ; ces derniers ont plus souvent pour source principale de revenu l'aide sociale à leur sortie.
- **Endettement** : pour une majorité, l'endettement est similaire à l'admission et à la sortie. Un quart environ n'a pas de dettes, trois quarts sont endettés, en majorité dans les mêmes proportions à l'admission et à la sortie. Les clients et clientes dont le traitement s'achève comme prévu sont plus souvent sans dettes que ceux dont le traitement s'interrompt.

- **Consommation** : les clients et clientes pris en considération ici appartiennent à trois groupes, constitués en fonction de la substance qui représente pour eux le principal problème à l'admission, à savoir l'alcool, les opiacés et la cocaïne ou le crack. Parmi ces clients et clientes, seule une minorité indique n'avoir consommé aucune substance peu avant leur sortie, les autres ayant consommé une ou plusieurs substances – tabac compris – dans des proportions différentes, étant précisé qu'il n'existe pas d'indications quant au genre de consommation ou à l'intensité de celle-ci. Il est en outre apparu, pour les trois groupes, que ceux et celles qui terminent la thérapie comme prévu sont moins nombreux à avoir consommé des substances peu avant leur sortie que ceux et celles qui ont interrompu leur traitement.

Ainsi, en ce qui concerne tous les clients et clientes ayant quitté un établissement de traitement résidentiel en 2009, une comparaison d'aspects choisis avant et après le traitement ne fait pas apparaître de changement notable. Pour une dimension telle que l'endettement par exemple, un changement serait d'ailleurs surprenant, la situation précaire due à un endettement pouvant éventuellement être empoignée, mais guère résolue, durant le court laps de temps que représente un séjour thérapeutique. Toutefois, une analyse plus détaillée démontre une évolution – positive ou négative – de certaines caractéristiques, pour certains groupes de clients et clientes.

Pour ce qui est de la situation à la sortie en particulier, les personnes dont le traitement se termine selon les termes convenus se distinguent de celles dont le traitement est interrompu par plusieurs aspects, d'où, pour les personnes concernées, des situations plutôt favorables ou plutôt défavorables respectivement. Les résultats concernent la période comprise entre l'admission et la sortie. Une analyse de la stabilité dans le temps des évolutions constatées à la sortie de thérapie demande des études de catamnèse (sous forme de post-enquêtes), telles qu'elles sont actuellement menées dans les établissements résidentiels de traitement du canton de Berne par exemple.

4.9. Annexe aux tableaux : tableaux des entrées et des sorties 2009

Le chapitre des tableaux comprend les chiffres correspondant à la plupart des questions des questionnaires d'entrée et de sortie se rapportant aux données 2009, ventilés par sexe. Les numéros indiqués entre parenthèses dans les titres des tableaux renvoient aux questions des questionnaires d'entrée et de sortie (version E/A3.1).

Les réponses aux différentes questions sont indiquées dans les tableaux en chiffres absolus et en chiffres relatifs. Des données sur les valeurs statistiques existent en partie : Cramer's V et niveaux de signification correspondants : $p < 0.05$ (*), $p < 0.01$ (**), $p < 0.001$ (***) .

Ci-dessous, quelques notions aidant la lecture :

- Total: le nombre de cas. Ce nombre n'est pas toujours identique au total des entrées ou des sorties, puisque par exemple, certaines questions ne sont pertinentes que pour une partie des personnes interviewées.
- Missing: par rapport au total des personnes pour lesquelles il existe des données, le missing donne le nombre de cas (personnes) pour lesquels il n'existe pas de réponse valable ou pas de réponse du tout.

-
- Nombre de personnes : dans une question avec réponses multiples, il est indiqué le nombre de personnes qui ont donné des réponses (possibilité de plusieurs réponses par personne).
 - Réponses: dans une question avec réponses multiples, on est intéressé de savoir comment les différentes rubriques d'une question ont été nommées.
 - Réponses% : dans une question avec réponses multiples, on indique les parts de pourcentage par rubrique par rapport au total de toutes les réponses.
 - Personnes% : dans une question avec réponses multiples, on indique les parts de pourcentage par rubrique par rapport au nombre de personnes qui ont donné des réponses. Ces parts de pourcentage sont généralement plus élevées que pour les réponses %, car les réponses % comprennent des réponses multiples.
 - Moyenne (valeur moyenne) : moyenne arithmétique (moyenne) des valeurs visant une certaine rubrique (par ex. durée de séjour moyenne).
 - Standard deviation (déviation standard): mesure pour la dispersion des valeurs autour de la moyenne : plus petit est l'écart standard, plus grande est l'homogénéité des réponses par rapport à la moyenne. Par conséquent, l'échantillon de réponse est d'autant plus hétérogène que l'écart standard est plus grand.
 - Médiane: valeur des réponses à une certaine catégorie qui se trouve au milieu (50 % des personnes interviewées ont des valeurs plus élevées, 50 % plus basses).
 - Percentiles (quartile) : le percentile 25 désigne la valeur par rapport à laquelle 25 % des personnes ont une valeur plus basse et 75 % des personnes une valeur plus élevée ; le percentile 75 désigne la valeur par rapport à laquelle 75 % des personnes ont une valeur plus élevée et 25 % des personnes plus basse.

4.9.1. Tableaux des entrées et des sorties 2009

Tableaux des entrées 2009	1
0 Données relatives aux clients et clientes.....	1
A Cadre de la prise en charge	6
B Données sociodémographiques.....	9
C Consommations, dépendances et comportements assimilables à une addiction .	22
D Santé.....	53
Tableaux des sorties 2009.....	1
0 Données relatives aux clients et clientes.....	1
A Cadre de la prise en charge	4
B Données sociodémographiques.....	12
C Consommations, dépendances et comportements assimilables à une addiction .	20
D Pronostic	34

act-info-FOS TABLEAUX DES SORTIES 2009

0 DONNEES RELATIVES AUX CLIENT-E-S

L'évaluation se base sur **591 questionnaires valablement remplis**.

0.1 Source des informations (vmad040)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
infos par client-e	82	18.4%	19	13.8%	101	17.3%
infos par intervenant-e	364	81.6%	119	86.2%	483	82.7%
Total	446	100.0%	138	100.0%	584	100.0%
Missing_	5		2		7	

0.2 La proportion de femmes est de 24 % (tout comme l'année précédente).

0.2 Sexe

	n	%
hommes	451	76.3%
femmes	140	23.7%
Total	591	100.0%
Missing_	0	

0.3 Âge, catégorisé selon les conventions act-info (vmec020)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
15-19 ans	13	2.9%	13	9.3%	26	4.4%
20-24 ans	70	15.5%	36	25.7%	106	17.9%
25-29 ans	95	21.1%	29	20.7%	124	21.0%
30-34 ans	104	23.1%	22	15.7%	126	21.3%
35-39 ans	91	20.2%	18	12.9%	109	18.4%
40-44 ans	52	11.5%	15	10.7%	67	11.3%
45-49 ans	20	4.4%	4	2.9%	24	4.1%
50-54 ans	5	1.1%	3	2.1%	8	1.4%
55-59 ans	1	.2%	0	.0%	1	.2%
Total	451	100.0%	140	100.0%	591	100.0%
Missing_	0		0		0	

0.4 Âge, catégorisé selon les conventions act-info-FOS (vmec020)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jusqu'à 19 ans	13	2.9%	13	9.3%	26	4.4%
20-24 ans	70	15.5%	36	25.7%	106	17.9%
25-29 ans	95	21.1%	29	20.7%	124	21.0%
30-39 ans	195	43.2%	40	28.6%	235	39.8%
40 ans et plus	78	17.3%	22	15.7%	100	16.9%
Total	451	100.0%	140	100.0%	591	100.0%
Missing_	0		0		0	

0.5 Statistique: Âge, moyenne (vmec020)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	min	max	Std Deviation	valid cases	total cases
hommes	32.09	26.00	32.00	38.00	17.00	59.00	7.62	451	451
femmes	29.59	22.25	28.00	37.00	18.00	54.00	8.50	140	140
Total	31.50	25.00	31.00	37.00	17.00	59.00	7.90	591	591

0.6 État civil (vmac020)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
célibataire	366	83.6%	113	83.1%	479	83.4%
marié-e	19	4.3%	6	4.4%	25	4.4%
séparé-e (juridiquement)	12	2.7%	4	2.9%	16	2.8%
divorcé-e	39	8.9%	12	8.8%	51	8.9%
veuf/veuve	1	.2%	1	.7%	2	.3%
partenariat enregistré (PaCS)	1	.2%	0	.0%	1	.2%
Total	438	100.0%	136	100.0%	574	100.0%
Missing_	13		4		17	

0.7 Nombre de client-e-s selon le domicile (canton) (vmac010c)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
domicile (canton), alphabétique	AG	16	4.0%	5	4.0%	21	4.0%
	AI	1	.3%	0	.0%	1	.2%
	BE	76	19.0%	27	21.8%	103	19.7%
	BL	6	1.5%	6	4.8%	12	2.3%
	BS	16	4.0%	3	2.4%	19	3.6%
	FR	21	5.3%	3	2.4%	24	4.6%
	GE	10	2.5%	2	1.6%	12	2.3%
	GL	0	.0%	1	.8%	1	.2%
	GR	4	1.0%	0	.0%	4	.8%
	JU	2	.5%	0	.0%	2	.4%
	LU	18	4.5%	10	8.1%	28	5.3%
	NE	1	.3%	2	1.6%	3	.6%
	NW	1	.3%	0	.0%	1	.2%
	SG	14	3.5%	4	3.2%	18	3.4%
	SH	3	.8%	1	.8%	4	.8%
	SO	14	3.5%	5	4.0%	19	3.6%
	SZ	5	1.3%	1	.8%	6	1.1%
	TG	3	.8%	2	1.6%	5	1.0%
	TI	45	11.3%	12	9.7%	57	10.9%
	VD	48	12.0%	15	12.1%	63	12.0%
	VS	19	4.8%	7	5.6%	26	5.0%
	ZG	7	1.8%	0	.0%	7	1.3%
	ZH	70	17.5%	18	14.5%	88	16.8%
	Total	400	100.0%	124	100.0%	524	100.0%
	Missing_	51		16		67	

A CADRE DE LA PRISE EN CHARGE

A1 25 % de la clientèle a achevé le traitement selon les termes convenus, 16 % l'a achevé comme prévu pour passer dans un établissement de traitement des addictions. Pour 49 % des personnes, le traitement a été interrompu soit par le client soit par l'institution traitante. Si l'on ajoute les personnes avec qui le contact est perdu (0,9 %), ce taux passe à 50 %. On n'observe pas de différence entre les hommes et les femmes sur la question du genre de sortie.

A1 Raison principale de la fin du traitement (vmab040)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
fin régulière sans transfert	119	26.6%	29	20.7%	148	25.2%
fin régulière avec transfert	73	16.3%	19	13.6%	92	15.6%
changement de domicile	2	.4%	0	.0%	2	.3%
hospitalisation	12	2.7%	10	7.1%	22	3.7%
détention	19	4.2%	2	1.4%	21	3.6%
perte de contact	3	.7%	2	1.4%	5	.9%
rupture explicite	212	47.3%	74	52.9%	286	48.6%
décès	0	.0%	2	1.4%	2	.3%
autre raison	8	1.8%	2	1.4%	10	1.7%
Total	448	100.0%	140	100.0%	588	100.0%
Missing_	3		0		3	

A2 Parmi les personnes qui ont achevé le traitement comme prévu pour passer à un autre suivi, 43 % ont passé dans un appartement protégé, 28 % suivent un traitement ambulatoire et 20 % un autre traitement résidentiel.

A2 Transfert vers une institution spécialisée en matière de dépendance, sous-groupe: fin régulière avec transfert (vmab041)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
traitement résidentiel	13	17.8%	5	27.8%	18	19.8%
prise en charge ambulatoire	21	28.8%	4	22.2%	25	27.5%
appartement protégé	32	43.8%	7	38.9%	39	42.9%
autre institution spécialisée	7	9.6%	2	11.1%	9	9.9%
Total	73	100.0%	18	100.0%	91	100.0%
Missing_	0		1		1	

A4 Deux personnes sont décédées (une seule l'année précédente).

A4 Cause du décès, sous-groupe: fin du traitement à cause de décès (vmab044)

	femmes		Total	
	n	%	n	%
maladie	1	50.0%	1	50.0%
surdose	1	50.0%	1	50.0%
Total	2	100.0%	2	100.0%
Missing_ .	0		0	

A4b Autre cause, sous-groupe: autre cause (vmab046)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
rupture explicite de la part de l'organisme de financement	2	25.0%	0	.0%	2	20.0%
transfert vers une institution non spécialisée en matière de dépendance	1	12.5%	2	100.0%	3	30.0%
autre	5	62.5%	0	.0%	5	50.0%
Total	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%
Missing_ .	0		0		0	

Durée du séjour

.....

A5 9 % des clients et clientes sont restés moins d'un mois en traitement, 13 % entre 1 et 3 mois. Parmi les résidents de longue durée, 17 % auront passé entre 12 et 18 mois en traitement résidentiel et 17 % plus de 18 mois.

A5 Durée du séjour (vmab040a, vmab020)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 1 mois (0-30 jours)	40	8.9%	14	10.0%	54	9.1%
1 à 3 mois (31-90 jours)	58	12.9%	21	15.0%	79	13.4%
3 à 6 mois (91-180 jours)	79	17.5%	26	18.6%	105	17.8%
6 à 9 mois (181-270 jours)	59	13.1%	19	13.6%	78	13.2%
9 à 12 mois (271-360 jours)	52	11.5%	19	13.6%	71	12.0%
12 à 18 mois (361-540 jours)	83	18.4%	20	14.3%	103	17.4%
18 mois ou plus (plus de 540 jours)	80	17.7%	21	15.0%	101	17.1%
Total	451	100.0%	140	100.0%	591	100.0%
Missing_ .	0		0		0	

A6a De façon prévisible, les personnes qui achèvent le traitement selon les termes convenus (qu'elles passent ou non à un autre suivi) se distinguent significativement de celles qui interrompent le traitement : ces dernières sont significativement plus nombreuses à passer jusqu'à 1 mois, entre 1 et 3 mois ou entre 3 et 6 mois en traitement, alors que celles qui achèvent le traitement comme convenu passent plus souvent entre 12 et 18 mois ou plus dans l'institution (Cr's V= .56; p < .000).

A6a Durée du séjour et circonstances de sortie (sans autres raisons) (vmab040, vmeb040a, vmab020)

	fin régulière avec ou sans transfert		rupture ou perte de contact		Total	
	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 1 mois (0-30 jours)	4	1.7%	43	14.8%	47	8.9%
1 à 3 mois (31-90 jours)	9	3.8%	56	19.2%	65	12.2%
3 à 6 mois (91-180 jours)	21	8.8%	71	24.4%	92	17.3%
6 à 9 mois (181-270 jours)	20	8.3%	49	16.8%	69	13.0%
9 à 12 mois (271-360 jours)	39	16.3%	28	9.6%	67	12.6%
12 à 18 mois (361-540 jours)	66	27.5%	30	10.3%	96	18.1%
18 mois ou plus (plus de 540 jours)	81	33.8%	14	4.8%	95	17.9%
Total	240	100.0%	291	100.0%	531	100.0%

A6b Les clients dont le traitement se termine comme convenu restent en traitement 460 jours en moyenne, contre 194 jours en moyenne en cas d'interruption. Cette différence est très significative (p<.000).

A6b Statistique: Durée de séjour et circonstances de sortie

		Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	valid cases
Circonstances de la sortie, rec	fin régulière avec ou sans transfert	460.08	280.75	437.50	568.75	288.61	240
	rupture ou perte de contact	193.47	57.00	145.00	268.00	191.63	291
Total		313.97	101.00	258.00	471.00	274.40	531

A7 Statistique: Durée du séjour (en jours)

		Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	valid cases
Sexe	hommes	311.19	96.00	250.00	471.00	272.72	451
	femmes	291.86	87.25	232.50	394.50	289.04	140
Total		306.61	96.00	240.00	456.00	276.55	591

A8 La durée moyenne du séjour est une nouvelle fois calculée sans tenir compte des personnes au séjour particulièrement long (plus de 2 ans). La durée moyenne du traitement est de 260 jours.

A8 Statistique: Durée du séjour (en jours): sans les personnes avec un séjour de plus de 2 ans

		Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	valid cases
Sexe	hommes	268.22	94.00	227.00	431.00	199.30	425
	femmes	234.82	78.00	213.00	354.00	177.23	131
Total		260.35	92.25	226.50	398.75	194.69	556

Programme de substitution

.....

A9 35 % des clients et clientes ont suivi un traitement de substitution pendant leur traitement résidentiel (année précédente : 29 %). A la différence de l'enquête précédente, qui montrait que les femmes suivaient un traitement de substitution significativement plus souvent que les hommes, il n'y a pas de différence entre les sexes.

A9 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne effectué (vmab050)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
non	290	66.8%	84	60.4%	374	65.3%
oui	144	33.2%	55	39.6%	199	34.7%
Total	434	100.0%	139	100.0%	573	100.0%
Missing_	17		1		18	

A10 Quel programme de substitution, sous-groupe: programme de substitution effectué (vmab055)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
méthadone	125	87.4%	49	89.1%	174	87.9%
autres opiacés p.ex. buprénorphine	16	11.2%	6	10.9%	22	11.1%
autres substances p.ex. naltrexone	2	1.4%	0	.0%	2	1.0%
Total	143	100.0%	55	100.0%	198	100.0%
Missing_	1		0		1	

A11 Pour 29 % des personnes, un traitement de substitution est prévu immédiatement à l'issue du traitement résidentiel. Parmi ces 29 % - soit 156 personnes - qui passent à un traitement de substitution (avec prescription d'héroïne ou méthadone / Subutex), 95 % le suivent durant le traitement déjà (pas de tableau).

A11 Programme de substitution prévu après la fin du traitement (vmab060)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
non	297	72.4%	82	65.6%	379	70.8%
oui, prescription d'héroïne	1	.2%	2	1.6%	3	.6%
oui, méthadone etc	112	27.3%	41	32.8%	153	28.6%
Total	410	100.0%	125	100.0%	535	100.0%
Missing_	41		15		56	

Postcure

.....

A12 Pour 54 % des clients et clientes, une postcure a été prévue ou préparée.

A12 Postcure prévue et mise en place (vzaj010)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
non	195	47.4%	51	42.5%	246	46.3%
oui	216	52.6%	69	57.5%	285	53.7%
Total	411	100.0%	120	100.0%	531	100.0%
Missing_	40		20		60	

A13 Le projet de postcure consistait, pour 29 % de la clientèle concernée, en un contact avec un centre de conseil ambulatoire pour les problèmes liés aux drogues, pour 19 % en un contact avec un service de postcure de l'institution, pour 16 % en un contact avec un service de postcure tiers et pour 12 % en un appartement protégé de l'institution (plusieurs réponses possibles).

A13 Quel service ou groupe est-il prévu de solliciter, sous-groupe: postcure prévue et mise en place (plusieurs réponses) (vzaj015y-vzaj015j)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
app. protégé de l'inst.	réponses	27	7	34
	personnes %	12.6%	10.4%	12.1%
service postcure de l'inst.	réponses	42	11	53
	personnes %	19.5%	16.4%	18.8%
app. protégé ext.	réponses	15	4	19
	personnes %	7.0%	6.0%	6.7%
service postcure ext.	réponses	35	9	44
	personnes %	16.3%	13.4%	15.6%
centre consult. p. alcool	réponses	5	3	8
	personnes %	2.3%	4.5%	2.8%
centre consult. p. drogues	réponses	68	15	83
	personnes %	31.6%	22.4%	29.4%
autre centre de consultation	réponses	23	6	29
	personnes %	10.7%	9.0%	10.3%
groupe d'entraide	réponses	8	2	10
	personnes %	3.7%	3.0%	3.5%
groupe d'anciens clients de l'inst.	réponses	3	0	3
	personnes %	1.4%	.0%	1.1%
autre: psychothérapie	réponses	10	6	16
	personnes %	4.7%	9.0%	5.7%
autre: sevrage	réponses	4	2	6
	personnes %	1.9%	3.0%	2.1%
autre: traitement résidentiel	réponses	5	0	5
	personnes %	2.3%	.0%	1.8%
autre: clinique psychiatrique	réponses	6	9	15
	personnes %	2.8%	13.4%	5.3%
autre: prison	réponses	8	2	10
	personnes %	3.7%	3.0%	3.5%
autre: service de probation	réponses	4	0	4
	personnes %	1.9%	.0%	1.4%
autre: foyer, logement accomp.	réponses	11	8	19
	personnes %	5.1%	11.9%	6.7%
autre: div.	réponses	8	6	14
	personnes %	3.7%	9.0%	5.0%
Total	réponses	282	90	372
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
nombre de personnes		215	67	282
	personnes %	131.2%	134.3%	131.9%
Missing		1	2	3

B DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

B1 A leur sortie, 29 % des clients habitent seuls, 14 % logent chez leurs parents ou chez l'un des deux.

B1 Ménage avec qui après la sortie (vmac030)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
seul-e en ménage	116	31.4%	24	22.0%	140	29.2%
avec parent(s)	49	13.2%	16	14.7%	65	13.6%
avec enfant(s), sans partenaire	1	.3%	5	4.6%	6	1.3%
avec partenaire, sans enfant(s)	26	7.0%	9	8.3%	35	7.3%
avec partenaire et enfant(s)	19	5.1%	3	2.8%	22	4.6%
avec d'autres proches	10	2.7%	4	3.7%	14	2.9%
avec ami-e-s (colocation)	48	13.0%	10	9.2%	58	12.1%
autre: détention préventive, emprisonnement	29	7.8%	3	2.8%	32	6.7%
autre: traitement résidentiel	2	.5%	1	.9%	3	.6%
autre: appartement protégé	14	3.8%	4	3.7%	18	3.8%
autre: foyer, logement accompagné	13	3.5%	5	4.6%	18	3.8%
autre: hôpital	4	1.1%	3	2.8%	7	1.5%
autre: institution div.	26	7.0%	14	12.8%	40	8.4%
autre: div.	13	3.5%	8	7.3%	21	4.4%
Total	370	100.0%	109	100.0%	479	100.0%
Missing_	81		31		112	

B2 Pour 54 % des personnes, le logement à la sortie peut être qualifié de stable.

B2 Type de domicile après la sortie (vmac040)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
domicile fixe	208	54.7%	58	51.8%	266	54.1%
sans domicile fixe	71	18.7%	22	19.6%	93	18.9%
institution	101	26.6%	32	28.6%	133	27.0%
Total	380	100.0%	112	100.0%	492	100.0%
Missing_	71		28		99	

B3 57 % des clients et clientes ne sont pas en couple au moment de leur sortie. Les femmes ont de façon significativement plus fréquente une relation stable (Cr's V .15; p< .001).

B3 Type de relation de couple au moment de la sortie (vzas010)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
sans partenaire	244	61.2%	49	43.0%	293	57.1%
relation(s) temporaire(s)	47	11.8%	27	23.7%	74	14.4%
partenaire fixe en vivant séparé-e	64	16.0%	24	21.1%	88	17.2%
partenaire fixe en ménage commun	44	11.0%	14	12.3%	58	11.3%
Total	399	100.0%	114	100.0%	513	100.0%
Missing_	52		26		78	

B4 Soutien par membres de la famille ou connaissances (vzas020)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
non, aucun	31	8.1%	12	10.3%	43	8.6%
oui	354	91.9%	105	89.7%	459	91.4%
Total	385	100.0%	117	100.0%	502	100.0%
Missing_	66		23		89	

Source de revenu

B5 Après leur sortie, 54 % des personnes ont pour source de revenu principale l'aide sociale, 20 % leur propre activité lucrative. Les femmes (7 %) sont significativement moins nombreuses que les hommes (24 %) à tirer leur revenu principalement de leur activité lucrative (Cr's V=.18, p<.001). Des différences très significatives distinguent les personnes à la fin de leur thérapie (pas de tableau) : à leur sortie, 69 % de celles dont le traitement est interrompu vivent de l'aide sociale, contre 40 % de celles dont le traitement se termine selon les termes convenus, qui sont 35 % à tirer leur revenu de leur propre activité lucrative, contre 8 % de celles dont le traitement est interrompu (Cr's V=.36, p<.000).

B5 Principale source de revenu après la sortie (vmac050)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
salaire	91	23.5%	8	6.8%	99	19.6%
économies	2	.5%	0	.0%	2	.4%
rente (AVS, AI, autres)	54	14.0%	20	17.1%	74	14.7%
aide sociale	197	50.9%	77	65.8%	274	54.4%
assurance-chômage	16	4.1%	2	1.7%	18	3.6%
soutien partenaire	0	.0%	3	2.6%	3	.6%
soutien parents/ ami-e-s	6	1.6%	3	2.6%	9	1.8%
deal, combines	2	.5%	0	.0%	2	.4%
autres revenus illégaux	1	.3%	0	.0%	1	.2%
autre: détention préventive, emprisonnement	5	1.3%	1	.9%	6	1.2%
autre: justice	4	1.0%	1	.9%	5	1.0%
autre: div.	9	2.3%	2	1.7%	11	2.2%
Total	387	100.0%	117	100.0%	504	100.0%
Missing_	64		23		87	

Activité rémunératrice

B6 Après leur sortie, 38 % des clients et clientes ne sont pas sur le marché de l'emploi (recherche d'emploi non incluse) ; 26 % ont un travail, que ce soit à temps partiel ou à temps plein ou encore sous forme de plusieurs activités professionnelles ; 22 % sont sans travail mais en recherche d'emploi. De façon significativement plus fréquente que les hommes (32 %), les femmes (58 %) ne sont pas sur le marché de l'emploi (Cr' V=.23, p<.000). Il n'est pas constaté de différence entre les sexes en ce qui concerne le statut « sans travail, mais en recherche d'emploi ».

Une différence très significative distingue les clients à la fin de leur thérapie (pas de tableau) : la clientèle dont le traitement s'achève comme prévu et qui ne passe pas à un autre suivi est significativement plus souvent active sur le marché de l'emploi (54 %) que deux autres groupes, celui de la clientèle dont le traitement s'achève également comme prévu et qui passe à un autre suivi (31 %) d'abord et, de façon prévisible, celui dont le traitement est interrompu (11 %). Les personnes dont le traitement est interrompu sont plus fréquemment non seulement « sans activité professionnelle » mais aussi en recherche d'emploi (29 %) que la clientèle avec fin de traitement prévue sans passage à un autre suivi (14 %).

B6 Activité rémunératrice après la sortie (vmac060)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
à plein temps	92	24.9%	10	9.3%	102	21.4%
à temps partiel	14	3.8%	3	2.8%	17	3.6%
plusieurs activités professionnelles	3	.8%	2	1.9%	5	1.0%
en formation	25	6.8%	5	4.7%	30	6.3%
sans activité professionnelle	119	32.2%	62	57.9%	181	37.9%
sans travail, en quête d'emploi	88	23.8%	19	17.8%	107	22.4%
sans travail, futur emploi garanti	8	2.2%	0	.0%	8	1.7%
autre: détention préventive, emprisonnement	4	1.1%	0	.0%	4	.8%
autre: clinique, institution	2	.5%	1	.9%	3	.6%
autre: div.	15	4.1%	5	4.7%	20	4.2%
Total	370	100.0%	107	100.0%	477	100.0%
Missing_	81		33		114	

B7 Formation achevée (vmac070a - vmac070j)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
aucune formation achev.	33	8.5%	12	9.8%	45	8.8%
scolarité obligat.	118	30.4%	47	38.5%	165	32.4%
scolarité complément.	21	5.4%	8	6.6%	29	5.7%
apprentissage, école prof.	179	46.1%	44	36.1%	223	43.7%
lycée, école prép. maturité	11	2.8%	7	5.7%	18	3.5%
école pédagogique	0	.0%	2	1.6%	2	.4%
formation prof. supérieure	14	3.6%	1	.8%	15	2.9%
école prof. supérieure	5	1.3%	1	.8%	6	1.2%
haute école spécialisée	1	.3%	0	.0%	1	.2%
université, haute école	6	1.5%	0	.0%	6	1.2%
Total	388	100.0%	122	100.0%	510	100.0%
Missing_	63		18		81	

B8 Formation en cours au moment de la sortie (vmac075)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
aucune formation en cours	389	90.7%	123	96.1%	512	91.9%
scolarité obligat.	1	.2%	0	.0%	1	.2%
scolarité complément.	2	.5%	1	.8%	3	.5%
apprentissage, école prof.	30	7.0%	3	2.3%	33	5.9%
formation prof. supérieure	3	.7%	1	.8%	4	.7%
école prof. supérieure	2	.5%	0	.0%	2	.4%
université, haute école	2	.5%	0	.0%	2	.4%
Total	429	100.0%	128	100.0%	557	100.0%
Missing_	22		12		34	

Dettes

.....

B9 L'endettement constitue un problème important pour la clientèle, jusqu'après sa sortie. A leur sortie, 23 % des clients et clientes ne sont pas endettés. La proportion de femmes (37 %) sans dettes est significativement plus élevée que celle des hommes (20 %) (Cr's $V=.21$, $p<.006$). Pour 32 % de la clientèle, l'endettement va de 25 000 à 100 000 francs ou plus.

B9 Dettes au moment de la sortie (vzaf030)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
aucune dette	68	20.2%	29	36.7%	97	23.4%
jusqu'à 5000 sfr.	58	17.3%	16	20.3%	74	17.8%
5001 à 10 000 sfr.	38	11.3%	11	13.9%	49	11.8%
10 001 à 25 000 sfr.	53	15.8%	11	13.9%	64	15.4%
25 001 à 50 000 sfr.	63	18.8%	8	10.1%	71	17.1%
50 001 à 100 000 sfr.	33	9.8%	4	5.1%	37	8.9%
plus de 100 000 sfr.	23	6.8%	0	.0%	23	5.5%
Total	336	100.0%	79	100.0%	415	100.0%
Missing_	115		61		176	

Mesures et procédures

B10 Une mesure est prévue à la sortie de 39 % de la clientèle.

B10 Mesures en vigueur au moment de la sortie (vzar010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
aucune mesure	259	60.5%	80	62.5%	339	61.0%
mesure en vigueur	169	39.5%	48	37.5%	217	39.0%
Total	428	100.0%	128	100.0%	556	100.0%
Missing_	23		12		35	

B11 Parmi les mesures prévues, 24 % consistent dans l'exécution d'une peine suspendue, 14 % sont une curatelle, et 13 % ne sont pas encore fixées.

B11 Quelles mesures en vigueur au moment de la sortie (vzar010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
en cours de clarification	20	11.8%	9	18.8%	29	13.4%
tutelle (art. 370 CC)	20	11.8%	5	10.4%	25	11.5%
conseil légal (art. 395 CC)	4	2.4%	1	2.1%	5	2.3%
curatelle (art. 392 CC)	20	11.8%	10	20.8%	30	13.8%
patronage	18	10.7%	2	4.2%	20	9.2%
privation de liberté à fins d'assistance (art. 397 CC)	14	8.3%	8	16.7%	22	10.1%
exécution peine suspendue (p.ex. art. 44 CP)	42	24.9%	9	18.8%	51	23.5%
autre: poursuite de la mesure (art. 44 CP)	3	1.8%	0	.0%	3	1.4%
autre: mesures prononcées contre des adolescents en vertu du droit pénal	3	1.8%	0	.0%	3	1.4%
autre: div.	25	14.8%	4	8.3%	29	13.4%
Total	169	100.0%	48	100.0%	217	100.0%
Missing_	0		0		0	

B12 Une procédure est en cours pour 25 % de la clientèle.

B12 Procédures en cours au moment de la sortie (vzar020)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
procédure	101	26.6%	22	19.5%	123	25.0%
aucune procédure	278	73.4%	91	80.5%	369	75.0%
Total	379	100.0%	113	100.0%	492	100.0%
Missing_	72		27		99	

B13 Pour 50 % des personnes, les procédures concernent des infractions à la loi sur les stupéfiants, pour 30 % des vols, pour 15 % des infractions à la loi sur la circulation routière et pour 13 % des délits avec violence.

B13 Quelles procédures en cours au moment de la sortie (plusieurs réponses) (vzar020a - vzar020j)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
		n	%	
proc. fond. s. droit matrimonial	réponses	4	3	7
	personnes %	4.4%	15.8%	6.4%
procédure tutélaire	réponses	11	1	12
	personnes %	12.1%	5.3%	10.9%
conduite en état d'ivresse	réponses	2	0	2
	personnes %	2.2%	.0%	1.8%
infract. loi circulation rout.	réponses	15	1	16
	personnes %	16.5%	5.3%	14.5%
infract. loi stupéfiants	réponses	43	12	55
	personnes %	47.3%	63.2%	50.0%
vol	réponses	27	6	33
	personnes %	29.7%	31.6%	30.0%
autres atteintes à la propriété	réponses	6	3	9
	personnes %	6.6%	15.8%	8.2%
atteintes aux mœurs	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
actes de violence	réponses	11	3	14
	personnes %	12.1%	15.8%	12.7%
autre(s) délit(s)	réponses	18	3	21
	personnes %	19.8%	15.8%	19.1%
Total	réponses	137	32	169
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	91	19	110
Missing	personnes %	150.5%	168.4%	153.6%
		10	3	13

B14 Des mesures ou décisions administratives ou judiciaires ont été prononcées à l'encontre de 35 % des clients et clientes.

B14 Mesures ou décisions administratives ou judiciaires prononcées au moment de la sortie (vzar030y)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
mesure / décision	154	37.6%	30	24.6%	184	34.6%
aucune mesure / décision	256	62.4%	92	75.4%	348	65.4%
Total	410	100.0%	122	100.0%	532	100.0%
Missing_	41		18		59	

B15 Pour 20 % des clients et clientes concernés par une mesure ou une décision, la mesure (prise selon l'article 44 CP) est poursuivie, alors que 17 % sont réintégrés ou transférés en prison. Pour 20 %, une décision concernant une mesure ou une décision est attendue.

B15 Quelles mesures ou décisions administratives ou judiciaires prononcées au moment de la sortie (plusieurs réponses) (vzar030a - vzar030i)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
en cours de clarif.	réponses	31	4	35
	personnes %	21.4%	14.3%	20.2%
retrait permis de cond.	réponses	21	1	22
	personnes %	14.5%	3.6%	12.7%
priv. liberté à fins d'ass. (art. 397CC)	réponses	13	9	22
	personnes %	9.0%	32.1%	12.7%
traitm. psychothér. ambulatoire	réponses	18	2	20
	personnes %	12.4%	7.1%	11.6%
abstinence (lié à libér. condit.)	réponses	7	0	7
	personnes %	4.8%	.0%	4.0%
réintégration ou transfert en prison	réponses	25	5	30
	personnes %	17.2%	17.9%	17.3%
poursuite de la mesure (art. 44 CP)	réponses	27	8	35
	personnes %	18.6%	28.6%	20.2%
patronage, suspension condit.	réponses	15	4	19
	personnes %	10.3%	14.3%	11.0%
autre(s) mesure(s)	réponses	18	1	19
	personnes %	12.4%	3.6%	11.0%
Total	réponses	175	34	209
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	145	28	173
	personnes %	120.7%	121.4%	120.8%
Missing		9	2	11

C CONSOMMATIONS, DÉPENDANCES ET COMPORTEMENTS ASSIMILABLES À UNE ADDICTION

C1 Qu'ils continuent ou non à consommer effectivement la substance qui leur pose problème, 89 % des clients et clientes indiquent avoir un problème lié à une substance ou un problème d'addiction. La question n'inclut pas l'ampleur du problème ou des difficultés qui peuvent ainsi apparaître.

C1 Aucun problème lié à une substance (vmad010x)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
problème de dépendance	385	88.5%	120	89.6%	505	88.8%
aucun problème de dépendance	50	11.5%	14	10.4%	64	11.2%
Total	435	100.0%	134	100.0%	569	100.0%
Missing_	16		6		22	

C2 97 % des personnes ayant consommé au moment de leur sortie indiquent avoir un problème lié à une substance ou un problème d'addiction. Cette proportion est de 66 % pour la clientèle qui n'a pas consommé après sa sortie.

C2 Problème lié à une substance et consommation effective (vmad010x vmad020x) - sans missing data problème de dépendance

	aucune				Total	
	consommation		aucune consommation		n	%
	n	%	n	%		
problème de dépendance	384	97.0%	100	65.8%	484	88.3%
aucun problème de dépendance	12	3.0%	52	34.2%	64	11.7%
Total	396	100.0%	152	100.0%	548	100.0%
Missing_	4		6		10	

C3 A nouveau, ce tableau porte sur un sentiment par rapport à des substances problématiques, indépendamment de la consommation proprement dite. La moitié (50 %) de la clientèle indique que l'alcool lui pose problème, 44% signale l'héroïne, 42% la cocaïne, 33 % le cannabis et 21 % les benzodiazépines (plusieurs réponses possibles).

C4 Compte non tenu des personnes sans problème d'addiction, et indépendamment de la consommation effective, 57 % indiquent que l'alcool est un problème, 50 % mentionnent l'héroïne, 47 % la cocaïne, 37 % le cannabis et 23 % les benzodiazépines (plusieurs réponses possibles).

C3 Quelles substances posent problème au moment de la sortie, indép. consom. oui/non, ci-inclus la catégorie _aucune_ (plusieurs réponses) (vmad010x - vmad010v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucune	réponses	50	14	64
	personnes %	11.7%	10.6%	11.4%
alcool	réponses	211	70	281
	personnes %	49.2%	53.0%	50.1%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	67	35	102
	personnes %	15.6%	26.5%	18.2%
héroïne	réponses	191	56	247
	personnes %	44.5%	42.4%	44.0%
méthadone	réponses	68	19	87
	personnes %	15.9%	14.4%	15.5%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	10	7	17
	personnes %	2.3%	5.3%	3.0%
cocaïne	réponses	180	55	235
	personnes %	42.0%	41.7%	41.9%
crack, freebase	réponses	20	7	27
	personnes %	4.7%	5.3%	4.8%
amphétamines	réponses	32	3	35
	personnes %	7.5%	2.3%	6.2%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	30	6	36
	personnes %	7.0%	4.5%	6.4%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.2%	.0%	.2%
barbituriques	réponses	3	0	3
	personnes %	.7%	.0%	.5%
benzodiazépines	réponses	76	39	115
	personnes %	17.7%	29.5%	20.5%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	23	14	37
	personnes %	5.4%	10.6%	6.6%
LSD	réponses	15	2	17
	personnes %	3.5%	1.5%	3.0%
autres hallucinogènes	réponses	3	1	4
	personnes %	.7%	.8%	.7%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.2%	.0%	.2%
cannabis	réponses	140	45	185
	personnes %	32.6%	34.1%	33.0%
tabac	réponses	175	59	234
	personnes %	40.8%	44.7%	41.7%
autre(s) substance(s)	réponses	7	0	7
	personnes %	1.6%	.0%	1.2%
jeu pathologique	réponses	1	0	1
	personnes %	.2%	.0%	.2%
troubles alimentaires	réponses	5	9	14
	personnes %	1.2%	6.8%	2.5%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	7	1	8
	personnes %	1.6%	.8%	1.4%
Total	réponses	1316	442	1758
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	429	132	561
	personnes %	306.8%	334.8%	313.4%
Missing		22	8	30

C4 Quelles substances posent problème au moment de la sortie, indép. consom. oui/non, exclus la cat. _aucune_ ; sous-groupe: problèmes oui (plusieurs rép.) (vmad010a - vmad010v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
alcool	réponses	211	70	281
	personnes %	55.7%	59.3%	56.5%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	67	35	102
	personnes %	17.7%	29.7%	20.5%
héroïne	réponses	191	56	247
	personnes %	50.4%	47.5%	49.7%
méthadone	réponses	68	19	87
	personnes %	17.9%	16.1%	17.5%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	10	7	17
	personnes %	2.6%	5.9%	3.4%
cocaïne	réponses	180	55	235
	personnes %	47.5%	46.6%	47.3%
crack, freebase	réponses	20	7	27
	personnes %	5.3%	5.9%	5.4%
amphétamines	réponses	32	3	35
	personnes %	8.4%	2.5%	7.0%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	30	6	36
	personnes %	7.9%	5.1%	7.2%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.3%	.0%	.2%
barbituriques	réponses	3	0	3
	personnes %	.8%	.0%	.6%
benzodiazépines	réponses	76	39	115
	personnes %	20.1%	33.1%	23.1%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	23	14	37
	personnes %	6.1%	11.9%	7.4%
LSD	réponses	15	2	17
	personnes %	4.0%	1.7%	3.4%
autres hallucinogènes	réponses	3	1	4
	personnes %	.8%	.8%	.8%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.3%	.0%	.2%
cannabis	réponses	140	45	185
	personnes %	36.9%	38.1%	37.2%
tabac	réponses	175	59	234
	personnes %	46.2%	50.0%	47.1%
autre(s) substance(s)	réponses	7	0	7
	personnes %	1.8%	.0%	1.4%
jeu pathologique	réponses	1	0	1
	personnes %	.3%	.0%	.2%
troubles alimentaires	réponses	5	9	14
	personnes %	1.3%	7.6%	2.8%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	7	1	8
	personnes %	1.8%	.8%	1.6%
Total	réponses	1266	428	1694
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	379	118	497
	personnes %	334.0%	362.7%	340.8%
Missing		6	2	8

C5 72 % de la clientèle a consommé une ou des substances durant les 30 jours précédant la sortie; la question n'englobe pas la fréquence ni l'ampleur de cette consommation (qui peut aller de la consommation récréative à la rechute). Une différence très significative caractérise le mode de sortie (pas de tableau) : les clients et clientes dont le traitement est interrompu ont significativement plus fréquemment consommé avant la sortie - ils sont 85 % dans ce cas - que ceux dont le traitement se termine comme prévu, avec (61 %) ou sans (48 %) passage à un autre suivi.

C5 Substances consommées au cours des 30 jours précédant la sortie (vmad020x)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
consommation	295	69.7%	105	77.8%	400	71.7%
aucune consommation	128	30.3%	30	22.2%	158	28.3%
Total	423	100.0%	135	100.0%	558	100.0%
Missing_	28		5		33	

C6a Au cours des 30 jours précédant la sortie, 38 % de la clientèle a consommé de l'alcool, 24 % de l'héroïne, 19 % du cannabis et 18 % de la cocaïne.

C6b Si l'on exclut les personnes qui n'ont pas consommé, voici le tableau qui se dessine : Parmi la clientèle qui indique une consommation au moment de sa sortie, 53 % consomment de l'alcool, 33% de l'héroïne, 27 % du cannabis et 26 % de la cocaïne.

C6a Quelles substances consommées au cours des 30 jours précédant la sortie, ci-inclus la cat. _aucune_ (plusieurs rép) (vmad020a - vmad020v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucune	réponses	128	30	158
	personnes %	30.7%	22.6%	28.7%
alcool	réponses	159	49	208
	personnes %	38.1%	36.8%	37.8%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	21	16	37
	personnes %	5.0%	12.0%	6.7%
héroïne	réponses	95	34	129
	personnes %	22.8%	25.6%	23.5%
méthadone	réponses	35	16	51
	personnes %	8.4%	12.0%	9.3%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	4	2	6
	personnes %	1.0%	1.5%	1.1%
cocaïne	réponses	67	34	101
	personnes %	16.1%	25.6%	18.4%
crack, freebase	réponses	2	1	3
	personnes %	.5%	.8%	.5%
amphétamines	réponses	5	1	6
	personnes %	1.2%	.8%	1.1%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	7	1	8
	personnes %	1.7%	.8%	1.5%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.2%	.0%	.2%
barbituriques	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
benzodiazépines	réponses	34	21	55
	personnes %	8.2%	15.8%	10.0%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	10	8	18
	personnes %	2.4%	6.0%	3.3%
LSD	réponses	4	1	5
	personnes %	1.0%	.8%	.9%
autres hallucinogènes	réponses	1	0	1
	personnes %	.2%	.0%	.2%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.2%	.0%	.2%
cannabis	réponses	74	30	104
	personnes %	17.7%	22.6%	18.9%
tabac	réponses	141	47	188
	personnes %	33.8%	35.3%	34.2%
autre(s) substance(s)	réponses	9	1	10
	personnes %	2.2%	.8%	1.8%
jeu pathologique	réponses	1	1	2
	personnes %	.2%	.8%	.4%
troubles alimentaires	réponses	3	2	5
	personnes %	.7%	1.5%	.9%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	3	2	5
	personnes %	.7%	1.5%	.9%
Total	réponses	805	297	1102
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
Total	nombre de personnes	417	133	550
	personnes %	193.0%	223.3%	200.4%
Missing		34	7	41

C6b Substances consommées au cours des 30 jours précédant la sortie, sans aucune consommation_ (plusieurs réponses) (vmad020a - vmad020v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
alcool	réponses	159	49	208
	personnes %	55.0%	47.6%	53.1%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	21	16	37
	personnes %	7.3%	15.5%	9.4%
héroïne	réponses	95	34	129
	personnes %	32.9%	33.0%	32.9%
méthadone	réponses	35	16	51
	personnes %	12.1%	15.5%	13.0%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	4	2	6
	personnes %	1.4%	1.9%	1.5%
cocaïne	réponses	67	34	101
	personnes %	23.2%	33.0%	25.8%
crack, freebase	réponses	2	1	3
	personnes %	.7%	1.0%	.8%
amphétamines	réponses	5	1	6
	personnes %	1.7%	1.0%	1.5%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	7	1	8
	personnes %	2.4%	1.0%	2.0%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.3%	.0%	.3%
barbituriques	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
benzodiazépines	réponses	34	21	55
	personnes %	11.8%	20.4%	14.0%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	10	8	18
	personnes %	3.5%	7.8%	4.6%
LSD	réponses	4	1	5
	personnes %	1.4%	1.0%	1.3%
autres hallucinogènes	réponses	1	0	1
	personnes %	.3%	.0%	.3%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.3%	.0%	.3%
cannabis	réponses	74	30	104
	personnes %	25.6%	29.1%	26.5%
tabac	réponses	141	47	188
	personnes %	48.8%	45.6%	48.0%
autre(s) substance(s)	réponses	9	1	10
	personnes %	3.1%	1.0%	2.6%
jeu pathologique	réponses	1	1	2
	personnes %	.3%	1.0%	.5%
troubles alimentaires	réponses	3	2	5
	personnes %	1.0%	1.9%	1.3%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	3	2	5
	personnes %	1.0%	1.9%	1.3%
Total	réponses	677	267	944
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	289	103	392
Missing	personnes %	234.3%	259.2%	240.8%
		6	2	8

Les tableaux suivants mettent en regard la consommation des 30 derniers jours et la substance posant le problème principal au moment de l'admission. Les substances posant problème choisies sont les suivantes : alcool, cocktails, opiacés (héroïne, méthadone, morphine, codéine) et cocaïne (crack compris). La catégorie « Pas de consommation » a été maintenue dans les tableaux. Ces questions n'abordent pas la fréquence de la consommation ni les problèmes posés par celle-ci.

Voici les chiffres relatifs à la substance la plus problématique au moment de l'admission :

Pour 61 personnes : alcool
 Pour 63 personnes : cocktails
 Pour 195 personnes : opiacés
 Pour 149 personnes : cocaïne

C7a Sous-groupe pour qui la substance problématique à l'admission est l'**ALCOOL** : 20 % n'ont pas consommé de produit(s) dans les 30 jours précédant leur sortie, 59 % ont consommé de l'alcool et 19 % de l'héroïne.

C7b Sous-groupe pour qui la substance problématique à l'admission sont les **COCKTAILS** : 26 % n'ont pas consommé de substance(s), 36 % ont consommé de l'alcool, 26 % de la cocaïne, 21 % de l'héroïne et 21 % du cannabis.

C7c Sous-groupe pour qui la substance problématique à l'admission sont les **OPIACÉS** : 28 % n'ont pas consommé de substance(s), 35 % ont consommé de l'alcool, 38 % de l'héroïne et 18 % de la cocaïne.

C7d Sous-groupe pour qui la substance problématique à l'admission est la **COCAÏNE** : 32 % n'ont pas consommé de substance(s), 38 % ont consommé de l'alcool, 25 % de la cocaïne et 17 % de l'héroïne.

C7a Quelles substances consommées au cours des 30 jours précédant la sortie, ci-inclus la cat. _aucune_ (plusieurs rép) (vmed020a-v): sous-groupe: problème principal à l'admission: ALCOOL (vmed010)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucune	réponses	8	4	12
	personnes %	20.0%	21.1%	20.3%
alcool	réponses	24	11	35
	personnes %	60.0%	57.9%	59.3%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	2	0	2
	personnes %	5.0%	.0%	3.4%
héroïne	réponses	9	2	11
	personnes %	22.5%	10.5%	18.6%
méthadone	réponses	3	3	6
	personnes %	7.5%	15.8%	10.2%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
cocaïne	réponses	4	4	8
	personnes %	10.0%	21.1%	13.6%
crack, freebase	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
amphétamines	réponses	3	0	3
	personnes %	7.5%	.0%	5.1%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	1	0	1
	personnes %	2.5%	.0%	1.7%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
barbituriques	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
benzodiazépines	réponses	1	3	4
	personnes %	2.5%	15.8%	6.8%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	0	3	3
	personnes %	.0%	15.8%	5.1%
LSD	réponses	1	0	1
	personnes %	2.5%	.0%	1.7%
autres hallucinogènes	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
cannabis	réponses	8	1	9
	personnes %	20.0%	5.3%	15.3%
tabac	réponses	15	4	19
	personnes %	37.5%	21.1%	32.2%
autre(s) substance(s)	réponses	2	0	2
	personnes %	5.0%	.0%	3.4%
jeu pathologique	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
troubles alimentaires	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	5.3%	1.7%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	5.3%	1.7%
Total	réponses	81	37	118
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	40	19	59
	personnes %	202.5%	194.7%	200.0%
Missing		2	0	2

C7b Quelles substances consommées au cours des 30 jours précédant la sortie, ci-inclus la cat. _aucune_ (plusieurs rép) (vmed020a-v): sous-groupe: problème principal à l'admission: COCKTAILS (vmed010)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucune	réponses	12	3	13
	personnes %	28.6%	18.8%	25.9%
alcool	réponses	16	5	21
	personnes %	38.1%	31.3%	36.2%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	4	2	6
	personnes %	9.5%	12.5%	10.3%
héroïne	réponses	7	5	12
	personnes %	16.7%	31.3%	20.7%
méthadone	réponses	3	2	5
	personnes %	7.1%	12.5%	8.6%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	2.4%	.0%	1.7%
cocaïne	réponses	7	8	15
	personnes %	16.7%	50.0%	25.9%
crack, freebase	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
amphétamines	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
barbituriques	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
benzodiazépines	réponses	1	2	3
	personnes %	2.4%	12.5%	5.2%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	6.3%	1.7%
LSD	réponses	1	0	1
	personnes %	2.4%	.0%	1.7%
autres hallucinogènes	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
cannabis	réponses	7	5	12
	personnes %	16.7%	31.3%	20.7%
tabac	réponses	17	9	26
	personnes %	40.5%	56.3%	44.8%
autre(s) substance(s)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
jeu pathologique	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
troubles alimentaires	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	1	0	1
	personnes %	2.4%	.0%	1.7%
Total	réponses	77	42	119
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	42	16	58
	personnes %	183.3%	262.5%	205.2%
Missing		3	2	5

C7c Quelles substances consommées au cours des 30 jours précédant la sortie, ci-inclus la cat. _aucune_ (plusieurs rép) (vmad020a-v): sous-groupe: problème principal à l'admission: OPIACES (vmad010)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucune	réponses	41	8	49
	personnes %	30.8%	18.6%	27.8%
alcool	réponses	50	11	61
	personnes %	37.6%	25.6%	34.7%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	5	7	12
	personnes %	3.8%	16.3%	6.8%
héroïne	réponses	48	18	66
	personnes %	36.1%	41.9%	37.5%
méthadone	réponses	19	6	25
	personnes %	14.3%	14.0%	14.2%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	2	1	3
	personnes %	1.5%	2.3%	1.7%
cocaïne	réponses	20	11	31
	personnes %	15.0%	25.6%	17.6%
crack, freebase	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
amphétamines	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	2.3%	.6%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	2	1	3
	personnes %	1.5%	2.3%	1.7%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
barbituriques	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
benzodiazépines	réponses	15	6	21
	personnes %	11.3%	14.0%	11.9%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	3	2	5
	personnes %	2.3%	4.7%	2.8%
LSD	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	2.3%	.6%
autres hallucinogènes	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
cannabis	réponses	18	9	27
	personnes %	13.5%	20.9%	15.3%
tabac	réponses	40	15	55
	personnes %	30.1%	34.9%	31.3%
autre(s) substance(s)	réponses	2	1	3
	personnes %	1.5%	2.3%	1.7%
jeu pathologique	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	2.3%	.6%
troubles alimentaires	réponses	1	1	2
	personnes %	.8%	2.3%	1.1%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	2.3%	.6%
Total	réponses	266	101	367
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	133	43	176
personnes %	200.0%	234.9%	208.5%	
Missing		16	3	19

C7d Quelles substances consommées au cours des 30 jours précédant la sortie, ci-inclus la cat. _aucune_ (plusieurs rép) (vmad020a-v): sous-groupe: problème principal à l'admission: COCAÏNE (vmad010)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucune	réponses	36	9	45
	personnes %	32.1%	29.0%	31.5%
alcool	réponses	41	13	54
	personnes %	36.6%	41.9%	37.8%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	4	5	9
	personnes %	3.6%	16.1%	6.3%
héroïne	réponses	20	4	24
	personnes %	17.9%	12.9%	16.8%
méthadone	réponses	6	4	10
	personnes %	5.4%	12.9%	7.0%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.9%	.0%	.7%
cocaïne	réponses	26	9	35
	personnes %	23.2%	29.0%	24.5%
crack, freebase	réponses	2	1	3
	personnes %	1.8%	3.2%	2.1%
amphétamines	réponses	1	0	1
	personnes %	.9%	.0%	.7%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	4	0	4
	personnes %	3.6%	.0%	2.8%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.9%	.0%	.7%
barbituriques	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
benzodiazépines	réponses	7	2	9
	personnes %	6.3%	6.5%	6.3%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	1	0	1
	personnes %	.9%	.0%	.7%
LSD	réponses	1	0	1
	personnes %	.9%	.0%	.7%
autres hallucinogènes	réponses	1	0	1
	personnes %	.9%	.0%	.7%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.9%	.0%	.7%
cannabis	réponses	16	8	24
	personnes %	14.3%	25.8%	16.8%
tabac	réponses	40	13	53
	personnes %	35.7%	41.9%	37.1%
autre(s) substance(s)	réponses	2	0	2
	personnes %	1.8%	.0%	1.4%
jeu pathologique	réponses	1	0	1
	personnes %	.9%	.0%	.7%
troubles alimentaires	réponses	1	0	1
	personnes %	.9%	.0%	.7%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	1	0	1
	personnes %	.9%	.0%	.7%
Total	réponses	214	68	282
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	112	31	143
personnes %	191.1%	219.4%	197.2%	
Missing		5	1	6

C8 16 % de la clientèle a consommé des drogues par injection dans les 30 jours précédant sa sortie. C'est le cas de 4 % de la clientèle dont le traitement s'achève comme prévu et qui ne passe pas à un autre suivi (pas de tableau), de 8 % de celle dont le traitement s'achève également comme prévu et qui passe à un autre suivi, et de 25 % de celle dont le traitement est interrompu. Cette différence est très significative (C's V=.26, p<.000).

C8 Injection au cours des 30 jours précédant la sortie (vmad030)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
oui	48	13.4%	24	22.0%	72	15.5%
non	309	86.6%	85	78.0%	394	84.5%
Total	357	100.0%	109	100.0%	466	100.0%
Missing_	94		31		125	

C9 23 % des personnes indiquent ne pas avoir eu de rechute en cours de traitement par rapport à leurs objectifs thérapeutiques, ou alors le soignant ou la soignante indique qu'il n'y a pas eu de rechute.

C9 Rechutes par rapport aux objectifs thérapeutiques (vzaz010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
aucune	100	24.0%	23	18.1%	123	22.6%
une fois	44	10.6%	18	14.2%	62	11.4%
deux fois	47	11.3%	16	12.6%	63	11.6%
trois ou quatre fois	108	25.9%	38	29.9%	146	26.8%
cinq fois ou plus	118	28.3%	32	25.2%	150	27.6%
Total	417	100.0%	127	100.0%	544	100.0%
Missing_	34		13		47	

C10 Les rechutes signalées le sont par rapport aux substances suivantes (sans la catégorie « Pas de rechutes ») : pour 62 % l'alcool, pour 48 % l'héroïne, pour 42 % la cocaïne et pour 34 % le cannabis (plusieurs réponses possibles).

C10 Rechutes par rapport à quelles substances, sous-groupe: rechute oui (plusieurs rép.) (vzaz020a - vzaz020v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
alcool	réponses	196	60	256
	personnes %	62.8%	58.3%	61.7%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	34	18	52
	personnes %	10.9%	17.5%	12.5%
héroïne	réponses	147	51	198
	personnes %	47.1%	49.5%	47.7%
méthadone	réponses	13	8	21
	personnes %	4.2%	7.8%	5.1%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	9	2	11
	personnes %	2.9%	1.9%	2.7%
cocaïne	réponses	128	48	176
	personnes %	41.0%	46.6%	42.4%
crack, freebase	réponses	5	1	6
	personnes %	1.6%	1.0%	1.4%
amphétamines	réponses	11	2	13
	personnes %	3.5%	1.9%	3.1%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	12	4	16
	personnes %	3.8%	3.9%	3.9%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	2	0	2
	personnes %	.6%	.0%	.5%
barbituriques	réponses	2	0	2
	personnes %	.6%	.0%	.5%
benzodiazépines	réponses	45	25	70
	personnes %	14.4%	24.3%	16.9%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	11	7	18
	personnes %	3.5%	6.8%	4.3%
LSD	réponses	8	2	10
	personnes %	2.6%	1.9%	2.4%
autres hallucinogènes	réponses	3	0	3
	personnes %	1.0%	.0%	.7%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	3	0	3
	personnes %	1.0%	.0%	.7%
cannabis	réponses	109	33	142
	personnes %	34.9%	32.0%	34.2%
tabac	réponses	34	13	47
	personnes %	10.9%	12.6%	11.3%
autre(s) substance(s)	réponses	15	1	16
	personnes %	4.8%	1.0%	3.9%
jeu pathologique	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
troubles alimentaires	réponses	1	2	3
	personnes %	.3%	1.9%	.7%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	5	1	6
	personnes %	1.6%	1.0%	1.4%
Total	réponses	793	278	1071
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
Total	nombre de personnes	312	103	415
	personnes %	254.2%	269.9%	258.1%
Missing		5	1	6

C11 Durée des rechutes (en jours), sous-groupe: rechute oui (vzaz030)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
1 jour	51	22.2%	7	11.7%	58	20.0%
2-3 jours	52	22.6%	22	36.7%	74	25.5%
4-7 jours	57	24.8%	11	18.3%	68	23.4%
8-14 jours	36	15.7%	10	16.7%	46	15.9%
15 jours et plus	34	14.8%	10	16.7%	44	15.2%
Total	230	100.0%	60	100.0%	290	100.0%
Missing_	87		44		131	

D PRONOSTIC

D1a Par rapport au problème d'addiction, le pronostic établi est bon pour 29 % des clients et clientes, et très bon pour 7 %.

D1a Pronostic face au problème de dépendance (vzag010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
très bon pronostic	32	7.8%	7	5.9%	39	7.4%
bon pronostic	122	29.9%	30	25.4%	152	28.9%
plutôt mauvais pronostic	134	32.8%	44	37.3%	178	33.8%
mauvais pronostic	120	29.4%	37	31.4%	157	29.8%
Total	408	100.0%	118	100.0%	526	100.0%
Missing_	43		22		65	

D1b De manière prévisible, le pronostic est corrélé à la façon dont le traitement se termine : s'il est plutôt défavorable pour 42 % des clients et clientes dont le traitement est interrompu et défavorable pour 50 % d'entre eux, il est très bon pour 16 % des personnes dont le traitement arrive à terme comme prévu (avec ou sans passage à un autre suivi) et bon pour 57 % d'entre elles (Cr's $V=.69$, $p<.000$).

D1b Pronostic face au problème de dépendance et fin du traitement (vzag010 vmab040)

	Circonstances de la sortie, rec				Total	
	fin régulière avec ou sans transfert		rupture ou perte de contact		n	%
	n	%	n	%		
très bon pronostic	37	16.4%	0	.0%	37	7.8%
bon pronostic	128	56.6%	20	8.1%	148	31.2%
plutôt mauvais pronostic	49	21.7%	105	42.3%	154	32.5%
mauvais pronostic	12	5.3%	123	49.6%	135	28.5%
Total	226	100.0%	248	100.0%	474	100.0%
Missing_	14		43		57	

act-info-FOS Tableaux des ENTRÉES 2009

0 DONNÉES RELATIVES AUX CLIENT-E-S

L'évaluation des entrées enregistrées en 2009 se base sur **602 questionnaires valablement remplis**. Ces 602 entrées correspondent à 576 personnes : au cours de l'année de référence 2009, 554 clients et clientes ont été admis une fois dans un établissement act-info-FOS, 19 personnes deux fois, deux personnes trois fois et une personne quatre fois.

0.1 Source des informations (vmed100)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
infos par client-e	374	85.0%	129	82.2%	503	84.3%
infos par intervenant-e	66	15.0%	28	17.8%	94	15.7%
Total	440	100.0%	157	100.0%	597	100.0%
Missing_	5		0		5	

0.2 Les femmes représentent 26 % des personnes interrogées

0.2 Sexe (vmec010)

	n	%
hommes	445	73.9%
femmes	157	26.1%
Total	602	100.0%
Missing_	0	

0.3 Les hommes représentent 73 % de la clientèle des institutions de Suisse alémanique, 77 % de celle des institutions de Suisse romande et 71 % de celle des institutions du canton du Tessin.

0.3 Nombre de client-e-s selon la région linguistique (institution)

	Suisse alémanique		Suisse romande		Suisse italienne		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
hommes	288	73.1%	121	77.1%	36	70.6%	445	73.9%
femmes	106	26.9%	36	22.9%	15	29.4%	157	26.1%
Total	394	100.0%	157	100.0%	51	100.0%	602	100.0%
Missing_	0		0		0		0	

0.4 Âge, catégorisé selon les conventions act-info (standards OFS) (vmec020)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
15-19 ans	31	7.0%	18	11.5%	49	8.2%
20-24 ans	69	15.6%	28	17.8%	97	16.2%
25-29 ans	80	18.1%	36	22.9%	116	19.3%
30-34 ans	103	23.3%	34	21.7%	137	22.8%
35-39 ans	84	19.0%	12	7.6%	96	16.0%
40-44 ans	60	13.5%	18	11.5%	78	13.0%
45-49 ans	13	2.9%	7	4.5%	20	3.3%
50-54 ans	2	.5%	3	1.9%	5	.8%
55-59 ans	1	.2%	1	.6%	2	.3%
Total	443	100.0%	157	100.0%	600	100.0%
Missing_	2		0		2	

0.5 56 % des personnes en traitement résidentiel ont 30 ans et plus.

0.6 L'âge moyen des hommes en début de traitement (31,4 ans) ne diffère pas significativement de celui des femmes (30,0 ans).

0.5 Âge, catégorisé selon les conventions act-info-FOS (vmec020)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jusqu'à 19 ans	31	7.0%	18	11.5%	49	8.2%
20-24 ans	69	15.6%	28	17.8%	97	16.2%
25-29 ans	80	18.1%	36	22.9%	116	19.3%
30-39 ans	187	42.2%	46	29.3%	233	38.8%
40 ans et plus	76	17.2%	29	18.5%	105	17.5%
Total	443	100.0%	157	100.0%	600	100.0%
Missing_	2		0		2	

0.6 Statistique: Âge, moyenne (vmec020)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	valid cases
hommes	31.35	25.00	31.00	37.00	7.87	443
femmes	30.03	23.00	29.00	37.00	8.76	157
Total	31.00	25.00	31.00	37.00	8.13	600

0.7 État civil (vmec040)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
célibataire	360	84.3%	114	78.6%	474	82.9%
marié-e	20	4.7%	11	7.6%	31	5.4%
séparé-e (juridiquement)	12	2.8%	8	5.5%	20	3.5%
divorcé-e	34	8.0%	11	7.6%	45	7.9%
veuf/veuve	1	.2%	1	.7%	2	.3%
Total	427	100.0%	145	100.0%	572	100.0%
Missing_	18		12		30	

0.8 Nombre de client-e-s selon le domicile (canton) (vmec030c)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
domicile (canton), alphabétique	AG	17	4.1%	6	4.1%	23	4.1%
	BE	80	19.2%	26	17.8%	106	18.9%
	BL	11	2.6%	6	4.1%	17	3.0%
	BS	23	5.5%	4	2.7%	27	4.8%
	FR	17	4.1%	6	4.1%	23	4.1%
	GE	8	1.9%	3	2.1%	11	2.0%
	GL	0	.0%	1	.7%	1	.2%
	GR	2	.5%	4	2.7%	6	1.1%
	JU	1	.2%	1	.7%	2	.4%
	LU	30	7.2%	11	7.5%	41	7.3%
	NE	0	.0%	1	.7%	1	.2%
	NW	2	.5%	0	.0%	2	.4%
	SG	15	3.6%	5	3.4%	20	3.6%
	SH	5	1.2%	1	.7%	6	1.1%
	SO	11	2.6%	6	4.1%	17	3.0%
	SZ	2	.5%	2	1.4%	4	.7%
	TG	5	1.2%	1	.7%	6	1.1%
	TI	34	8.2%	15	10.3%	49	8.7%
	VD	48	11.5%	12	8.2%	60	10.7%
	VS	30	7.2%	7	4.8%	37	6.6%
	ZG	5	1.2%	1	.7%	6	1.1%
	ZH	70	16.8%	27	18.5%	97	17.3%
	Total	416	100.0%	146	100.0%	562	100.0%
	Missing_	29		11		40	

0.9 75 % de la clientèle est de nationalité suisse. Le plus grand groupe d'étrangers est composé par les personnes de nationalité italienne (7 %). La proportion de la clientèle du Sud-est de l'Europe est de 6 %.

0.9 Nationalité 1 (vmec050/ 53/ 56)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Nationalité 1, alphabétique	Suisse	309	71.9%	125	84.5%	434	75.1%
	Albanie	6	1.4%	0	.0%	6	1.0%
	Allemagne	13	3.0%	1	.7%	14	2.4%
	Belgique	2	.5%	0	.0%	2	.3%
	Bosnie-Herzégovine	4	.9%	2	1.4%	6	1.0%
	Croatie	4	.9%	1	.7%	5	.9%
	Espagne	10	2.3%	1	.7%	11	1.9%
	France	5	1.2%	2	1.4%	7	1.2%
	Grande-Bretagne	1	.2%	0	.0%	1	.2%
	Italie	36	8.4%	2	1.4%	38	6.6%
	Kosovo	4	.9%	0	.0%	4	.7%
	Liechtenstein	2	.5%	1	.7%	3	.5%
	Macédoine (anc. rép. youg.)	1	.2%	0	.0%	1	.2%
	Maroc	1	.2%	0	.0%	1	.2%
	Pologne	0	.0%	1	.7%	1	.2%
	Portugal	10	2.3%	4	2.7%	14	2.4%
	Russie	0	.0%	2	1.4%	2	.3%
	Serbie-Monténégro	3	.7%	2	1.4%	5	.9%
	Slovaquie	1	.2%	0	.0%	1	.2%
	Tchéquie	0	.0%	1	.7%	1	.2%
	Tunisie	1	.2%	0	.0%	1	.2%
	Turquie	6	1.4%	0	.0%	6	1.0%
	autre	11	2.6%	3	2.0%	14	2.4%
	Total	430	100.0%	148	100.0%	578	100.0%
	Missing_	15		9		24	

0.10 Nationalité 1, catégorisée (vmec050/ 53/ 56)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Nationalité 1, catégorisée	Suisse	309	71.9%	125	84.5%	434	75.1%
	Union européenne	78	18.1%	12	8.1%	90	15.6%
	Autre	43	10.0%	11	7.4%	54	9.3%
Total	430	100.0%	148	100.0%	578	100.0%	
Missing_	15		9		24		

0.11 Degré d'urbanité (vmec030a)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
grands centres urbains Zurich, Bâle, Genève	57	13.8%	17	11.9%	74	13.3%
périphérie des trois grands centres urbains	33	8.0%	16	11.2%	49	8.8%
villes de moyenne importance	121	29.4%	34	23.8%	155	27.9%
petites villes	121	29.4%	51	35.7%	172	31.0%
campagne	80	19.4%	25	17.5%	105	18.9%
Total	412	100.0%	143	100.0%	555	100.0%
Missing_	33		14		47	

A CADRE DE LA PRISE EN CHARGE

A1 La majorité des personnes en traitement résidentiel (87 %) a déjà suivi un ou plusieurs traitements avant son admission de 2009.

A1 Traitements antérieurs (vmec050)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
non	59	13.9%	15	10.4%	74	13.0%
oui	365	86.1%	129	89.6%	494	87.0%
Total	424	100.0%	144	100.0%	568	100.0%
Missing_	21		13		34	

A2 73 % de la clientèle ayant déjà suivi un (ou plusieurs) traitement(s) ont déjà suivi une ou plusieurs cures de sevrage, 62 % ont suivi un traitement résidentiel, 55 % un traitement ambulatoire et 55 % aussi un programme de substitution.

A2 Types de traitements antérieurs, sous-groupe: traitements antérieurs oui (plusieurs réponses) (vmec060a - vmec060h)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
traitement avec prescription d'héroïne	réponses	18	2	20
	personnes %	4.9%	1.6%	4.1%
substitution (méthadone etc.)	réponses	204	67	271
	personnes %	55.9%	52.3%	55.0%
autre traitement médicamenteux	réponses	49	22	71
	personnes %	13.4%	17.2%	14.4%
prise en charge ambulatoire	réponses	197	74	271
	personnes %	54.0%	57.8%	55.0%
traitement résidentiel	réponses	231	74	305
	personnes %	63.3%	57.8%	61.9%
sevrage	réponses	271	91	362
	personnes %	74.2%	71.1%	73.4%
groupe d'entraide ou d'auto-support	réponses	37	9	46
	personnes %	10.1%	7.0%	9.3%
autre(s)	réponses	17	3	20
	personnes %	4.7%	2.3%	4.1%
Total	réponses	1024	342	1366
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	365	128	493
	personnes %	280.5%	267.2%	277.1%
Missing		0	1	1

A3 30 % des clients et clientes ont déjà entrepris plus de trois tentatives de sevrage avec suivi professionnel.

A3 Cure(s) de sevrage avec accompagnement professionnel (vzee010)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
jamais	87	20.8%	16	11.3%	103	18.4%
une fois	94	22.4%	45	31.7%	139	24.8%
deux ou trois fois	106	25.3%	46	32.4%	152	27.1%
plus de trois fois	132	31.5%	35	24.6%	167	29.8%
Total	419	100.0%	142	100.0%	561	100.0%
Missing_	26		15		41	

A4 62 % de la clientèle est passée d'une cure de sevrage au traitement résidentiel actuel.

A4 Transfert d'une cure de sevrage (vzee050)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
non	177	41.2%	44	30.3%	221	38.4%
oui, même inst.	23	5.3%	15	10.3%	38	6.6%
oui, autre inst.	230	53.5%	86	59.3%	316	55.0%
Total	430	100.0%	145	100.0%	575	100.0%
Missing_	15		12		27	

A5 35 % des clients et clientes (31 % l'année précédente) suivent encore un programme de substitution parallèlement au moment où ils entament le traitement résidentiel.

A6 Le produit de substitution principal est la méthadone (84 %).

A5 Actuellement dans un programme de substitution ou de prescription d'héroïne (vmeb070)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
non	286	66.7%	90	61.2%	376	65.3%
oui	143	33.3%	57	38.8%	200	34.7%
Total	429	100.0%	147	100.0%	576	100.0%
Missing_	16		10		26	

A6 Quel programme de substitution ou prescription d'héroïne (vmeb075)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
méthadone	120	83.9%	47	83.9%	167	83.9%
autres opiacés	23	16.1%	9	16.1%	32	16.1%
Total	143	100.0%	56	100.0%	199	100.0%
Missing_	0		1		1	

A7 43 % de la clientèle indiquent avoir engagé le traitement principalement de leur propre initiative. Pour 16 %, c'est une mesure pénale ou administrative qui a déterminé le début du traitement, et pour 10 % une institution ambulatoire spécialisée dans l'addiction.

A7 Contribution à l'admission par... (vmeb080)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
initiative personnelle	195	45.2%	54	37.0%	249	43.2%
partenaire	9	2.1%	7	4.8%	16	2.8%
famille	30	7.0%	9	6.2%	39	6.8%
ami-e-s	8	1.9%	5	3.4%	13	2.3%
inst. ambulatoire	38	8.8%	17	11.6%	55	9.5%
inst. résidentielle	19	4.4%	3	2.1%	22	3.8%
cabinet médical	3	.7%	3	2.1%	6	1.0%
clinique	25	5.8%	14	9.6%	39	6.8%
services soc.	20	4.6%	14	9.6%	34	5.9%
condamnation, mesure	78	18.1%	16	11.0%	94	16.3%
employeur	1	.2%	1	.7%	2	.3%
autre	5	1.2%	3	2.1%	8	1.4%
Total	431	100.0%	146	100.0%	577	100.0%
Missing_	14		11		25	

B DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

B1 23 % des clients habitaient seuls les 30 jours précédant le début du traitement et 17 % logeaient chez leurs parents ou chez l'un des deux. Une proportion de 12 % étaient en détention, préventive ou non.

B2 Au cours des 6 mois précédant le début de la thérapie, 35 % des clients et clientes vivaient seuls ; 15 % logeaient chez leurs parents ou chez l'un des deux et 11 % avec leur partenaire (sans enfants).

B1 Ménage avec qui (principalement, 30 jours) (vmec060)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
seul-e en ménage	101	23.9%	28	18.7%	129	22.6%
avec parent(s)	74	17.5%	25	16.7%	99	17.3%
avec enfant(s), sans partenaire	1	.2%	4	2.7%	5	.9%
avec partenaire, sans enfant(s)	34	8.1%	21	14.0%	55	9.6%
avec partenaire et enfant(s)	17	4.0%	6	4.0%	23	4.0%
avec d'autres proches	9	2.1%	3	2.0%	12	2.1%
avec ami-e-s (colocation)	29	6.9%	13	8.7%	42	7.3%
autre: sevrage	7	1.7%	2	1.3%	9	1.6%
autre: clinique psychiatrique	9	2.1%	3	2.0%	12	2.1%
autre: détention préventive, emprisonnement	55	13.0%	13	8.7%	68	11.9%
autre: traitement résidentiel	5	1.2%	2	1.3%	7	1.2%
autre: foyer, logement accompagné	20	4.7%	6	4.0%	26	4.5%
autre: hôpital	7	1.7%	4	2.7%	11	1.9%
autre: clinique div.	14	3.3%	10	6.7%	24	4.2%
autre: institution div.	30	7.1%	7	4.7%	37	6.5%
autre: hébergement d'urgence	6	1.4%	1	.7%	7	1.2%
autre: pas clair	4	.9%	2	1.3%	6	1.0%
Total	422	100.0%	150	100.0%	572	100.0%
Missing_	23		7		30	

B2 Ménage avec qui (principalement, 6 mois) (vmec065)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
seul-e en ménage	163	38.3%	37	25.3%	200	35.0%
avec parent(s)	68	16.0%	19	13.0%	87	15.2%
avec enfant(s), sans partenaire	2	.5%	5	3.4%	7	1.2%
avec partenaire, sans enfant(s)	35	8.2%	28	19.2%	63	11.0%
avec partenaire et enfant(s)	18	4.2%	11	7.5%	29	5.1%
avec d'autres proches	6	1.4%	5	3.4%	11	1.9%
avec ami-e-s (colocation)	29	6.8%	15	10.3%	44	7.7%
autre: clinique psychiatrique	2	.5%	0	.0%	2	.3%
autre: détention préventive, emprisonnement	33	7.7%	9	6.2%	42	7.3%
autre: traitement résidentiel	13	3.1%	5	3.4%	18	3.1%
autre: foyer, logement accompagné	17	4.0%	4	2.7%	21	3.7%
autre: hôpital	3	.7%	0	.0%	3	.5%
autre: clinique div.	2	.5%	1	.7%	3	.5%
autre: institution div.	16	3.8%	3	2.1%	19	3.3%
autre: hébergement d'urgence	9	2.1%	0	.0%	9	1.6%
autre: pas clair	10	2.3%	4	2.7%	14	2.4%
Total	426	100.0%	146	100.0%	572	100.0%
Missing_	19		11		30	

B3 Au cours des 30 jours précédant le début du traitement, 51 % des clients avaient un logement stable, 15 % connaissaient une situation instable (accueil d'urgence) et 34 % vivaient en institution.

B4 Au cours des 6 mois précédant le début du traitement, 60 % des clients avaient un logement stable, 17 % une situation instable et 24 % vivaient en institution.

B3 Type de domicile (30 jours) (vmec070)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
domicile fixe	218	50.9%	78	52.3%	296	51.3%
sans domicile fixe	62	14.5%	23	15.4%	85	14.7%
institution	148	34.6%	48	32.2%	196	34.0%
Total	428	100.0%	149	100.0%	577	100.0%
Missing_	17		8		25	

B4 Type de domicile (6 mois) (vmec075)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
domicile fixe	255	59.7%	88	61.1%	343	60.1%
sans domicile fixe	68	15.9%	26	18.1%	94	16.5%
institution	104	24.4%	30	20.8%	134	23.5%
Total	427	100.0%	144	100.0%	571	100.0%
Missing_	18		13		31	

Relations

.....

B5 43 % des clients n'étaient pas en couple les 6 mois précédant le début du traitement. La proportion de femmes seules (31 %) durant cette période est significativement plus basse que celle des hommes (47 % ; Cr's V=.15; $p < .001$).

B6 Parmi les personnes ayant une relation stable, 52 % indiquent que leur partenaire a également connu des problèmes d'addiction au cours des 6 mois précédant le début de leur traitement. Le (ou la) partenaire d'une femme vivant en couple est significativement plus souvent lui-même dépendant d'une drogue (77 %) que celle (ou celui) d'un homme (38 %; Cr's V = .38; $p < .000$).

B5 Type de relation de couple (6 mois) (vzes010)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
sans partenaire	201	47.4%	44	30.8%	245	43.2%
relation(s) temporaire(s)	97	22.9%	28	19.6%	125	22.0%
partenaire fixe en vivant séparé-e	72	17.0%	34	23.8%	106	18.7%
partenaire fixe en ménage commun	54	12.7%	37	25.9%	91	16.0%
Total	424	100.0%	143	100.0%	567	100.0%
Missing_	21		14		35	

B6 Problèmes de dépendance du partenaire, sous-groupe: partenaire fixe (vzes015)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
non	70	62.5%	15	23.4%	85	48.3%
oui	42	37.5%	49	76.6%	91	51.7%
Total	112	100.0%	64	100.0%	176	100.0%
Missing_	14		7		21	

B7 27 % des clients et clientes ont des enfants.

B7 Enfants (vzes031)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
enfant(s)	105	23.6%	56	35.7%	161	26.7%
aucun enfant	340	76.4%	101	64.3%	441	73.3%
Total	445	100.0%	157	100.0%	602	100.0%
Missing_	0		0		0	

B8 Nombre d'enfants, sous-groupe: oui, enfant(s) (vzes030)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
1 enfant	59	67.0%	30	58.8%	89	64.0%
2 enfants	26	29.5%	18	35.3%	44	31.7%
3 enfants ou plus	3	3.4%	3	5.9%	6	4.3%
Total	88	100.0%	51	100.0%	139	100.0%
Missing_	17		5		22	

Formation

.....

B9 42 % des clients et clientes ont terminé un apprentissage, 30 % n'ont terminé que l'école obligatoire.

B9 Formation achevée (vmec120a - vmec120j)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
aucune formation achev.	50	12.1%	23	15.9%	73	13.1%
scolarité obligat.	119	28.7%	46	31.7%	165	29.5%
scolarité complément.	25	6.0%	12	8.3%	37	6.6%
apprentissage/ école prof.	184	44.4%	49	33.8%	233	41.7%
lycée, école prép. maturité	11	2.7%	10	6.9%	21	3.8%
formation prof. supérieure	10	2.4%	2	1.4%	12	2.1%
école prof. supérieure	4	1.0%	3	2.1%	7	1.3%
haute école spécialisée	1	.2%	0	.0%	1	.2%
université, haute école	10	2.4%	0	.0%	10	1.8%
Total	414	100.0%	145	100.0%	559	100.0%
Missing_	31		12		43	

B10 Formation au moment de l'admission (vmec125)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
aucune formation en cours	394	96.6%	139	95.9%	533	96.4%
scolarité obligat.	3	.7%	1	.7%	4	.7%
scolarité complémt.	2	.5%	0	.0%	2	.4%
apprentissage/ école prof.	5	1.2%	3	2.1%	8	1.4%
lycée, école prép. maturité	1	.2%	1	.7%	2	.4%
école prof. supérieure	1	.2%	0	.0%	1	.2%
université, haute école	2	.5%	1	.7%	3	.5%
Total	408	100.0%	145	100.0%	553	100.0%
Missing_	37		12		49	

Sources de revenu

B11 L'aide sociale était la source principale de revenu de 50 % des clients et clientes au cours des 30 jours précédant le début du traitement. Pour 12 %, le revenu principal provenait d'une activité lucrative et pour 11 % d'une rente.

B11 Principale source de revenu (30 jours) (vmec080)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
salaire	51	12.4%	14	9.5%	65	11.7%
économies	8	2.0%	1	.7%	9	1.6%
rente (AVS, AI, autres)	42	10.2%	21	14.3%	63	11.3%
aide sociale	203	49.5%	76	51.7%	279	50.1%
assurance-chômage	24	5.9%	3	2.0%	27	4.8%
soutien partenaire	2	.5%	4	2.7%	6	1.1%
soutien parents/ ami-e-s	17	4.1%	9	6.1%	26	4.7%
deal, combines	28	6.8%	10	6.8%	38	6.8%
autres revenus illégaux	5	1.2%	3	2.0%	8	1.4%
prostitution	1	.2%	1	.7%	2	.4%
autre: détention préventive, emprisonnement	8	2.0%	0	.0%	8	1.4%
autre: justice	13	3.2%	2	1.4%	15	2.7%
autre: indemnités journalières de maladie	3	.7%	0	.0%	3	.5%
autre: div.	5	1.2%	3	2.0%	8	1.4%
Total	410	100.0%	147	100.0%	557	100.0%
Missing_	35		10		45	

B12 Autres sources de revenu (30 jours) (plusieurs réponses) (vmec085a - vmec085k)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
salaire	réponses	15	5	20
	personnes %	8.7%	8.1%	8.5%
économies	réponses	16	1	17
	personnes %	9.2%	1.6%	7.2%
rente (AVS, AI, autres)	réponses	2	1	3
	personnes %	1.2%	1.6%	1.3%
aide sociale	réponses	16	9	25
	personnes %	9.2%	14.5%	10.6%
assurance-chômage	réponses	11	3	14
	personnes %	6.4%	4.8%	6.0%
soutien partenaire	réponses	12	10	22
	personnes %	6.9%	16.1%	9.4%
soutien parents/ ami-e-s	réponses	55	19	74
	personnes %	31.8%	30.6%	31.5%
deal, combines	réponses	68	21	89
	personnes %	39.3%	33.9%	37.9%
autres revenus illégaux	réponses	36	6	42
	personnes %	20.8%	9.7%	17.9%
prostitution	réponses	1	6	7
	personnes %	.6%	9.7%	3.0%
autre	réponses	8	4	12
	personnes %	4.6%	6.5%	5.1%
Total	réponses	240	85	325
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
Total	nombre de personnes	173	62	235
	personnes %	138.7%	137.1%	138.3%
Missing		272	95	367

B13 Pour 45 % de la clientèle, la source principale de revenu au cours des 6 mois précédant l'admission était l'aide sociale, pour 21 % une activité lucrative et pour 10 % une rente.

B13 Principale source de revenu (6 mois) (vmec090)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
salaire	91	22.1%	27	18.9%	118	21.3%
économies	2	.5%	0	.0%	2	.4%
rente (AVS, AI, autres)	37	9.0%	19	13.3%	56	10.1%
aide sociale	188	45.7%	63	44.1%	251	45.3%
assurance-chômage	20	4.9%	3	2.1%	23	4.2%
soutien partenaire	1	.2%	6	4.2%	7	1.3%
soutien parents/ ami-e-s	12	2.9%	7	4.9%	19	3.4%
deal, combines	31	7.5%	13	9.1%	44	7.9%
autres revenus illégaux	6	1.5%	2	1.4%	8	1.4%
prostitution	1	.2%	1	.7%	2	.4%
autre: détention préventive, emprisonnement	8	1.9%	1	.7%	9	1.6%
autre: justice	8	1.9%	1	.7%	9	1.6%
autre: div.	6	1.5%	0	.0%	6	1.1%
Total	411	100.0%	143	100.0%	554	100.0%
Missing_	34		14		48	

B14 Autres sources de revenu (6 mois) (plusieurs réponses) (vmec095a - vmec095k)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
salaire	réponses	24	3	27
	personnes %	12.6%	4.5%	10.5%
économies	réponses	12	1	13
	personnes %	6.3%	1.5%	5.1%
rente (AVS, AI, autres)	réponses	1	3	4
	personnes %	.5%	4.5%	1.6%
aide sociale	réponses	28	9	37
	personnes %	14.7%	13.6%	14.5%
assurance-chômage	réponses	16	2	18
	personnes %	8.4%	3.0%	7.0%
soutien partenaire	réponses	14	8	22
	personnes %	7.4%	12.1%	8.6%
soutien parents/ ami-e-s	réponses	55	18	73
	personnes %	28.9%	27.3%	28.5%
deal, combines	réponses	79	27	106
	personnes %	41.6%	40.9%	41.4%
autres revenus illégaux	réponses	39	18	57
	personnes %	20.5%	27.3%	22.3%
prostitution	réponses	3	8	11
	personnes %	1.6%	12.1%	4.3%
autre	réponses	7	1	8
	personnes %	3.7%	1.5%	3.1%
Total	réponses	278	98	376
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	190	66	256
	personnes %	146.3%	148.5%	146.9%
Missing		255	91	346

Activité rémunératrice

.....

B15 Pendant les 30 jours précédant l'admission, 55 % des personnes n'avaient pas d'activité professionnelle (rente, AI, etc.) ; 18% étaient sans activité mais en recherche d'emploi et 17 % travaillaient (temps partiel, temps plein ou emplois occasionnels).

B16 Au cours des 6 mois précédant leur admission, 44 % des clients et clientes n'avaient pas d'activité professionnelle, 16 % étaient en recherche d'emploi et 31 % avaient une activité professionnelle (plein temps, temps partiel ou emplois occasionnels).

B15 Activité rémunératrice (30 jours) (vmec100)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
à plein temps	46	11.5%	8	5.8%	54	10.0%
à temps partiel	17	4.3%	3	2.2%	20	3.7%
plusieurs activités professionnelles	9	2.3%	7	5.0%	16	3.0%
en formation	7	1.8%	8	5.8%	15	2.8%
sans activité professionnelle	207	51.9%	87	62.6%	294	54.6%
sans travail, en quête d'emploi	78	19.5%	17	12.2%	95	17.7%
autre: détention préventive, emprisonnement	12	3.0%	2	1.4%	14	2.6%
autre: clinique, institution	5	1.3%	4	2.9%	9	1.7%
autre: aide sociale	3	.8%	0	.0%	3	.6%
autre: div.	15	3.8%	3	2.2%	18	3.3%
Total	399	100.0%	139	100.0%	538	100.0%
Missing_	46		18		64	

B16 Activité rémunératrice (6 mois) (vmec110)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
à plein temps	88	22.2%	16	11.7%	104	19.5%
à temps partiel	22	5.6%	8	5.8%	30	5.6%
plusieurs activités professionnelles	23	5.8%	7	5.1%	30	5.6%
en formation	13	3.3%	10	7.3%	23	4.3%
sans activité professionnelle	160	40.4%	76	55.5%	236	44.3%
sans travail, en quête d'emploi	70	17.7%	13	9.5%	83	15.6%
sans travail, futur emploi garanti	1	.3%	1	.7%	2	.4%
autre: détention préventive, emprisonnement	9	2.3%	2	1.5%	11	2.1%
autre: clinique, institution	3	.8%	2	1.5%	5	.9%
autre: aide sociale	2	.5%	0	.0%	2	.4%
autre: div.	5	1.3%	2	1.5%	7	1.3%
Total	396	100.0%	137	100.0%	533	100.0%
Missing_	49		20		69	

Dettes

.....

B17 23 % des clients et clientes ne sont pas endettés au début du traitement ; 33 % ont des dettes égales ou supérieures à 25 000 francs.

B17 Dettes au moment de l'admission (vzef040)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
aucune dette	74	19.9%	37	30.3%	111	22.5%
jusqu'à 5000 sfr.	39	10.5%	27	22.1%	66	13.4%
5001 à 10 000 sfr.	44	11.8%	17	13.9%	61	12.3%
10 001 à 25 000 sfr.	71	19.1%	20	16.4%	91	18.4%
25 001 à 50 000 sfr.	68	18.3%	15	12.3%	83	16.8%
50 001 à 100 000 sfr	49	13.2%	5	4.1%	54	10.9%
plus de 100 000 sfr.	27	7.3%	1	.8%	28	5.7%
Total	372	100.0%	122	100.0%	494	100.0%
Missing_	73		35		108	

Condamnations et mesures

B18 72 % de la clientèle a déjà fait l'objet d'une condamnation. La proportion de femmes à déjà avoir fait l'objet d'une condamnation (55 %) est significativement plus basse que celle des hommes (78 % ; Cr's V=.22; p <.000).

B18 Aucune condamnation (vzer010y)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
condamnation	330	77.6%	80	54.8%	410	71.8%
aucune condamnation	95	22.4%	66	45.2%	161	28.2%
Total	425	100.0%	146	100.0%	571	100.0%
Missing_	20		11		31	

B19 72 % des clients et clientes condamnés l'ont été pour des infractions liées aux stupéfiants. Cette catégorie comprend la production, la possession, la diffusion, l'importation et l'exportation de drogues. 52 % de la clientèle a été condamnée pour des délits commis dans le but de se procurer des stupéfiants, tels que le vol, le recel, la falsification d'ordonnance, la fraude ou encore le brigandage. 45 % a été condamnée pour des infractions commises sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments (p. ex. infractions routières, dommages corporels). Il est possible de donner plusieurs réponses à cette question.

B19 Condamnation pénale pour..., sous-groupe: déjà été condamné-e (plusieurs réponses) (vzer010a - vzer010e)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
suspension de la procédure au profit de mesures	réponses	21	8	29
	personnes %	6.6%	10.5%	7.4%
infraction à la loi sur les stupéfiants	réponses	237	47	284
	personnes %	74.5%	61.8%	72.1%
infract. ds le but de se proc. des dro.	réponses	167	36	203
	personnes %	52.5%	47.4%	51.5%
infractions sous influence de subst.	réponses	160	19	179
	personnes %	50.3%	25.0%	45.4%
autre(s) délit(s)	réponses	80	9	89
	personnes %	25.2%	11.8%	22.6%
Total	réponses	665	119	784
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	318	76	394
	personnes %	209.1%	156.6%	199.0%
Missing		12	4	16

B20 65 % des clients et clientes ont déjà été en prison et/ou en détention préventive. Les femmes (55 %) étaient significativement plus nombreuses que les hommes (29 %) à n'avoir jamais été détenues (Cr's V=.28; p<.000).

B21 32 % des personnes sont restées plus de 12 mois en détention. Les hommes sont également plus représentés dans cette situation.

B20 Prison ou détention préventive (vzer020)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
oui, emprisonnement	61	14.6%	12	8.7%	73	13.2%
oui, détention prév.	99	23.7%	36	26.1%	135	24.3%
oui, emprisonnem. et dét. prév.	138	33.1%	14	10.1%	152	27.4%
non, jamais	119	28.5%	76	55.1%	195	35.1%
Total	417	100.0%	138	100.0%	555	100.0%
Missing_	28		19		47	

B21 Durée du séjour en prison/détention préventive, sous-groupe: déjà en prison/détention (vzer030)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 1 mois	24	9.1%	6	12.8%	30	9.7%
1 à 2 mois	50	19.0%	12	25.5%	62	20.0%
plus de 2 jusqu'à 6 mois	56	21.3%	14	29.8%	70	22.6%
plus de 6 jusqu'à 12 mois	42	16.0%	7	14.9%	49	15.8%
plus de 12 mois	91	34.6%	8	17.0%	99	31.9%
Total	263	100.0%	47	100.0%	310	100.0%
Missing_	35		15		50	

B22 Pour 38 % des clients et clientes, une mesure pénale ou administrative est à l'origine du traitement.

B22 Mesures (vzer040y)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
oui, mesure	168	38.2%	53	35.3%	221	37.5%
aucune mesure	272	61.8%	97	64.7%	369	62.5%
Total	440	100.0%	150	100.0%	590	100.0%
Missing_	5		7		12	

B23 Pour 49 % des clients admis en raison d'une mesure, le statut légal du traitement est le "traitement des personnes dépendantes de l'alcool ou des drogues " en vertu de l'art. 44 du CP (appelé " traitement pers. dépendantes " dans le tableau). Pour 9 %, la mesure a lieu dans une maison d'éducation au travail. Il est possible de donner plusieurs réponses à cette question.

B23 Statut légal du traitement, sous-groupe: mesures (plusieurs réponses) (vzer040a - vzer040h)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
susp. de la procédure, renoncement à infliger une peine, réprimande	réponses	4	4	8
	personnes %	2.7%	9.1%	4.2%
abandon de la poursuite pénale	réponses	1	1	2
	personnes %	.7%	2.3%	1.0%
mesures conc. délinq. anorm.	réponses	9	1	10
	personnes %	6.1%	2.3%	5.2%
traitement pers. dépendantes	réponses	80	14	94
	personnes %	54.1%	31.8%	49.0%
irresponsabilité	réponses	1	0	1
	personnes %	.7%	.0%	.5%
responsabilité restreinte	réponses	3	1	4
	personnes %	2.0%	2.3%	2.1%
maison d` éducation au travail	réponses	13	5	18
	personnes %	8.8%	11.4%	9.4%
autre: priv. liberté à fins d'ass.	réponses	2	1	3
	personnes %	1.4%	2.3%	1.6%
autre: en attente du procès	réponses	1	0	1
	personnes %	.7%	.0%	.5%
autre: début antic. (peine ou mes.)	réponses	2	4	6
	personnes %	1.4%	9.1%	3.1%
autre: tribunal des mineurs	réponses	8	3	11
	personnes %	5.4%	6.8%	5.7%
autre: mesure selon art. 60	réponses	7	3	10
	personnes %	4.7%	6.8%	5.2%
autre: div.	réponses	26	10	36
	personnes %	17.6%	22.7%	18.8%
Total	réponses	157	47	204
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
Missing	nombre de personnes	148	44	192
	personnes %	106.1%	106.8%	106.3%
Missing		20	9	29

C CONSOMMATIONS, DÉPENDANCES ET COMPORTEMENTS ASSIMILABLES À UNE ADDICTION

C1 Problème principal: substance ou comportement comparable à une dépendance (vmed005)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
substance	430	99.3%	153	98.1%	583	99.0%
comportem. comp. dép.	3	.7%	3	1.9%	6	1.0%
Total	433	100.0%	156	100.0%	589	100.0%
Missing	12		1		13	

C2 En ce qui concerne la clientèle en traitement pour un problème lié à une substance, le problème principal au moment de l'admission est, pour 37 %, l'héroïne ; pour 22 % il s'agit de la cocaïne, pour 12 % l'alcool et pour 10 % les cocktails.

C2 Principale substance posant problème, liste détaillée (vmed010)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
alcool	45	10.6%	24	15.9%	69	12.0%
cocktails	44	10.3%	16	10.6%	60	10.4%
héroïne	154	36.2%	59	39.1%	213	36.9%
méthadone	10	2.3%	1	.7%	11	1.9%
autres opiacés	2	.5%	0	.0%	2	.3%
cocaïne	94	22.1%	30	19.9%	124	21.5%
crack	6	1.4%	4	2.6%	10	1.7%
amphétamines	7	1.6%	3	2.0%	10	1.7%
MDMA, ecstasy	3	.7%	1	.7%	4	.7%
benzodiazépines	11	2.6%	8	5.3%	19	3.3%
LSD	2	.5%	0	.0%	2	.3%
cannabis	46	10.8%	4	2.6%	50	8.7%
tabac	1	.2%	0	.0%	1	.2%
autres substances	1	.2%	1	.7%	2	.3%
Total	426	100.0%	151	100.0%	577	100.0%
Missing	4		2		6	

C3 Conformément aux principes d'act-info, les substances sont réparties par groupes. Tous les tableaux qui suivent, relatifs à la fréquence de consommation, à l'âge de la première consommation, etc. sont basés sur ces groupes de substances. Pour 39 % des personnes, la substance posant le plus problème est un opiacé (héroïne, méthadone, morphine, codéine, etc.) ; 23 % nomment la cocaïne (crack et freebase compris), 12 % citent l'alcool et 10 % les cocktails.

C3 Principale substance posant problème, catégorisée selon les conventions act-info (vmed010)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
alcool	45	10.6%	24	15.9%	69	12.0%
opiacés	166	39.0%	60	39.7%	226	39.2%
cocktails	44	10.3%	16	10.6%	60	10.4%
cocaïne	100	23.5%	34	22.5%	134	23.2%
stimulants	10	2.3%	4	2.6%	14	2.4%
médicaments	11	2.6%	8	5.3%	19	3.3%
hallucinogènes	2	.5%	0	.0%	2	.3%
cannabis	46	10.8%	4	2.6%	50	8.7%
tabac	1	.2%	0	.0%	1	.2%
autres substances	1	.2%	1	.7%	2	.3%
Total	426	100.0%	151	100.0%	577	100.0%
Missing	4		2		6	

C4a Addiction: problème principal selon des catégories d'âge à l'entrée, sans valeurs missing d'âge (vmed010, vmec020)

	jusqu'à 19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-39 ans		40 ans et plus		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
alcool	8	18.2%	11	11.8%	10	8.8%	24	10.7%	16	16.0%	69	12.0%
opiacés	8	18.2%	37	39.8%	43	38.1%	91	40.4%	46	46.0%	225	39.1%
cocktails	0	.0%	4	4.3%	15	13.3%	29	12.9%	12	12.0%	60	10.4%
cocaïne	9	20.5%	18	19.4%	35	31.0%	52	23.1%	19	19.0%	133	23.1%
stimulants	2	4.5%	5	5.4%	2	1.8%	5	2.2%	0	.0%	14	2.4%
médicaments	0	.0%	2	2.2%	1	.9%	12	5.3%	4	4.0%	19	3.3%
hallucinogènes	0	.0%	1	1.1%	0	.0%	1	.4%	0	.0%	2	.3%
cannabis	17	38.6%	15	16.1%	6	5.3%	11	4.9%	1	1.0%	50	8.7%
tabac	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.0%	1	.2%
autres substances	0	.0%	0	.0%	1	.9%	0	.0%	1	1.0%	2	.3%
Total	44	100.0%	93	100.0%	113	100.0%	225	100.0%	100	100.0%	575	100.0%
Missing	2		2		0		1		1		6	

C4b Statistique: problème principal selon des catégories d'âge à l'entrée (vmed010, vmec020)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	valid cases
alcool	31.30	23.00	31.00	38.50	9.27	69
opiacés	32.10	25.00	33.00	38.00	7.66	225
cocktails	32.73	27.00	32.00	36.75	6.71	60
cocaïne	30.78	25.50	30.00	37.00	7.26	133
stimulants	25.79	22.25	25.00	31.25	5.74	14
médicaments	35.05	31.00	36.00	39.00	6.72	19
hallucinogènes	27.00	23.00	27.00	.	5.66	2
cannabis	23.64	18.00	22.00	28.50	6.57	50
tabac	40.00	40.00	40.00	40.00	.	1
autres substances	41.00	27.00	41.00	.	19.80	2
Total	31.00	25.00	31.00	37.00	7.98	575

Fréquence de la consommation

C5 Fréquence de consommation (30 jours), sous-groupe: problème principal ALCOOL (vmed010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jamais	8	18.6%	6	26.1%	14	21.2%
1 jour par sem. ou moins	3	7.0%	4	17.4%	7	10.6%
2-3 jours par sem.	3	7.0%	1	4.3%	4	6.1%
4-6 jours par sem.	4	9.3%	2	8.7%	6	9.1%
1 fois par jour	3	7.0%	2	8.7%	5	7.6%
plus. fois par jour	22	51.2%	8	34.8%	30	45.5%
Total	43	100.0%	23	100.0%	66	100.0%
Missing_	2		1		3	

C6 Fréquence de consommation (30 jours), sous-groupe: problème principal COCKTAILS (vmed010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jamais	16	36.4%	2	14.3%	18	31.0%
1 jour par sem. ou moins	1	2.3%	2	14.3%	3	5.2%
2-3 jours par sem.	4	9.1%	2	14.3%	6	10.3%
4-6 jours par sem.	1	2.3%	1	7.1%	2	3.4%
1 fois par jour	4	9.1%	1	7.1%	5	8.6%
plus. fois par jour	18	40.9%	6	42.9%	24	41.4%
Total	44	100.0%	14	100.0%	58	100.0%
Missing_	0		2		2	

C7 Fréquence de consommation (30 jours), sous-groupe: problème principal OPIACÉS (héroïne, méthadone, morphine, autres) (vmed010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jamais	33	21.2%	10	17.9%	43	20.3%
1 jour par sem. ou moins	12	7.7%	13	23.2%	25	11.8%
2-3 jours par sem.	14	9.0%	6	10.7%	20	9.4%
4-6 jours par sem.	12	7.7%	1	1.8%	13	6.1%
1 fois par jour	20	12.8%	4	7.1%	24	11.3%
plus. fois par jour	65	41.7%	22	39.3%	87	41.0%
Total	156	100.0%	56	100.0%	212	100.0%
Missing_	10		4		14	

C8 Fréquence de consommation (30 jours), sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vmed010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jamais	36	36.4%	10	30.3%	46	34.8%
1 jour par sem. ou moins	12	12.1%	2	6.1%	14	10.6%
2-3 jours par sem.	16	16.2%	2	6.1%	18	13.6%
4-6 jours par sem.	7	7.1%	3	9.1%	10	7.6%
1 fois par jour	3	3.0%	3	9.1%	6	4.5%
plus. fois par jour	25	25.3%	13	39.4%	38	28.8%
Total	99	100.0%	33	100.0%	132	100.0%
Missing_	1		1		2	

C11 Fréquence de consommation (30 jours), sous-groupe problème principal CANNABIS (vmed010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jamais	4	9.3%	0	.0%	4	8.7%
1 jour par sem. ou moins	3	7.0%	0	.0%	3	6.5%
2-3 jours par sem.	2	4.7%	0	.0%	2	4.3%
4-6 jours par sem.	2	4.7%	2	66.7%	4	8.7%
1 fois par jour	5	11.6%	0	.0%	5	10.9%
plus. fois par jour	27	62.8%	1	33.3%	28	60.9%
Total	43	100.0%	3	100.0%	46	100.0%
Missing_	3		1		4	

C12 Fréquence de consommation (6 mois), sous-groupe: problème principal ALCOOL (vmed010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jamais	2	4.9%	2	8.3%	4	6.2%
1 jour par sem. ou moins	4	9.8%	2	8.3%	6	9.2%
2-3 jours par sem.	6	14.6%	8	33.3%	14	21.5%
4-6 jours par sem.	5	12.2%	3	12.5%	8	12.3%
1 fois par jour	1	2.4%	2	8.3%	3	4.6%
plus. fois par jour	23	56.1%	7	29.2%	30	46.2%
Total	41	100.0%	24	100.0%	65	100.0%
Missing_	4		0		4	

C13 Fréquence de consommation (6 mois), sous-groupe: problème principal COCKTAILS (vmed010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jamais	10	22.7%	1	7.7%	11	19.3%
1 jour par sem. ou moins	2	4.5%	2	15.4%	4	7.0%
2-3 jours par sem.	1	2.3%	1	7.7%	2	3.5%
4-6 jours par sem.	2	4.5%	1	7.7%	3	5.3%
1 fois par jour	5	11.4%	1	7.7%	6	10.5%
plus. fois par jour	24	54.5%	7	53.8%	31	54.4%
Total	44	100.0%	13	100.0%	57	100.0%
Missing_	0		3		3	

C14 Fréquence de consommation (6 mois), sous-groupe: problème principal OPIACÉS (héroïne, méthadone, morphine, autres) (vmed010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jamais	15	9.6%	2	3.4%	17	7.9%
1 jour par sem. ou moins	8	5.1%	5	8.6%	13	6.1%
2-3 jours par sem.	16	10.3%	6	10.3%	22	10.3%
4-6 jours par sem.	13	8.3%	2	3.4%	15	7.0%
1 fois par jour	31	19.9%	8	13.8%	39	18.2%
plus. fois par jour	73	46.8%	35	60.3%	108	50.5%
Total	156	100.0%	58	100.0%	214	100.0%
Missing_	10		2		12	

C15 Fréquence de consommation (6 mois), sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vmed010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jamais	14	14.3%	4	12.5%	18	13.8%
1 jour par sem. ou moins	12	12.2%	2	6.3%	14	10.8%
2-3 jours par sem.	20	20.4%	3	9.4%	23	17.7%
4-6 jours par sem.	10	10.2%	4	12.5%	14	10.8%
1 fois par jour	9	9.2%	3	9.4%	12	9.2%
plus. fois par jour	33	33.7%	16	50.0%	49	37.7%
Total	98	100.0%	32	100.0%	130	100.0%
Missing_	2		2		4	

C18 Fréquence de consommation (6 mois), sous-groupe: problème principal CANNABIS (vmed010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
1 jour par sem. ou moins	1	2.4%	0	.0%	1	2.2%
4-6 jours par sem.	2	4.8%	0	.0%	2	4.4%
1 fois par jour	4	9.5%	0	.0%	4	8.9%
plus. fois par jour	35	83.3%	3	100.0%	38	84.4%
Total	42	100.0%	3	100.0%	45	100.0%
Missing_	4		1		5	

Mode d'administration**C19 Mode d'administration (6 mois), sous-groupe: problème principal COCKTAILS (vmed010)**

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
pas de consomm. (6 mois)	9	20.9%	1	7.1%	10	17.5%
injection	18	41.9%	11	78.6%	29	50.9%
fumée/ inhalation	10	23.3%	1	7.1%	11	19.3%
sniff	6	14.0%	1	7.1%	7	12.3%
Total	43	100.0%	14	100.0%	57	100.0%
Missing_	1		2		3	

C20 Mode d'administration (6 mois), sous-groupe: problème principal OPIACÉS (héroïne, méthadone, morphine, autres) (vmed010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
pas de consomm. (6 mois)	15	9.5%	2	3.5%	17	7.9%
injection	46	29.1%	16	28.1%	62	28.8%
fumée/ inhalation	60	38.0%	26	45.6%	86	40.0%
manger/ boire	8	5.1%	1	1.8%	9	4.2%
sniff	28	17.7%	12	21.1%	40	18.6%
autre	1	.6%	0	.0%	1	.5%
Total	158	100.0%	57	100.0%	215	100.0%
Missing_	8		3		11	

C21 Mode d'administration (6 mois), sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vmed010)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
pas de consomm. (6 mois)	11	11.5%	2	6.5%	13	10.2%
injection	27	28.1%	6	19.4%	33	26.0%
fumée/ inhalation	20	20.8%	10	32.3%	30	23.6%
sniff	38	39.6%	13	41.9%	51	40.2%
Total	96	100.0%	31	100.0%	127	100.0%
Missing_	4		3		7	

Âge première consommation

C22 Statistique: Âge première consommation de la principale substance posant problème: tous sans valeurs missing (vmed040)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases
hommes	18.49	15.00	17.00	21.00	5.56	399
femmes	18.72	15.00	17.00	20.00	5.77	138
Total	18.55	15.00	17.00	21.00	5.61	537

C23 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vmed010)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge première consommation (cat.)	moins de 15 ans	28	66.7%	12	60.0%	40	64.5%
	15-17 ans	12	28.6%	3	15.0%	15	24.2%
	18-20 ans	1	2.4%	4	20.0%	5	8.1%
	plus de 20 ans	1	2.4%	1	5.0%	2	3.2%
Total		42	100.0%	20	100.0%	62	100.0%
Missing_		3		4		7	

C24 Statistique: Âge première consommation, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vmed010 vmed040)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	13.76	12.00	13.00	16.00	3.93	42	45
femmes	15.35	13.00	14.00	17.50	3.20	20	24
Total	14.27	12.00	14.00	16.00	3.76	62	69

C25 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal COCKTAILS (vmed010)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge première consommation (cat.)	moins de 15 ans	4	9.5%	0	.0%	4	7.1%
	15-17 ans	14	33.3%	9	64.3%	23	41.1%
	18-20 ans	11	26.2%	5	35.7%	16	28.6%
	plus de 20 ans	13	31.0%	0	.0%	13	23.2%
Total		42	100.0%	14	100.0%	56	100.0%
Missing_		2		2		4	

C26 Statistique: Âge première consommation, sous-groupe: problème principal COCKTAILS (vmed010 vmed040)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	18.88	16.00	18.00	21.25	4.00	42	44
femmes	17.07	15.75	16.50	18.50	1.86	14	16
Total	18.43	16.00	18.00	20.00	3.65	56	60

C27 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal OPIACÉS (héroïne, méthadone, morphine, autres) (vmed010)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge première consommation (cat.)	moins de 15 ans	13	8.3%	7	12.7%	20	9.5%
	15-17 ans	51	32.7%	19	34.5%	70	33.2%
	18-20 ans	37	23.7%	16	29.1%	53	25.1%
	plus de 20 ans	55	35.3%	13	23.6%	68	32.2%
Total		156	100.0%	55	100.0%	211	100.0%
Missing_		10		5		15	

C28 Statistique: Âge première consommation, sous-groupe: problème principal OPIACÉS (héroïne, méthadone, morphine, autres) (vmed010 vmed040)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	19.94	16.00	18.00	22.75	5.13	156	166
femmes	18.69	16.00	18.00	20.00	4.33	55	60
Total	19.62	16.00	18.00	22.00	4.95	211	226

C29 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vmed010)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge première consommation (cat.)	moins de 15 ans	5	5.4%	6	18.2%	11	8.8%
	15-17 ans	35	38.0%	9	27.3%	44	35.2%
	18-20 ans	23	25.0%	10	30.3%	33	26.4%
	plus de 20 ans	29	31.5%	8	24.2%	37	29.6%
Total		92	100.0%	33	100.0%	125	100.0%
Missing_		8		1		9	

C30 Statistique: Âge première consommation, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vmed010 vmed040)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	19.37	16.00	18.00	21.00	4.68	92	100
femmes	19.36	15.00	18.00	21.50	5.69	33	34
Total	19.37	16.00	18.00	21.00	4.94	125	134

C35 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal CANNABIS (vmed010 vmed040)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge première consommation (cat.)	moins de 15 ans	32	76.2%	2	50.0%	34	73.9%
	15-17 ans	9	21.4%	0	.0%	9	19.6%
	18-20 ans	1	2.4%	1	25.0%	2	4.3%
	plus de 20 ans	0	.0%	1	25.0%	1	2.2%
Total		42	100.0%	4	100.0%	46	100.0%
Missing_		4		0		4	

C36 Statistique: Âge première consommation, sous-groupe: problème principal CANNABIS (vmed010 vmed040)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	13.26	12.00	13.50	14.25	1.98	42	46
femmes	17.25	13.25	16.00	22.50	4.99	4	4
Total	13.61	12.00	14.00	15.00	2.55	46	50

Âge début consommation régulière**C37 Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vmed010 vmed050)**

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge début consommation régulière (cat.)	moins de 15 ans	15	34.1%	2	9.5%	17	26.2%
	15-17 ans	13	29.5%	7	33.3%	20	30.8%
	18-20 ans	7	15.9%	6	28.6%	13	20.0%
	plus de 20 ans	9	20.5%	6	28.6%	15	23.1%
Total		44	100.0%	21	100.0%	65	100.0%
Missing_		1		3		4	

C38 Statistique: Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vmed010 vmed050)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	17.82	14.00	16.00	19.75	5.84	44	45
femmes	20.48	16.00	18.00	24.50	6.29	21	24
Total	18.68	14.00	17.00	20.00	6.07	65	69

C39 Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal COCKTAILS (vmed010 vmed050)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge début consommation régulière (cat.)	moins de 15 ans	3	7.0%	0	.0%	3	5.3%
	15-17 ans	7	16.3%	5	35.7%	12	21.1%
	18-20 ans	11	25.6%	6	42.9%	17	29.8%
	plus de 20 ans	22	51.2%	3	21.4%	25	43.9%
Total		43	100.0%	14	100.0%	57	100.0%
Missing_		1		2		3	

C40 Statistique: Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal COCKTAILS (vmed010 vmed050)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	21.14	18.00	21.00	24.00	4.68	43	44
femmes	18.64	16.00	18.00	20.25	2.84	14	16
Total	20.53	17.00	20.00	23.00	4.42	57	60

C41 Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal OPIACÉS (héroïne, méthadone, morphine, autres) (vmed010 vmed050)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge début consommation régulière (cat.)	moins de 15 ans	5	3.2%	5	9.1%	10	4.8%
	15-17 ans	29	18.8%	17	30.9%	46	22.0%
	18-20 ans	41	26.6%	17	30.9%	58	27.8%
	plus de 20 ans	79	51.3%	16	29.1%	95	45.5%
Total		154	100.0%	55	100.0%	209	100.0%
Missing_		12		5		17	

C42 Statistique: Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal OPIACÉS (héroïne, méthadone, morphine, autres) (vmed010 vmed050)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	21.72	18.00	21.00	25.00	5.25	154	166
femmes	19.65	17.00	18.00	21.00	5.35	55	60
Total	21.18	17.00	20.00	24.00	5.34	209	226

C43 Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vmed010 vmed050)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge début consommation régulière (cat.)	moins de 15 ans	3	3.3%	2	6.7%	5	4.1%
	15-17 ans	15	16.5%	8	26.7%	23	19.0%
	18-20 ans	22	24.2%	4	13.3%	26	21.5%
	plus de 20 ans	51	56.0%	16	53.3%	67	55.4%
Total		91	100.0%	30	100.0%	121	100.0%
Missing_		9		4		13	

C44 Statistique: Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vmed010 vmed050)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	22.46	18.00	21.00	26.00	5.76	91	100
femmes	22.07	16.00	21.00	27.25	6.68	30	34
Total	22.36	18.00	21.00	26.00	5.98	121	134

C49 Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal CANNABIS (vmed010 vmed050)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge début consommation régulière (cat.)	moins de 15 ans	17	40.5%	2	66.7%	19	42.2%
	15-17 ans	23	54.8%	0	.0%	23	51.1%
	18-20 ans	2	4.8%	1	33.3%	3	6.7%
Total		42	100.0%	3	100.0%	45	100.0%
Missing_		4		1		5	

C50 Statistique: Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal CANNABIS (vmed010 vmed050)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	14.71	13.00	15.00	16.00	2.03	42	46
femmes	15.00	13.00	14.00	.	2.65	3	4
Total	14.73	13.00	15.00	16.00	2.04	45	50

Âge consommation problématique**C51 Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vmed010 vmed060)**

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge consommation problématique (cat.)	moins de 15 ans	5	13.5%	1	5.6%	6	10.9%
	15-17 ans	9	24.3%	1	5.6%	10	18.2%
	18-20 ans	6	16.2%	9	50.0%	15	27.3%
	plus de 20 ans	17	45.9%	7	38.9%	24	43.6%
Total		37	100.0%	18	100.0%	55	100.0%
Missing_		8		6		14	

C52 Statistique: Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vmed010 vmed060)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	21.89	16.50	20.00	29.50	7.47	37	45
femmes	23.11	18.75	20.00	25.75	8.25	18	24
Total	22.29	17.00	20.00	28.00	7.68	55	69

C53 Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal COCKTAILS (vmed010 vmed060)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge consommation problématique (cat.)	moins de 15 ans	1	2.4%	0	.0%	1	1.8%
	15-17 ans	7	17.1%	3	21.4%	10	18.2%
	18-20 ans	9	22.0%	9	64.3%	18	32.7%
	plus de 20 ans	24	58.5%	2	14.3%	26	47.3%
Total		41	100.0%	14	100.0%	55	100.0%
Missing_		3		2		5	

C54 Statistique: Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal COCKTAILS (vmed010 vmed060)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	22.41	18.00	22.00	25.00	5.94	41	44
femmes	18.93	17.50	19.00	20.00	2.50	14	16
Total	21.53	18.00	20.00	24.00	5.48	55	60

C55 Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal OPIACÉS (héroïne, méthadone, morphine, autres) (vmed010 vmed060)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge consommation problématique (cat.)	moins de 15 ans	5	3.3%	3	5.7%	8	3.9%
	15-17 ans	17	11.2%	10	18.9%	27	13.2%
	18-20 ans	44	28.9%	20	37.7%	64	31.2%
	plus de 20 ans	86	56.6%	20	37.7%	106	51.7%
Total		152	100.0%	53	100.0%	205	100.0%
Missing_		14		7		21	

C56 Statistique: Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal OPIACÉS (héroïne, méthadone, morphine, autres) (vmed010 vmed060)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	22.81	19.00	22.00	26.00	5.54	152	166
femmes	21.51	17.50	19.00	24.50	6.63	53	60
Total	22.47	18.00	21.00	26.00	5.85	205	226

C57 Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vmed010 vmed060)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge consommation problématique (cat.)	moins de 15 ans	2	2.2%	0	.0%	2	1.7%
	15-17 ans	13	14.4%	8	26.7%	21	17.5%
	18-20 ans	19	21.1%	5	16.7%	24	20.0%
	plus de 20 ans	56	62.2%	17	56.7%	73	60.8%
Total		90	100.0%	30	100.0%	120	100.0%
Missing_		10		4		14	

C58 Statistique: Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vmed010 vmed060)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	23.81	18.75	22.00	28.00	6.74	90	100
femmes	22.43	17.00	21.00	25.50	6.33	30	34
Total	23.47	18.00	22.00	28.00	6.64	120	134

C63 Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal CANNABIS (vmed010 vmed060)

		Sexe				Total	
		hommes		femmes		n	%
		n	%	n	%		
Âge consommation problématique (cat.)	moins de 15 ans	9	29.0%	1	33.3%	10	29.4%
	15-17 ans	15	48.4%	1	33.3%	16	47.1%
	18-20 ans	5	16.1%	1	33.3%	6	17.6%
	plus de 20 ans	2	6.5%	0	.0%	2	5.9%
Total		31	100.0%	3	100.0%	34	100.0%
Missing_		15		1		16	

C64 Statistique: Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal CANNABIS (vmed010 vmed060)

	Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
hommes	16.42	14.00	16.00	17.00	3.43	31	46
femmes	16.67	14.00	16.00	.	3.06	3	4
Total	16.44	14.00	16.00	17.25	3.36	34	50

C65 Le tableau suivant montre quelles sont les substances posant problème en plus de celle posant le problème principal, et pour combien de personnes.

C65 Autres troubles addictifs: liste détaillée (plusieurs réponses) (vmed070a-vmed070v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucun	réponses	37	6	43
	personnes %	8.7%	4.0%	7.5%
alcool	réponses	152	53	205
	personnes %	35.7%	35.1%	35.5%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	71	25	96
	personnes %	16.7%	16.6%	16.6%
héroïne	réponses	107	38	145
	personnes %	25.1%	25.2%	25.1%
méthadone	réponses	96	42	138
	personnes %	22.5%	27.8%	23.9%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	22	11	33
	personnes %	5.2%	7.3%	5.7%
cocaïne	réponses	171	68	239
	personnes %	40.1%	45.0%	41.4%
crack, freebase	réponses	80	20	100
	personnes %	18.8%	13.2%	17.3%
amphétamines	réponses	70	20	90
	personnes %	16.4%	13.2%	15.6%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	83	18	101
	personnes %	19.5%	11.9%	17.5%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	3	2	5
	personnes %	.7%	1.3%	.9%
barbituriques	réponses	10	1	11
	personnes %	2.3%	.7%	1.9%
benzodiazépines	réponses	122	44	166
	personnes %	28.6%	29.1%	28.8%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	30	22	52
	personnes %	7.0%	14.6%	9.0%
LSD	réponses	54	17	71
	personnes %	12.7%	11.3%	12.3%
autres hallucinogènes	réponses	36	8	44
	personnes %	8.5%	5.3%	7.6%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	5	0	5
	personnes %	1.2%	.0%	.9%
cannabis	réponses	161	68	229
	personnes %	37.8%	45.0%	39.7%
tabac	réponses	280	116	396
	personnes %	65.7%	76.8%	68.6%
autre(s) substance(s)	réponses	7	5	12
	personnes %	1.6%	3.3%	2.1%
jeu pathologique	réponses	6	2	8
	personnes %	1.4%	1.3%	1.4%
troubles alimentaires	réponses	9	24	33
	personnes %	2.1%	15.9%	5.7%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	8	10	18
	personnes %	1.9%	6.6%	3.1%
Total	réponses	1620	620	2240
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	426	151	577
	personnes %	380.3%	410.6%	388.2%
Missing		19	6	25

Concernant les tableaux ci-après, plusieurs réponses sont possibles.

C66 55 % des personnes du groupe **Alcool** mentionnent la cocaïne comme autre substance posant problème ; 53 % citent le cannabis, 27 % l'héroïne et 24 % les benzodiazépines.

C67 Le groupe **Cocktails** se caractérise par sa polyconsommation. En effet, les substances ci-après posent aussi problème, dans les pourcentages suivants : pour 60 % la cocaïne, pour 52 % l'héroïne, pour 40% le crack et freebase, pour 40 % l'alcool, pour 40 % le cannabis, pour 35 % la méthadone et pour 29 % les benzodiazépines.

C68 Les personnes du groupe **Opiacés** mentionnent les substances problématiques suivantes : la cocaïne pour 55 %, le cannabis pour 42 %, l'alcool pour 38 %, les benzodiazépines pour 36 % et les cocktails pour 24 %.

C69 Parmi le groupe **Cocaïne**, 50 % de la clientèle mentionnent le cannabis comme autre substance problématique ; 47 % citent l'héroïne, 46 % l'alcool, 31 % les benzodiazépines, 30 % la MDMA et substances apparentées et 27 % les amphétamines.

**C66 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal ALCOOL (plusieurs réponses)
(vmed070a -vmed070v)**

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucun	réponses	3	1	4
	personnes %	6.8%	4.5%	6.1%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	6	3	9
	personnes %	13.6%	13.6%	13.6%
héroïne	réponses	12	6	18
	personnes %	27.3%	27.3%	27.3%
méthadone	réponses	7	4	11
	personnes %	15.9%	18.2%	16.7%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	4	1	5
	personnes %	9.1%	4.5%	7.6%
cocaïne	réponses	23	13	36
	personnes %	52.3%	59.1%	54.5%
crack, freebase	réponses	5	1	6
	personnes %	11.4%	4.5%	9.1%
amphétamines	réponses	9	0	9
	personnes %	20.5%	.0%	13.6%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	12	1	13
	personnes %	27.3%	4.5%	19.7%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	4.5%	1.5%
barbituriques	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
benzodiazépines	réponses	8	8	16
	personnes %	18.2%	36.4%	24.2%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	2	4	6
	personnes %	4.5%	18.2%	9.1%
LSD	réponses	7	0	7
	personnes %	15.9%	.0%	10.6%
autres hallucinogènes	réponses	3	0	3
	personnes %	6.8%	.0%	4.5%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
cannabis	réponses	26	9	35
	personnes %	59.1%	40.9%	53.0%
tabac	réponses	34	15	49
	personnes %	77.3%	68.2%	74.2%
autre(s) substance(s)	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	4.5%	1.5%
jeu pathologique	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
troubles alimentaires	réponses	1	3	4
	personnes %	2.3%	13.6%	6.1%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	0	3	3
	personnes %	.0%	13.6%	4.5%
Total	réponses	162	74	236
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	44	22	66
	personnes %	368.2%	336.4%	357.6%
Missing		1	2	3

**C67 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal COCKTAILS
(plusieurs réponses) (vmed070a -vmed070v)**

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucun	réponses	1	1	2
	personnes %	2.4%	6.3%	3.4%
alcool	réponses	15	8	23
	personnes %	35.7%	50.0%	39.7%
héroïne	réponses	21	9	30
	personnes %	50.0%	56.3%	51.7%
méthadone	réponses	12	8	20
	personnes %	28.6%	50.0%	34.5%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	2	2	4
	personnes %	4.8%	12.5%	6.9%
cocaïne	réponses	26	9	35
	personnes %	61.9%	56.3%	60.3%
crack, freebase	réponses	18	5	23
	personnes %	42.9%	31.3%	39.7%
amphétamines	réponses	6	4	10
	personnes %	14.3%	25.0%	17.2%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	8	2	10
	personnes %	19.0%	12.5%	17.2%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
barbituriques	réponses	1	0	1
	personnes %	2.4%	.0%	1.7%
benzodiazépines	réponses	12	5	17
	personnes %	28.6%	31.3%	29.3%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	2	2	4
	personnes %	4.8%	12.5%	6.9%
LSD	réponses	5	2	7
	personnes %	11.9%	12.5%	12.1%
autres hallucinogènes	réponses	5	1	6
	personnes %	11.9%	6.3%	10.3%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
cannabis	réponses	16	7	23
	personnes %	38.1%	43.8%	39.7%
tabac	réponses	33	12	45
	personnes %	78.6%	75.0%	77.6%
autre(s) substance(s)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
jeu pathologique	réponses	2	1	3
	personnes %	4.8%	6.3%	5.2%
troubles alimentaires	réponses	3	4	7
	personnes %	7.1%	25.0%	12.1%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	1	1	2
	personnes %	2.4%	6.3%	3.4%
Total	réponses	189	83	272
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	42	16	58
	personnes %	450.0%	518.8%	469.0%
Missing		2	0	2

C68 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal OPIACÉS (héroïne, méthadone, morphine, autres) (plusieurs réponses) (vmed070a -vmed070v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucun	réponses	13	2	15
	personnes %	8.3%	3.4%	7.0%
alcool	réponses	63	19	82
	personnes %	40.1%	32.8%	38.1%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	39	13	52
	personnes %	24.8%	22.4%	24.2%
cocaïne	réponses	83	35	118
	personnes %	52.9%	60.3%	54.9%
crack, freebase	réponses	27	7	34
	personnes %	17.2%	12.1%	15.8%
amphétamines	réponses	16	7	23
	personnes %	10.2%	12.1%	10.7%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	16	6	22
	personnes %	10.2%	10.3%	10.2%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	2	1	3
	personnes %	1.3%	1.7%	1.4%
barbituriques	réponses	3	0	3
	personnes %	1.9%	.0%	1.4%
benzodiazépines	réponses	57	21	78
	personnes %	36.3%	36.2%	36.3%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	10	8	18
	personnes %	6.4%	13.8%	8.4%
LSD	réponses	15	7	22
	personnes %	9.6%	12.1%	10.2%
autres hallucinogènes	réponses	8	5	13
	personnes %	5.1%	8.6%	6.0%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	2	0	2
	personnes %	1.3%	.0%	.9%
cannabis	réponses	63	27	90
	personnes %	40.1%	46.6%	41.9%
tabac	réponses	99	46	145
	personnes %	63.1%	79.3%	67.4%
autre(s) substance(s)	réponses	2	1	3
	personnes %	1.3%	1.7%	1.4%
jeu pathologique	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
troubles alimentaires	réponses	2	6	8
	personnes %	1.3%	10.3%	3.7%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	2	3	5
	personnes %	1.3%	5.2%	2.3%
Total	réponses	522	214	736
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
nombre de personnes		157	58	215
	personnes %	332.5%	369.0%	342.3%
Missing		9	2	11

C69 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (plusieurs réponses) (vmed070a -vmed070v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucun	réponses	10	1	11
	personnes %	10.4%	3.0%	8.5%
alcool	réponses	42	17	59
	personnes %	43.8%	51.5%	45.7%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	22	8	30
	personnes %	22.9%	24.2%	23.3%
héroïne	réponses	43	17	60
	personnes %	44.8%	51.5%	46.5%
méthadone	réponses	16	10	26
	personnes %	16.7%	30.3%	20.2%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	5	1	6
	personnes %	5.2%	3.0%	4.7%
amphétamines	réponses	29	6	35
	personnes %	30.2%	18.2%	27.1%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	32	7	39
	personnes %	33.3%	21.2%	30.2%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	1.0%	.0%	.8%
barbituriques	réponses	4	0	4
	personnes %	4.2%	.0%	3.1%
benzodiazépines	réponses	34	6	40
	personnes %	35.4%	18.2%	31.0%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	10	5	15
	personnes %	10.4%	15.2%	11.6%
LSD	réponses	17	6	23
	personnes %	17.7%	18.2%	17.8%
autres hallucinogènes	réponses	10	1	11
	personnes %	10.4%	3.0%	8.5%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	2	0	2
	personnes %	2.1%	.0%	1.6%
cannabis	réponses	43	22	65
	personnes %	44.8%	66.7%	50.4%
tabac	réponses	66	27	93
	personnes %	68.8%	81.8%	72.1%
autre(s) substance(s)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
jeu pathologique	réponses	2	0	2
	personnes %	2.1%	.0%	1.6%
troubles alimentaires	réponses	2	6	8
	personnes %	2.1%	18.2%	6.2%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	2	0	2
	personnes %	2.1%	.0%	1.6%
Total	réponses	392	140	532
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
nombre de personnes		96	33	129
	personnes %	408.3%	424.2%	412.4%
Missing		4	1	5

**C73 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal CANNABIS
(plusieurs réponses) (vmed070a -vmed070v)**

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucun	réponses	2	0	2
	personnes %	4.4%	.0%	4.1%
alcool	réponses	21	3	24
	personnes %	46.7%	75.0%	49.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	1	0	1
	personnes %	2.2%	.0%	2.0%
héroïne	réponses	9	1	10
	personnes %	20.0%	25.0%	20.4%
méthadone	réponses	3	1	4
	personnes %	6.7%	25.0%	8.2%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	2	0	2
	personnes %	4.4%	.0%	4.1%
cocaïne	réponses	19	1	20
	personnes %	42.2%	25.0%	40.8%
crack, freebase	réponses	1	0	1
	personnes %	2.2%	.0%	2.0%
amphétamines	réponses	5	1	6
	personnes %	11.1%	25.0%	12.2%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	11	1	12
	personnes %	24.4%	25.0%	24.5%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
barbituriques	réponses	1	0	1
	personnes %	2.2%	.0%	2.0%
benzodiazépines	réponses	8	1	9
	personnes %	17.8%	25.0%	18.4%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	3	0	3
	personnes %	6.7%	.0%	6.1%
LSD	réponses	7	0	7
	personnes %	15.6%	.0%	14.3%
autres hallucinogènes	réponses	6	0	6
	personnes %	13.3%	.0%	12.2%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
tabac	réponses	28	3	31
	personnes %	62.2%	75.0%	63.3%
autre(s) substance(s)	réponses	4	1	5
	personnes %	8.9%	25.0%	10.2%
jeu pathologique	réponses	2	0	2
	personnes %	4.4%	.0%	4.1%
troubles alimentaires	réponses	1	1	2
	personnes %	2.2%	25.0%	4.1%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	1	0	1
	personnes %	2.2%	.0%	2.0%
Total	réponses	135	14	149
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	45	4	49
	personnes %	300.0%	350.0%	304.1%
Missing		1	0	1

Concernant les tableaux ci-après, plusieurs réponses sont possibles.
La consommation peut être problématique ou non.

C74 A la question de savoir quelles substances ils ont consommées au cours des 30 jours précédant le début du traitement, les clients et clientes sont 42 % à nommer l'alcool, 39 % à nommer l'héroïne ; 39 % aussi citent la cocaïne, 36 % le cannabis, 20 % les benzodiazépines et 20 % la méthadone.

C75 Dans le groupe **Alcool**, 67 % ont consommé de l'alcool dans les 30 jours précédant l'admission, 37 % ont consommé du cannabis et 31 % de la cocaïne.

C76 Dans le groupe **Cocktail**, 47 % ont consommé des cocktails dans les 30 jours précédant l'admission, 42 % de l'héroïne, 42 % de la cocaïne, 39 % de l'alcool, 35 % du cannabis et 32 % de la méthadone.

C77 Dans le groupe **Opiacés**, 65 % ont consommé de l'héroïne dans les 30 jours précédant l'admission, 38 % de l'alcool, 36 % de la cocaïne, 33 % du cannabis, 26 % des benzodiazépines et 26 % de la méthadone.

C78 Dans le groupe **Cocaïne**, 57 % ont consommé de la cocaïne dans les 30 jours précédant l'admission, 42 % de l'alcool, 32 % du cannabis et 24 % de l'héroïne.

C74 Substances consommées (30 jours) (plusieurs réponses) (vmed080a-vmed080v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucune	réponses	64	18	82
	personnes %	15.2%	12.2%	14.4%
alcool	réponses	178	61	239
	personnes %	42.3%	41.5%	42.1%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	50	21	71
	personnes %	11.9%	14.3%	12.5%
héroïne	réponses	153	69	222
	personnes %	36.3%	46.9%	39.1%
méthadone	réponses	74	38	112
	personnes %	17.6%	25.9%	19.7%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	12	5	17
	personnes %	2.9%	3.4%	3.0%
cocaïne	réponses	157	66	223
	personnes %	37.3%	44.9%	39.3%
crack, freebase	réponses	37	12	49
	personnes %	8.8%	8.2%	8.6%
amphétamines	réponses	25	11	36
	personnes %	5.9%	7.5%	6.3%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	26	9	35
	personnes %	6.2%	6.1%	6.2%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.2%	.0%	.2%
barbituriques	réponses	1	2	3
	personnes %	.2%	1.4%	.5%
benzodiazépines	réponses	77	36	113
	personnes %	18.3%	24.5%	19.9%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	18	13	31
	personnes %	4.3%	8.8%	5.5%
LSD	réponses	14	3	17
	personnes %	3.3%	2.0%	3.0%
autres hallucinogènes	réponses	5	3	8
	personnes %	1.2%	2.0%	1.4%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.2%	.0%	.2%
cannabis	réponses	151	54	205
	personnes %	35.9%	36.7%	36.1%
tabac	réponses	242	96	338
	personnes %	57.5%	65.3%	59.5%
autre(s) substance(s)	réponses	3	0	3
	personnes %	.7%	.0%	.5%
jeu pathologique	réponses	3	2	5
	personnes %	.7%	1.4%	.9%
troubles alimentaires	réponses	2	7	9
	personnes %	.5%	4.8%	1.6%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	5	3	8
	personnes %	1.2%	2.0%	1.4%
Total	réponses	1299	529	1828
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	421	147	568
	personnes %	308.6%	359.9%	321.8%
Missing		24	10	34

C75 Substances consommées (30 jours): sous-groupe problème principal ALCOOL (plusieurs réponses) (vmed080a -vmed080v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucune	réponses	8	6	14
	personnes %	18.2%	26.1%	20.9%
alcool	réponses	30	15	45
	personnes %	68.2%	65.2%	67.2%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	1	2	3
	personnes %	2.3%	8.7%	4.5%
héroïne	réponses	8	2	10
	personnes %	18.2%	8.7%	14.9%
méthadone	réponses	3	3	6
	personnes %	6.8%	13.0%	9.0%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	2.3%	.0%	1.5%
cocaïne	réponses	14	7	21
	personnes %	31.8%	30.4%	31.3%
crack, freebase	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
amphétamines	réponses	3	0	3
	personnes %	6.8%	.0%	4.5%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	3	1	4
	personnes %	6.8%	4.3%	6.0%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
barbituriques	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	4.3%	1.5%
benzodiazépines	réponses	6	1	7
	personnes %	13.6%	4.3%	10.4%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	0	2	2
	personnes %	.0%	8.7%	3.0%
LSD	réponses	2	0	2
	personnes %	4.5%	.0%	3.0%
autres hallucinogènes	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
cannabis	réponses	21	4	25
	personnes %	47.7%	17.4%	37.3%
tabac	réponses	26	8	34
	personnes %	59.1%	34.8%	50.7%
autre(s) substance(s)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
jeu pathologique	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
troubles alimentaires	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	4.3%	1.5%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	4.3%	1.5%
Total	réponses	126	54	180
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	44	23	67
	personnes %	286.4%	234.8%	268.7%
Missing		1	1	2

C76 Substances consommées (30 jours): sous-groupe problème principal COCKTAILS (plusieurs réponses) (vmed080a -vmed080v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucune	réponses	9	1	10
	personnes %	20.9%	7.1%	17.5%
alcool	réponses	14	8	22
	personnes %	32.6%	57.1%	38.6%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	17	10	27
	personnes %	39.5%	71.4%	47.4%
héroïne	réponses	16	8	24
	personnes %	37.2%	57.1%	42.1%
méthadone	réponses	12	6	18
	personnes %	27.9%	42.9%	31.6%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
cocaïne	réponses	16	8	24
	personnes %	37.2%	57.1%	42.1%
crack, freebase	réponses	9	2	11
	personnes %	20.9%	14.3%	19.3%
amphétamines	réponses	2	2	4
	personnes %	4.7%	14.3%	7.0%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	3	1	4
	personnes %	7.0%	7.1%	7.0%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
barbituriques	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
benzodiazépines	réponses	5	5	10
	personnes %	11.6%	35.7%	17.5%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	0	2	2
	personnes %	.0%	14.3%	3.5%
LSD	réponses	1	0	1
	personnes %	2.3%	.0%	1.8%
autres hallucinogènes	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	7.1%	1.8%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
cannabis	réponses	12	8	20
	personnes %	27.9%	57.1%	35.1%
tabac	réponses	27	11	38
	personnes %	62.8%	78.6%	66.7%
autre(s) substance(s)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
jeu pathologique	réponses	1	0	1
	personnes %	2.3%	.0%	1.8%
troubles alimentaires	réponses	0	2	2
	personnes %	.0%	14.3%	3.5%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	1	0	1
	personnes %	2.3%	.0%	1.8%
Total	réponses	145	75	220
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	43	14	57
	personnes %	337.2%	535.7%	386.0%
Missing		1	2	3

C77 Substances consommées (30 jours): sous-groupe problème principal OPIACÉS (plusieurs réponses) (vmed080a -vmed080v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucune	réponses	14	6	20
	personnes %	8.9%	10.5%	9.3%
alcool	réponses	64	17	81
	personnes %	40.8%	29.8%	37.9%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	23	7	30
	personnes %	14.6%	12.3%	14.0%
héroïne	réponses	96	43	139
	personnes %	61.1%	75.4%	65.0%
méthadone	réponses	38	18	56
	personnes %	24.2%	31.6%	26.2%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	6	3	9
	personnes %	3.8%	5.3%	4.2%
cocaïne	réponses	56	22	78
	personnes %	35.7%	38.6%	36.4%
crack, freebase	réponses	14	4	18
	personnes %	8.9%	7.0%	8.4%
amphétamines	réponses	6	4	10
	personnes %	3.8%	7.0%	4.7%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	6	2	8
	personnes %	3.8%	3.5%	3.7%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	.6%	.0%	.5%
barbituriques	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	1.8%	.5%
benzodiazépines	réponses	38	17	55
	personnes %	24.2%	29.8%	25.7%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	9	6	15
	personnes %	5.7%	10.5%	7.0%
LSD	réponses	4	3	7
	personnes %	2.5%	5.3%	3.3%
autres hallucinogènes	réponses	2	2	4
	personnes %	1.3%	3.5%	1.9%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
cannabis	réponses	47	23	70
	personnes %	29.9%	40.4%	32.7%
tabac	réponses	90	40	130
	personnes %	57.3%	70.2%	60.7%
autre(s) substance(s)	réponses	1	0	1
	personnes %	.6%	.0%	.5%
jeu pathologique	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	1.8%	.5%
troubles alimentaires	réponses	1	1	2
	personnes %	.6%	1.8%	.9%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	2	1	3
	personnes %	1.3%	1.8%	1.4%
Total	réponses	518	221	739
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	157	57	214
	personnes %	329.9%	387.7%	345.3%
Missing		9	3	12

C78 Substances consommées (30 jours): sous-groupe problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (plusieurs réponses) (vmed080a -vmed080v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucune	réponses	22	4	26
	personnes %	22.4%	12.5%	20.0%
alcool	réponses	39	15	54
	personnes %	39.8%	46.9%	41.5%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	6	1	7
	personnes %	6.1%	3.1%	5.4%
héroïne	réponses	20	11	31
	personnes %	20.4%	34.4%	23.8%
méthadone	réponses	13	8	21
	personnes %	13.3%	25.0%	16.2%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	4	1	5
	personnes %	4.1%	3.1%	3.8%
cocaïne	réponses	51	23	74
	personnes %	52.0%	71.9%	56.9%
crack, freebase	réponses	12	5	17
	personnes %	12.2%	15.6%	13.1%
amphétamines	réponses	9	0	9
	personnes %	9.2%	.0%	6.9%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	7	1	8
	personnes %	7.1%	3.1%	6.2%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
barbituriques	réponses	1	0	1
	personnes %	1.0%	.0%	.8%
benzodiazépines	réponses	13	4	17
	personnes %	13.3%	12.5%	13.1%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	3	0	3
	personnes %	3.1%	.0%	2.3%
LSD	réponses	3	0	3
	personnes %	3.1%	.0%	2.3%
autres hallucinogènes	réponses	2	0	2
	personnes %	2.0%	.0%	1.5%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	1.0%	.0%	.8%
cannabis	réponses	30	11	41
	personnes %	30.6%	34.4%	31.5%
tabac	réponses	57	23	80
	personnes %	58.2%	71.9%	61.5%
autre(s) substance(s)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
jeu pathologique	réponses	1	0	1
	personnes %	1.0%	.0%	.8%
troubles alimentaires	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	3.1%	.8%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
Total	réponses	294	108	402
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	98	32	130
	personnes %	300.0%	337.5%	309.2%
Missing		2	2	4

C81 Substances consommées (30 jours): sous-groupe problème principal CANNABIS (plusieurs réponses) (vmed080a -vmed080v)

		Sexe		Total
		hommes	femmes	
aucune	réponses	3	0	3
	personnes %	7.0%	.0%	6.4%
alcool	réponses	18	3	21
	personnes %	41.9%	75.0%	44.7%
cocktails (héroïne et cocaïne)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
héroïne	réponses	4	0	4
	personnes %	9.3%	.0%	8.5%
méthadone	réponses	1	1	2
	personnes %	2.3%	25.0%	4.3%
autres opiacés (morph., cod. etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
cocaïne	réponses	8	1	9
	personnes %	18.6%	25.0%	19.1%
crack, freebase	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
amphétamines	réponses	0	1	1
	personnes %	.0%	25.0%	2.1%
MDMA et subst. simil. (ecstasy)	réponses	4	1	5
	personnes %	9.3%	25.0%	10.6%
autres stimulants (khat etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
barbituriques	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
benzodiazépines	réponses	1	1	2
	personnes %	2.3%	25.0%	4.3%
autres somnifères et tranquillisants	réponses	3	0	3
	personnes %	7.0%	.0%	6.4%
LSD	réponses	1	0	1
	personnes %	2.3%	.0%	2.1%
autres hallucinogènes	réponses	1	0	1
	personnes %	2.3%	.0%	2.1%
subst. volatiles (solvants etc.)	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
cannabis	réponses	32	3	35
	personnes %	74.4%	75.0%	74.5%
tabac	réponses	26	3	29
	personnes %	60.5%	75.0%	61.7%
autre(s) substance(s)	réponses	1	0	1
	personnes %	2.3%	.0%	2.1%
jeu pathologique	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
troubles alimentaires	réponses	1	0	1
	personnes %	2.3%	.0%	2.1%
autre trouble comp. à une dép.	réponses	0	0	0
	personnes %	.0%	.0%	.0%
Total	réponses	104	14	118
	réponses %	100.0%	100.0%	100.0%
	nombre de personnes	43	4	47
	personnes %	241.9%	350.0%	251.1%
Missing		3	0	3

Injection et usage de seringues déjà utilisées

C82 55 % des clients et clientes se sont déjà au moins une fois injecté des drogues.

C83 Parmi les personnes qui ont déjà consommé des drogues par injection, 65 % l'ont fait au cours des 6 mois précédant le début de la thérapie.

C84 Parmi les personnes qui ont consommé par injection au cours des 6 derniers mois, 18 % ont indiqué avoir employé des seringues ou aiguilles d'autres consommateurs ou consommatrices.

C85 Parmi les personnes qui ont consommé des drogues par injection au cours des 6 mois précédant le traitement, 66 % l'ont également fait dans les 30 jours avant le début du traitement.

C82 Déjà injecté? (vmed090)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
oui	228	53.9%	84	57.9%	312	54.9%
jamais	195	46.1%	61	42.1%	256	45.1%
Total	423	100.0%	145	100.0%	568	100.0%
Missing_	22		12		34	

C83 Injection (6 mois), sous-groupe: déjà injecté (vmed091)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
non	82	37.1%	22	27.5%	104	34.6%
oui	139	62.9%	58	72.5%	197	65.4%
Total	221	100.0%	80	100.0%	301	100.0%
Missing_	7		4		11	

C84 Usage de seringues déjà utilisées, sous-groupe: injection dans les 6 derniers mois (vmed092)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
oui	23	19.2%	7	14.0%	30	17.6%
non	97	80.8%	43	86.0%	140	82.4%
Total	120	100.0%	50	100.0%	170	100.0%
Missing_	19		8		27	

C85 Injection (30 jours), sous-groupe: injection dans les 6 derniers mois (vmed095)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
oui	91	66.4%	36	65.5%	127	66.1%
non	46	33.6%	19	34.5%	65	33.9%
Total	137	100.0%	55	100.0%	192	100.0%
Missing_	2		3		5	

C86 49 % de la clientèle a consommé pour la première fois des drogues par injection après l'âge de 20 ans.

C86 Âge première injection, sous-groupe: déjà injecté (vmed096)

	Sexe				Total	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
moins de 15 ans	5	2.3%	2	2.6%	7	2.4%
15-17 ans	44	20.4%	23	29.5%	67	22.8%
18-20 ans	56	25.9%	20	25.6%	76	25.9%
plus de 20 ans	111	51.4%	33	42.3%	144	49.0%
Total	216	100.0%	78	100.0%	294	100.0%
Missing_	12		6		18	

C87 Âge première injection, sous-groupe: déjà injecté (vmed096)

		Moyenne	Percentile 25	Median	Percentile 75	Std Deviation	Valid Cases	Total Cases
Sexe	hommes	21.54	18.00	21.00	24.00	4.94	216	228
	femmes	21.17	17.00	20.00	24.00	5.70	78	84
Total		21.44	17.00	20.00	24.00	5.15	294	312

D SANTÉ

D1 89 % des clients se sont déjà soumis à un test de dépistage du VIH.

D2 Le résultat était positif pour 5 % des personnes.

D1 Test VIH effectué (vzek040)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
non	47	11.2%	15	10.7%	62	11.1%
oui	371	88.8%	125	89.3%	496	88.9%
Total	418	100.0%	140	100.0%	558	100.0%
Missing_	27		17		44	

D2 Résultat test VIH, sous-groupe: test effectué (vzek041)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
négatif	349	95.4%	117	95.1%	466	95.3%
positif	17	4.6%	6	4.9%	23	4.7%
Total	366	100.0%	123	100.0%	489	100.0%
Missing_	5		2		7	

D3 80 % des clients et clientes se sont déjà soumis à un test de dépistage de l'hépatite B.

D4 Le résultat était positif pour 9 % d'entre elles.

D3 Test hépatite B effectué (vzek050)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
non	77	20.2%	24	19.2%	101	19.9%
oui	305	79.8%	101	80.8%	406	80.1%
Total	382	100.0%	125	100.0%	507	100.0%
Missing_	63		32		95	

D4 Résultat test hépatite B, sous-groupe: test effectué (vzek051)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
négatif	273	92.2%	89	89.0%	362	91.4%
positif	23	7.8%	11	11.0%	34	8.6%
Total	296	100.0%	100	100.0%	396	100.0%
Missing_	9		1		10	

D5 84 % des clients et clientes se sont déjà soumis à un test de dépistage de l'hépatite C.

D6 Le résultat était positif pour 33 % des personnes.

D5 Test hépatite C effectué (vzek060)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
non	64	16.6%	17	13.0%	81	15.7%
oui	321	83.4%	114	87.0%	435	84.3%
Total	385	100.0%	131	100.0%	516	100.0%
Missing_	60		26		86	

D6 Résultat test hépatite C, sous-groupe: test effectué (vzek061)

	hommes		femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
négatif	217	68.9%	68	60.7%	285	66.7%
positif	98	31.1%	44	39.3%	142	33.3%
Total	315	100.0%	112	100.0%	427	100.0%
Missing_	6		2		8	